

**ENCHIRIDION
(DISPENSARIUM
VULGÒ VOCANT)
COMPOSITORUM AB
ANTIQUIORIBUS...**

Thibault Lespleigney, Antonius
Stupanus






M

x Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

12-3. a. 13

74.4
1971





ENCHIRI

Bibl. Sec. Jac. DION *Coll. Rom.*

(Dispensarium vulgò vo-
cant) compositorum ab An-
tiquioribus Iunioribusq̃
Archiatris Medicamen-
torum, tum copia, tum eru-
ditione cunctis artis Medi-
cæ candidatis satisfaciens.

Nunc primum & natum
& æditum.

Ex Legato S. Laurentij de Rubis

LVGDVNI,



SVB SCVTO CORTESANA

NIENSI.

1549

ROMA

VITTORIO EMANUELE



NOTÆ PONDE-

rum, quorum apud nostros
hodie vsus existit.

7. senar. 38	Granum	} bac nota	gr.	} signifi- catur.
3	Scrupulus		ᶞ	
	Drachma		ʒ	
gr. 20	Vncia		ʒ	
	Libra		℔.	
	Quarta		ᶞr.	
	Semis		β	
	Manipulus		M.	

Longè plura Antiquis ponderum fue-
runt nomina, quæ si scire desideras, Ga-
lenum accedito, qui de ijs peculiarem li-
brum ædedit. Inter recentiores de ijsdem
extra Budæum, Philippus Melanchthon,
Alciatus, Georgius Agricola, & alij qui-
dam scripserunt, quos autores, si uoles,
consulere licebit.

Lectori S.



Hoc quoq; Frelloniorum fra-
 trum labore frueret lätibun-
 dus. Nam quum ædiderint il-
 li nuperrimè forma enchiri-
 dij Dioscorideni illustriora simplici-
 a medicamina, ueterumq; aliquot usitatiores
 mixturas pertractantes, pro suo non me-
 diocri adiuuandorum rei medicæ studio-
 rum desyderio, hunc item pari formula
 libellum in lucem emittunt, cõposita poste-
 riorum Medicorum Græcorum, Hebræo-
 rum, Arabum, Mauritanorum, Latino-
 rum, & nonnullorum recentiorum medi-
 camenta continentem. Ac quemadmodum
 in illo annotata sunt breuibus, quæ & eru-
 ditis & barbarâ sequentibus Medicinam
 satis facere possint: ita in hoc passim repe-
 rias, quæ te magna utilitate & iucunditate

remc. buntur. Sunt enim ab utriusq; lin-
 guæ doctissimo, tum in perlegendis omni-
 genis Medicorum libris exercitatisimo
 Antonio Stupano Rhæto & correcti am-
 bo, atq; (ubi oportuit) aucti & illustrati.
 Hanc uerò huius nominatim libelli doctri-
 nam nemo sit, qui uel unius Galeni fretus
 iudicio non etiam atq; etiam laudibus eue-
 hat: siquidē totus artis Apollineæ chorus
 eam exercuit, ad quam ueluti ad sacram
 (quod aiūt) anchorā semper cōfugit. Eia
 igitur amice lector, quisquis ad Medica-
 tete accingis opera, libellum hūc tibi coē-
 me, nocturna uersato manu, uersato diur-
 na: & maximū (mihi crede) ex eo tibi lan-
 guentibusq; emolumentum quāmocysimē
 comparaueris. Et Frelloniorum erga te
 studijs utroq; pollice fauebis, expectans,
 quæ paratur, perfectiorē æditionē. Vale,
 Lugd. vi. Non. Aug. 1543

Antidotum

ASYNCRITVM,

Ex Aëtuario.

℞. Myrrhae. ʒ. xvij.

Lachrymæ papaueris. ʒ. xviij.

Amomi. ʒ. vi.

Petroselini. ʒ. xv.

Seminis apij. ʒ. xij.

Iunci odorati. ʒ. ix.

Cassiae Aegyptiae. ʒ. iiij.

Piperis candidi. ʒ. iiij.

Piperis atrii. ʒ. xv.

Sinapis Syriacæ. ʒ. xij.

Styracis. ʒ. vi.

Seselis. ʒ. iiij.

Hedychroi magmatis, id est, spissamenti. ʒ. v.

Mellis despumati, quantum erit satis.

Modus est, drachma; Styracem melle

diductum vsurpa: & arida resperge: lachrymā papaueris macera dulci sapa, donec mellis habuerit crassitiem.

ANTIDOTVM Asyncritum dicitur, id est, incomparabile, contra quar-
tanas: veteres capitis dolores mitigat:
vertiginosos adfectus & insultus mor-
bi comitialis mulcet: peruigilia se-
dat: infantiam placat: magnum oculo-
rum dolorem finit: defluxionem, den-
tium cruciatus, spirandi difficultatem,
& omnē suspirij causam discutit: tussis
diurnæ, pulmonariæ, & laterali me-
detur inflammationi: humorē omnem
ab officina pulmonū elidit: tenuia spu-
ta densat, excretuq; faciliora reddit, ex
hydromelite potum: si sanguis sputo
reddatur, ex aceto mulso, vel posca,
vel sanguinalis herbæ, vel plantaginis
succo, sicilique pōdere: sed pro laboran-
tis viribus paululum quid, vel adijci-
to vel detrahito. stomacho præsentī est
auxilio: huius siquidem humidam la-

xitatem adstringit: cibi fastidia leuat:
singultum tollit: non retentos ob impe-
tum vomitionum cibos sistit, & omnē
stomachi & ventris inflationem in-
ructus soluit, vellicantes iocineris do-
lores permulcet: contra regium mor-
bum efficax habetur: quippe quòd in
priorem naturam vnamquamque par-
tem reuocet. ærumnosæ cogitabundæq;
infaniæ quam atra bilis creauit (melan-
choliā vocant) tumultus leuat: lienis
grauitatem submouet: faciei colorem
reddit: pituitam, bilemq; per intestina
deijcit: distributionis meatus aperit:
vrinas ciet, & ad renes impellit: sic vt
ad vesicam arenulas & sabulosa de-
turbet: grumis à renibus & vesica
coeuntibus medetur: vrinæ difficulta-
tem reprimit: ileosis & colicis crucia-
tibus, potu succurrit efficaciter: ve-
tus alui recrementum subducit: inflam-
mationem temporis curriculo discu-
tit: tormina mitigat, & distentionem

conceptaculorū resoluit. Cū verò non potest ore sumi, cum fœnigræci succo subter in ventrem datur, & à doloribus vindicat: maximè verò vteri calamitatibus opitulatur: nam enitentiū puerarumq; dolores permulcet: molestiam peruigiliorū, elationem vuluæ & distentionem mollit: morbosam purgationem ad recreationem perducit: meatuum spiracula laxat: erumpētes vtero sanguinis profusiones, si solum detur, supprimit: quinetiam si ex vino calido infundatur, sistit easdem: delitescētibus rerum collectionibus, potu succurrit: in podagris quoque & articularijs doloribus eo vtendum: hoc vero laborantibus auxiliari, experiētia compertum est: maxime autē & in morborū accessionibus, vires huius medicamēti licet intueri ac deprehendere: siquidē non in os modo datum, sed & resolutis quoq; mēbris illitū, efficax est: prodest etiam ijs, q̃ in alea vitæ cōstituti periclitant̃.

De litera A.

*Antidotus Philonis secundum
Mesuem.*

℞. Piperis albi

Hyoscyami albi ana ʒ. xx.

Oprij ʒ. x.

Croci ʒ. v.

Spicæ

Pyrethri

Castorij ana ʒ. i.

Mellis despumati

Quadruplo omnium excipe.

Moschi. ʒ. i.

Antidotus Philonis efficacissima
ad sedandos vehemētes & lethales par-
tium dolores, ventriculi, coli, hypo-
chondriorum, hepatis, lienis, renum,
uteri excitatos à crassis humoribus,
aut flatu crasso, aut amborum causa in-
temperie frigida. Valet etiam ad suffo-
cationis periculum, singultum vehe-
mentem, vrinæ difficultatem: ob hæc
à morte impendente vindicat.

Aurea Alexandrina

D. N.

℞. Afari

Carpobalsami, id est seminis balsami.

* Sem. hyoscyami añ. ʒ. ij. β. * Jusqui-

Caryophyllorum *num uo-*Myrrhæ *cant.*

Cyperi

Opij thebaici añ. ʒ. ij.

Opobalsami, id est, Liqueoris balsami

* Cinnamomi electi * Cinnamomum ue-

Folij *rum ad nos nunc non*Zedoariæ *affertur : pro eo ac-*Zingiberis *cipies uulgare duplo*Costi *pondere.*

Coralliij rubri

Cassia lignæ

Euphorbij

Tragacanthi

Thuris

Styracis calamitæ

Saliuncæ, pro Saliunca pone spicam

celticam.

Meu, id est, foeniculi erratici, cuius radix tortuosa est & odorifera

Cardamomi

Seselis, siue sileris montani

Napi, seu seminis sinapi.

* Saxifragiae radice Act. * alij Saxi-

Anethi

phagi.

Anisi añ. 3. j.

Ligni aloës

Rheubarbari

Rhapontici

Aliptae moschatae

Castorei

Spicae nardi

* Galangae

* Galanga, radix est, quam

Opopanacis

multi herbarum coniectores,

Anacardi

cyperum Babylonicum con-

Mastiches

gnominant.

Sulphuris viui

Paeoniae radice

Eryngii

Rosarum

Thymi

Acori

* Pulegij

* *Halicacabi Ad.*

Vtriusque Aristolochiæ

Gentianæ

Corticis radicis mandragoræ

Chamædryos

Baccarum lauri

Dauci Cretici

Ameos

* Phu,

* *alij radicis Valerianæ.*

Macropiperis, id est, piperis longi

Leucopiperis, id est, piperis albi

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Carui

Amomi

Petroselinii seminis

* Leuistici,

* *Libyistici seminis Ad.*

Seminis Rutæ

Sinoni, id est, Petroselinii macedonici.

añ. 3.β.

Auri limaturæ tenuissimæ

Argenti limaturæ tenuissimæ

Ambarum margaritarū, scilicet perforatarum & non perforatarum.

*Βλάτῃς

* id est, onychis.

Osis cordis ceruini añ. gr. xiiij.

Limaturæ eboris

Calami aromatici

Pyrethri. añ. gra. ix.

Mellis quod sufficit.

Aurea Alexandrina secundum intentionem Nicolai, dicta est aurea ab auro quod recipit, vel à pretio & virium præstantia. Alexandrina ab Alexandro peritissimo Medico & Philosopho, à quo fuit inuenta.

Antidotum aureum Alexandri, contra defluxiones capitis frigore conceptas efficax, oculorū lachrymas exiccet, dentium dolores lenit: aduersus capitis cruciatum summoperè prodest, illitum fronti. Comitiales, insanos, vertiginosos, paralyticos, apoplecticos mulcet. Tabidis, tussiculosis, asthmaticis, humorem à pectore reiicientibus,

cardiacis, sanguinē excreantibus, præ-
senti est auxilio: datur & ischiadicis,
coli & renū cruciatibus, aduersus ilio-
rum noxam, difficultatē vrinæ, & eiuf-
dem stillicidium valet: calculos cōmi-
nuit: omni ventris adfectu liberat: quo-
tidianis & tertianis febribus circa ac-
cessionis initium, sufferuefacto stœcha-
dis iusculo, eximiè medetur.

Athanasia magna

D. M.

℞. Hepatis lupi

Eupatoriij

Croci

Myrrhæ

Castoriij

Costi

Cardamomi

Spicæ nardi

Opiij

Papaueris nigri

Hyoscyami

Cornu dextri capræ vel cerui añ. por-
tiones æquales.

Vini quantum sufficit.

Mellis despumati quantum sufficit.

Terenda terantur, & alia in vino li-
quefiant : excipe omnia melle despu-
mato, & post sex menses vtere ab au-
reo dimidio ad aureum vnum, cum vi-
no dulci & grato, aut cum sapa & suc-
co intybi & apij.

Athanasia magna obstructionē he-
patis & lienis liberat, dolorem sedat,
cū dictarum partium, tum vētriculi,
renum, hæmorrhoidū, quo modo Phi-
lonium. Thoracem pulmonesq; expur-
gat, ob id tussim iuuat, hæmorrhagiā,
diarrhœam, lenteriam antiquam, dy-
senteriam cohibet.

Aromaticum rosatum maius

D. Gab.

℞. Rosarum rubearum. ʒ. xv.

Liquiritiæ. ʒ. viij.

Ligni Aloës

Sandali mazachari. i. citrini. añ. 3. iij.

Cinnamomi electi. 3. v.

Maceros

Caryophyllorum. añ. 3. ij. β.

Gummi Arabici

Tragacanthi. añ. 3. ij. & 3. ij.

Nucis moschatae

Cardamomi maioris

Galangae. añ. 3. i.

Spicae nardi. 3. ij.

Ambrae griseae. 3. ij.

Moschi. 3. i.

Syrupi rosarum, seu iulepi rosati quod
sufficit.

Syrupi corticum citri quantū sufficit.

Aromaticum rosatum dicitur à ro-
sis. Valet cōtra stomachi defectionem,
& omnia nutritionis membra con-
fortat, & est contra stomachi humidi-
tatem & mollificationem medicamen
expertum, & omnem putrefactionem
in eo corrigit, cerebrum & cor confor-

at, appetitū excitat, digestionem procurat conualescentibus, & debilibus mirè subuenit.

Aromaticum rosatum

D. M.

℞. Rosarum rubrarum. 3. i. β.

Ligni aloës

Macis

Galangæ

Caryophyllorum

Zingiberis

Trochiscorum diarrhodon

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ añ. 3. ij. β.

Glycyrrhizæ rasæ. 3. i.

Cinnamomi. 3. ij.

Cardamomi

Spicæ nardi añ. 3. i.

Syrupi rosati

Syrupi corticum citri quantū sufficit.

Moschi. 3. β. aromatizatur.

Electarium aromaticū rosatum cor

ventriculum roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, nauseam & vomitum sedat, viscerum humiditatem excrementosam absumit.

Aromaticum caryophyllatum

D. M.

℞. Caryophylli. ʒ. viij.

Maceros

Zedoariæ

Galangæ

Santali mazachari, id est, citrini

Trochiscorum Diarrhodon

Cinnamomi

Ligni Aloës

Spicæ Indæ, id est, spicæ nardi

Piperis longi

Heil, i. cardamomi minoris añ. ʒ. i.

Rosarum. ʒ. β.

Liquiritiæ rasæ

Galliæ moschatæ añ. ʒ. ij.

Folij.

Cubebæ añ. ʒ. ij.

Ambræ. 3. i.

Moschi. 3. β.

Syrupi corticis citri, quod sufficit.

Aromaticum caryophyllatum dicitur à caryophyllis quæ ingrediuntur.

Aromaticum caryophyllatum stomachum & cor confortat, & reliquum ventrem inferiorem roborat, nauseam & vomitum sedat, & valet contra putrefactionē in partibus stomachi: membra verò nutritionis calefacit, & ventositates dissolvit. Difficile est hoc præparare, quia caremus folio: elegans tamen esset si bene præpararetur.

Aromaticum moschatum

D. M.

℞. Ligni aloës. 3. vii.

Cinnamomi crassi. 3. x.

Ambræ. 3. iij.

Moschi. 3. ij.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium aromaticū moschatum

cerebrum, cor, vētriculum roborat: ob
id confert epilepsiæ, palpitatiōi cor-
dis & syncopæ, suffocationi quoq; ab
utero, oris odorem commendat.

Aromaticum nardinum

D. M.

℞. Spicæ nardi. ʒ. ii.

Rosarum rubrarum. ʒ. β.

Cubebæ

Ligni aloës

Macis

Caryophyllorum

Cinnamomi

Folij Indi

Anisi

Corticum citri

Trochiscorum diarrhodon

Galliæ Sebellianæ añ. ʒ. ii.

Strobilorum

Amygdalorū excocticatorū añ. ʒ. v.

Gummi Arabici

Tragacanthi añ. ʒ. ii.

Moschi. ʒ. β.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium aromaticum nardinum cor, ventriculum, hepar, renes & cætera viscera roborat, & vesicam: coctionem iuuat, ob id oris & sudoris odorem commendat, flatus dissipat: tamen veneris appetitum excitat, respirationem facit liberaliorem.

Alipta muscata

D. N.

℞. Ladani purissimi. ʒ. iij.

Styracis calamitæ. ʒ. i. β.

Ligni aloës. ʒ. ij.

Styracis rubæ. ʒ. i.

* Ambræ. ʒ. i.


Camphoræ. ʒ. i. β.

Moschi. ʒ. β.

* *Ambræ d'recentioribus dicitur. quid in succinum orientale uocant.*

Aquæ rosarum quod sufficit.

Confectio Aliptæ muscatæ, id est, misturæ muscatæ dicitur, quia recipit muscum,



Cōfectio Aliptæ muscatę valet pueris patientibus asthma, & constrictiōnem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimū fumigiū & odoriferū, quo vtūtur apostolici & Imperatores in capellis suis. Intrat in p̄tiosissimis medicinis, & electuarijs.

Acaciæ.

Accipe plantam prunorum sylvestrium cum fructu eius, & ponas super eam aquam paucam in vase, & dimitte sic diebus aliquibus, deinde coque super ignem & cola, & colaturā illam coque super ignem quousque coaguletur, deinde proijce in vasis similibus cochleis, & dimitte siccari.

Acacia vulgata

D. Syluij.

℞. Baccas pruni sylvestris aqua in vase pauca aliquot diebus maceratas, coque: decoctum cola, ac recoque donec crassescat, & reconde.

Acetum scilliticum

D. M.

℞. Laminarum squillæ. ℔. j.

Aceti boni. ℔. viij.

Fit autem sic: squillæ laminas inter corticum & corticē medias, aculignea filo consutas tanto interuallo, ne se contingant, siccabis in vmbra dies quadraginta: postea concisas cultello ligneo insolabis in aceto bono, in vase vitrato stricti orificij, bene obstructo dies quadraginta alios (nisi velis accelerare, quod vas sepeliendo paulatim in cinere calido vel sabulo fit.) Cola & vtere ieiuno stomacho quotidie paulatim, donec ad fescunciam perueniatur.

Ad eundem ferè modum fiunt ex floribus siccatis rosarum, saluicæ, sambuci, roris marini, acetum rosatum, saluatum, sambucatum, rosmarinatum, anthosatum, & vuatum ex vuis passis.

Acetum scillinum efficacissimū est ad cerebri affectus frigidos & curatu contumaces, epilepsiam, vertiginem, Gingiuas laxas & putres sanat, dentes confirmat, oris odorem commendat, partes respirationis iuuat & expurgat & musculos laringis roborat, ventriculum expurgat, appetentiam excitat, coctionem iuuat: hepar & lienē quoq; expurgat, horumq; dolorem leuat: intestinorum, & vesicæ retentricem vim firmat, præfocationi ab vtero, affectibus iuncturarū prodest: humores enim crassos tenuat, lentos incidit, & fluxiles ad expellendumq; promptos reddit et expellit, interdum etiam bilem atrā. Corpus laxum & molle firmat, in iuuentute conseruat, à putredine vindicat, coloratum bene efficit, sed vsu multo emaciat.

Amyli.

Accipe de frumento bono, & tere id

tritura grossa, scilicet vt solum frangatur, & pone in vase terre ovitreato mūdo, & pone super id aquam, ita vt cooperiat & superet duobus vel tribus digitis, & dimitte per noctem: in mane verò exprime cum manu bene quousque descendat amyllum totum, cola & proijce substantiam, & dimitte amyllum, quousque amyllum resideat in fundo ollæ, & aqua supernatet, tunc eijce aquam suauiter, ita quòd nihil ex ea remaneat, & sicca cum modico coto. Et fiat hoc in tempore æstiuo, & citò siccetur ne ace scat & destruat, & cooperi ollam cum pāno subtili ita quòd nihil cadat intus postmodū. Et quum erit siccum, repone in vase stricti orificij, obturando os vasis ne aliquis vermiculus ingrediatur vel aliquid aliud. Si autem fiat in hyeme, magis oportet custodire ne ace scat: curādum est etiam vt citò siccetur in sole, aut vento, vel prope ignem. Et secundum hunc mo-

dum fit amyllum ex riso.

Aqua odorifera.

℞. Aquæ rosarum, ℔. iij.

Benioin

Styracis calamitæ

Caryophyllorum añ. ʒ. i.

Moschi

Algalix, Gallicè Ciuete añ. gr. xx.

Camphoræ. ʒ. ij.

Alij ponunt. ʒ. i. ligni Aloës. ponantur in vase vitreo cooperto mēbrana perforata, & bulliant in vase pleno aqua, sicut fit in balneo Mariæ, deinde colentur omnia per pannum lineum, & reponantur in vase vitreo, vbi sint grana moschi xv. distēperata cū dicta aqua, & ponatur vas in sole per quindecim dies, & erit aqua multum odorifera.

Aqua mulsa

D. M.

℞. Mellis boni. ℔. i.

Aquæ fontanæ dulcis & claræ, ℔. viij.

Ignē lento in vāse lapideo vel vitrato coque continenter despumando & cola ad intentionem tuam, videlicet si mox bibendum sit, aquosius fiat: si reponendum, largius coquatur. Nam incrassatum vt Iulepus, diu quidem seruatur: sed in partes remotas ægrè penetrat, in bilem q̃ ob multam dulcedinem facile vertitur. Aliàs quoq; facultates coctio varia ei acquirit, quia parum coctum inflat, magis aluum subducit, minus nutrit: largius verò coctum, inflationem dissipat, magis nutrit, minus deijcit.

Aromatizant nonnulli

Zingibere

Croco

Cinnamomo

Macis & similibus: alij gallia moschata, ligno aloës & similibus.

Fit etiam ex mellis parte vna, aquæ fontanæ partibus octo, fermenti in his dissoluti ℥. iij. in singulas libras aquæ mellitæ, quæ vasi ligneo trade, relicto

trium digitorū spatio vacuo, in quod dum musti modo feruebit, recipiatur: vbi feruere desierit, obturato vase modo doliorum vini, tertio post mense fit potabile. Immitti possunt aromata pāno lineo ligata.

Aqua mulsa sitim sedat, affectus frigidus, præsertim cerebri, neruorū, iuncturarum iuuat: loco vini potū tussim humidam, puris & pituitæ crassæ & lentæ expectorationem promouet, lauat, terget, purgat intestina, viscera, meatus vrinarios: ob id colicis prodest, & aluum subducit, calculū in vīs vrinæ gigni prohibet.

Benedicta.

D. N.

R. Turbith electi.

* Zucchari añ. 3. x. * *Saccharum uocant.*

Diagridij. 3. v.

Hermodactylorum

Rosarum añ. 3.v.

Caryophyllorum

Spicæ nardi

Zingiberis

Croci

Saxifragiæ

Macropiperis, id est, piperis longi

Amomi

Cardamomi

Selinospermatis, id est, seminis Aprij.

Salisgemmæ

Galangæ

* Maceros

* *Macem uulgo appellat.*

Carui

Fœniculi

Seminis sparagi

Brusci

Granorum solis añ. 3.i.

Mellis quod sufficit.

Benedicta dicitur, quia ab omnibus
à quibus sumitur, benedicatur. valet ad
guttam arthreticam & podagrā ex fri

gidityte. Et renes & vesicam purgat.

Balsamum, quod uulgò artificiale dicitur.

℞. Terebinthinæ. ʒ. xij.

Gummi elompni. ʒ. v.

Resinæ. ʒ. iij.

Liquefiant simul, & ubi erunt liquefacta, pulueres sequentes misceto,

Aristolochiæ longæ. ʒ. ij.

Sanguinis Draconis. ʒ. iij.

Et fiat massa.

Valet ad omnia recentia & antiqua vulnura, præcipuè ad capitis vsum.

Confectio de mu

sco dulcis D. M.

℞. Croci

Doronici Rom.

Zedoariæ

Ligni Aloës

Maceros añ. 3. ij.

Margaritarum albarum

Serici crudi adusti

Charabes, id est, Electri

Coralli rubei añ. 3. ij. β.

Galliæ, siue galliæ moschatæ

Ocimi, id est Basiliconis citratij añ.

3. ij. β.

Behen alb. & rub.

Folij

Spicæ nardi

Caryophyllorum añ. 3. i.

Zingiberis

Cubebæ

Piperis longi añ. 3. i. β.

Moschi. 3. ij.

Confice cum melle crudo quod sit quadruplum ponderis omnium.

Confectio autem de muscho dulcis, à muscho quod accipit, dicitur: dulcis verò, quia fit sine additione rerum amararum.

Amara autem fiet, & ad eadem efficacior, & prætereaventriculi humores etiam putres potentius absumet, si addantur

Absinthij

Rosarum añ. 3. iij.

Aloës lotæ. 3. iij.

Castorij

Ligustici añ. 3. i.

Cinnamomi. 3. i. β.

Confectio de muscho dulcis Mesue faciens ad pulsum cordis, & ægritudines melancholicas, & ad eum qui tristatur sine causa: confert & ad frigidos cerebri affectus sine febre, sicut est vertigo, & epilepsia, & oris tortura, & paraly sis: & ad ægritudines pulmonis, & ad difficultatem anhelitus.

Confectio Hamech

D. M.

℞. Myrobalanorum citri. 3. iij.

Chebulorum, Indorum, & nigrorum
Rheub

Rheubarbari añ. ʒ. ij.

Agarici

Colocynthis

Polypodij quercini añ. ʒ. *xviij. *alijs

Absinthij

sexdecim

Hascæ, id est, Thymi

Sennæ añ. ʒ. i.

Violarum. ʒ. xv.

Epithymi. ʒ. ij.

Anisi

Rosarum

Fœniculi añ. ʒ. vi.

Succi fumiterræ. lb. i.

Prunorum numero lx.

Passularum enucleatarum. ʒ. vi.

Macera dies quinque omnia aqua casei quantitate sufficienti, in vase vitreo stricti orificij, & obturati. Deinde bulliant bullitione vna, manibus fricentur & colentur: in colatura dissolue Cassiæ fistulæ mundæ. ʒ. iij.

Thamarindorum. ʒ. v.

Tereniabin, siue mannæ. ʒ. ij.

Fricentur manibus, & colentur, & pro
ijce desuper

Zucchari. lb. i. β.

Scammoniæ. ℥. i. β.

Coque vsq; dum mellis habeat spissi-
tudinem, deinde puluera super illud

Myrobalanorum citri

Chebulorum Indorum añ. ℥. β.

Bellericorum

Emblicorum

Rheubarbari

Seminis fumiterræ añ. ℥. iij.

Seminis Anisi

Spicæ nardi añ. ℥. ij.

Electarium Hamech purgat bilem
vtramque, & pituitam falsam: ob id
affectibus inde natis, impetigini, pso-
ra, lepræ, cancro exedenti & similibus
mirè confert.

Catapotia stomachica

D. M.

℞. Hieræpicæ. ℥. vij.

Trium myrobalanorum, id est, Cepu-
larum, citrearum, Indarum añ. 3. iij.

Agarici. 3. ij.

Turbith boni. 3. x.

Epithymi Cretensis

Anisi añ. 3. ij. β.

Salis Indi. 3. ij.

Absinthij

Scammonij añ. 3. iij.

Penidiorum. 3. iij.

Succi cichorij quantum sufficit.

Catapotia stomachica pituita & bi-
le flaua ventriculum, hepar, caput, sen-
soria, iuncturas purgant. dantur. 3. ij.

Catapotia stomachica alia

D. M.

℞. Hieræ picræ. 3. x.

Trium myrobalanorum

Absinthij añ. 3. ij.

Mastiches

Anisi

Bellericarum

Emblicarum

Agarici añ. 3. iij. β.

Zingiberis. 3. ij.

Caryophyllorum

Salis gemmæ

Schoënu anthos añ. 3. j.

Turbith. 3. xij.

Succo absinthij conficiunt.

Catapotia hæc cerebrum & ventriculū corruptis humoribus purgant; ventriculū roborant, coctionem iuvant, appetentiam excitant. dantur 3. ij. vel iij.

Catapotia stomachica alia

D. M.

R. Turbith. 3. x.

Mastiches. 3. iij.

Rosarum. 3. iij.

Aloës bonæ pondus omnium

Succo absinthij comprehende.

Hæc stomachica ventriculū & caput purgāt: quovis tēpore sumi possūt.

Syluius dat à 3.i. ad 3.i.ß.

Catapotia diarrhodon

D. M.

℞. Trochiscorum diarrhodon

Absinthij añ. 3.v.

Summitatum schoenu anthus

Mastiches añ. 3.ij.

Salis Indi. 3.i.

Aloës bonæ pondus omnium

Aqua foliorum citri comprehenditur.

Diarrhodon hoc ventriculum fir-
mat, coctionem iuuat, oris odorem cõ-
mendat.

Catapotia ex eupatorio maiora

D. M.

℞. Myrobalanorum flauarum

Succi eupatorii

Succi absinthij añ. 3.ij.

Rhabarbari. 3.ij.ß.

Mastiches. 3.i.

Croci. 3.ß.

Aloës. 3.v.

Succo intybi formantur.

Catapotia ex eupatorio maiora obstructionem hepatis liberant, & icterum inde ortum, ac dolorem & febres circuitu repetētes sanant. Datur 3.i.β, etiam sine sero lactis.

Catapotia ex rhabarbaro

D. M.

℞. Rhabarbari. 3.viij.

Hammoniāci

Sagapēni

Bdellij añ. 3.x.

Cancami. 3.viij.

Opopanacis. 3.iiij.

Thymelææ

Gummi añ. 3.iiij.

Turbith. 3.x.

Spicæ

Polij

Aloës añ. 3.v.

Mastiches. 3.ij.

Myrobalanorum flauarum. 3. x.

Vino dissolue lachrymas & forma.

Catapotia hæc ex rhabarbaro præcedentibus vehementiora, ad hepatis & lienis obstructionem, & hydropen datur drachmis duabus cū aqua casei,

Catapotia ex halicacabo

D. M.

R. Absinthij

Succi absinthij

Succi eupatoriij

Aloës

Myrobalanorum flauarum

Mastiches

Croci

Rhabarbari

Cancami loti

Asari

Anisi

Cassia lignæ

Seminis fumarix añ. 3. ij.

Hieræ picræ. 3. iij.

Solani aqua confice.

Catapotia ex halicacabo à D. Mes.
inuenta, ad febres diuturnas ex humo-
ribus varijs ortas, obstructionem hepa-
tis soluunt, & inde ortum dolorem &
incipientem hydropem: dantur à ʒ. i.
ad aur. i. ʒ.

Catapotia ex thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ aceto infuso-
rum & exiccatorum añ. ʒ. v.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. iij.

Cepularum. ʒ. iij.

Mannæ

Tamar Indi aqua intybi soluti ana
quantum sufficit ad formandum.

Pillulæ mezereon serosum excremen-
tum valenter purgant, seu aquas: ob
id hydropem iuuant datæ à ʒ. i. ad
ʒ. iij.

Catapotia aurea ex turbith

D. M.

℞. Turbith boni. ʒ. xvi.

Aloës. ʒ. i. β.

Mastiches

Rosarum añ. ʒ. viij.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. x.

Croci. ʒ. iij.

Succo absinthij conficiuntur.

Catapotia aurea ex turbith bilem & pituitam citra molestiam purgant, hep-
par & ventriculum roborant, coctio-
nem iuuant.

Catapotia ex turbith alia

D. M.

℞. Turbith

Myrobalanorum flauarum

Aloës añ. ʒ. x.

Mastiches

Rosarum

Spicæ añ. ʒ. iij. β.

Anisi. ʒ. i. β.

Croci. ʒ. i.

Salis Indi addunt aliij 3.ij.

Idē promittūt quod aureæ ex turbith.

Catapotia ex lapide Armeno

D. M.

℞. Lapidis Armeni loti & præparati

Hieræ picræ añ. 3.v.

Epithymi

Polypodij añ. 3.viij.

Scammonij in cydonio cocti. 3.ij.

Caryophyllorum. 3.ij.

Salis Indi. 3.i.ß.

Succo solani conficiuntur.

Catapotia ex lapide Armeno melancholiam & bilem vſtam multiplicem vtranque clementer vacuant; ob id morbis inde natis conferunt.

Catapotia ex opopanace

D. M.

℞. Opopanacis

Hermodyli

Sagapeni

Bdellij

Hammoniaci

Colocynthidos añ. 3.v.

Croci

Castorij

Mirrhae

Zingiberis

Piperis

Macropiperis

Cassiae

Myrobalanorum flauarum, bellericarum, emblicarum añ. 3.i.

Scammonij. 3.ij.

Turbith. 3.iiij.

Aloës. 3.xij.

Aqua brassicae infundantur lachrymae
& conficiatur massa.

Catapotia ex opopanace ad paraly-
sim, spasmus cynicum, gonagram, po-
dagram, & aliorum articulorum dolo-
res, morbosque partium neruofarum fri-
gidos. dantur a 3.i. ad aur. i. cum aqua
chamæpityos.

*Catapotia ex hermodactylis
minora D. M.*

℞. Hermodactylorum. ʒ. v.

Scammoni. ʒ. ij. β.

Myrobalanorum flauarum. ʒ. iij.

Rosarum. ʒ. ij.

Aloës. ʒ. x.

Electario rosato forma.

Catapotia ex hermodactylis minora materiam ex iuncturis biliosam præsertim vacuant, sed & pituitam: ob id calidæ arthritidi & frigidæ cōducunt, & podagræ calidæ, data ad ʒ. ij.

*Catapotia ex hermodactylis
ex inuentione D. M.*

℞. Hermodactylorum

Aloës añ. ʒ. v.

Myrobala. flauarum

Turbith añ. ʒ. iij.

Zingiberis. ʒ. ij.

Electario rosato forma.

Catapotia Sabellia
secundum M.

℞. Spicæ Indæ. ʒ. v.

Spicæ Romanæ. ʒ. ij.

Rhabarbari

Agarici

Epithymi añ. ʒ. ij.

Costi

Mastiches

Chamædryos

Amomi añ. ʒ. ij.

Croci. ʒ. ij.

Myrrhæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Schoenu anthus añ. ʒ. i.

Aloës. ʒ. x.

Vino antiquo forma.

Catapotia Sabellia obstructions
ventriculi, hepatis, lienis sanant, &
hydropen materiamq; vacuant, data
ad ʒ. ij. cum vino.

Catapotia Inda Haly secundum Mesuem.

℞. Myrobalanorum nigrarum

Ellebori nigri

Polypodij añ. 3.v.

Epithymi

Stœchados añ. 3.vj.

Agarici

Lapidis cyanei loti

Colocynthidos

Salis Indi añ. 3.iiij.

Succi eupatoriij

Spicæ añ. 3.ij.

Caryophyllorum. 3.i.

Hieræ picræ. 3.xij.

Aprij succo fiat massa.

Catapotia Inda Haly secundū Mesuem ad affectus melancholicos, cancrum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholiam morbum, & inde ortum timorem & mœrorem, quartanam, icterum splenicum, splenis

dolorem . dantur à ʒ.ij. vsque ad aur.
ij. cum aqua casei. Salubria sunt & ex-
perta.

Catapotia ex colocynthide

D. M.

℞. Colocynthidos. ʒ.vi.
Myrobala. nigrarum & flauarum
Sagapeni
Bdellij
Sarcocollæ añ. ʒ.v.
Aloës. ʒ.vij.
Melanthij
Cumyni
Carnieni
Origani
Persici
Nasturtij albi
Salis gemmæ
Absinthij Romani añ. ʒ.i.
Succo porri infunde lachrymas et cum
cæteris finge massam.

Catapotia ex colocynthide ad affe-

ctus pituitosos & melancholicos, vt
alphos curatu difficiles: & iuncturarũ
dolores dantur à 3.i. ad aureum vnum.

Catapotia fœtida minora

D. M.

℞. Sagapeni

Hammoniacy

Opopanacy

Bdellij

Myrrhæ añ. 3.v.

Turbith. 3.x.

Colocynthidos. 3.vi.

Eadem præstant quæ maiora, sed mi-
nus tuta. Dantur à 3.ij. ad 3.i.

Catapotia sagapeni

D. M.

℞. Sagapeni

Hammoniacy

Bdellij

Opopanacy

Aloës

Castorij

Rutæ agrestis añ. 3. ij.

Colocynthidos. 3. iij.

Aqua porri fiat massa.

Catapotia sagapeni hæc pituitā len-
tam purgant: ob id iuuant paralyfin,
spasmodum, dolorem iuncturarum, dor-
si, podagram frigidam.

Catapotia ex sagapeno

D. M.

℞. Sagapeni, hammoniacci, opopana-
cis, bdellij añ. 3. ij. β.

Seminis apij

Ameos

Rutæ agrestis

Anisi añ. 3. i.

Acori

Lepidij Indi

Calaminthes.

Folij

Centaurij

Polij

Costi

Salis gemmæ añ. 3.β.

Aloës. 3.vi.

Colocynthidos. 3.v.

Ex sagapeno catapotia ad ischia-
dem, podagram & reliquarum iunctu-
rarum dolorem, ac etiam vteri, men-
fesq; mouent.

Ceratum œsypatum Galeni
secundum M.

℞. Ceræ flauæ. 3.ij.

Olei chamæmelini

Olei irini añ. 3.vi.

Mastiches. 3.i.

Spicæ nardi. 3.ij.β.

Croci. 3.i.β.

Terebinthinæ. 3.i.

Resinæ. 3.β.

Oesypti. 3.lxxx.

Oesyptum Galeni emollit & dige-
rit tumores duros hepatis, splenis, vte-
ri, neruorum, iuncturarum, & aliarum

partium, est $\sigma\beta$ anodinum.

*Ceratum æsypi Philagrii ad
eadem potens secundum
Mesuem.*

$\mathcal{R}.$ Croci. $\mathfrak{z}.$ v.

Bdellij

Mastiches

Hammoniaci

Aloës

Styracis liquidi añ. $\mathfrak{z}.$ viij.

Ceræ flauæ lb. i. β .

Olei nardini quantum sufficit.

Bdellium, hammoniaccū, aloë dissol
uantur in aqua, in qua foenumgræcum
& chamæmelum sunt macerata, cum
alijs misceantur in vnguentum.

Post Philargirum addiderunt

Succi squillæ. $\mathfrak{z}.$ iij.

Sepi vitulini. $\mathfrak{z}.$ xv.

Thuris. $\mathfrak{z}.$ i.

Ceræ quartaria. iij.

*Ceratum æsop. Pauli idem
pollens, secundum M.*

℞. Hammoniæ. 3. x.

Bdellij. 3. v.

Styracis liquidi *ucl*

Myrrhæ factis. 3. iij.

Croci. 3. j. β.

Aloës

Mastiches

Thuris añ. 3. ij. β.

Ceræ. 3. iij.

Sepi

Medullæ vituli añ. 3. ij.

Oesypi. 3. xl.

Olei irini quantum sufficit.

Cceratum santalinum

D. M.

℞. Rosarum. 3. xij.

Santalorum rub. 3. x.

Santali albi

Santali citrini añ. 3. vi.

Boli Armenicæ. 3. vñj.

Spodiñ. 3. iiñj.

Caphuræ. 3. ij. β.

Ceræ albæ. 3. xxx.

Olei rosati. lb. i.

Cera & oleum si lauentur fiet præstantius.

Ceratum santalinum phlegmonas, & intemperaturas omnes calidas ventriculi, hepatis, & partium aliarum, potentissimè extinguit.

Ceratum Galeni secundum Mesuem.

℞. Ceræ albæ. 3. i.

Olei rosati ex omphacino facti. 3. iiñj.

Aquæ fontis frigidissimæ quantum sufficit.

Aceti albi, clari modicum.

Ceratum multum diuq; laua aqua fontis, tandem addito aceto subige.

Ceratum Gal. valentius refrigerat, febribus ardentibus & cephalalgia ca

lenti & cum pulsu dolorifico saluber-
rimum.

Ceratum Gal. stomachicum
secundum M.

℞. Rosarum

Mastiches añ. ʒ. xx.

Foliorum absinthij siccorum. ʒ. xv.

Spicæ nardi. ʒ. x.

Ceræ. ʒ. iij.

Olei rosati lb. i. β.

Aquæ rosarum quantum sufficit ad la-
uandum.

Vini veteris & austeri

Succi cydoniorum añ. quantum suffi-
cit ad lauandum

Aceti modicum.

Omnia tenuissimè terantur: cera &
oleum igne lento liquentur & aqua ro-
sarum diu lauentur: liquentur iterum et
lauentur vino, succo & aceto: post mi-
sce reliqua & fiat ceratum.

Ceratum stomachicum Galeni ven-

triculum & hepar roborat : horum do-
lorem à frigido lenit , appetentiam ex-
citat, coctionem iuuat.

Ceratum diapente

D. M.

℞. Ceræ flauæ. ʒ. iij.

Styracis liquidi. ʒ. iij.

Terebinthinæ. ʒ. j.

Muccaginis ichthyocollæ uel

Gummi hederæ

Olei irini añ. quantum sufficit.

Ceratum diapente spasmus & ner-
uorum iuncturarumq; tumores duros
& nodosos lenit.

Cypheos Damocratis com- positio secundum Syl.

℞. Vuæ passæ pinguiſsimæ à qua cor-
tex ac semen totum sint exempta ,
carnis læuigatæ probæ. ʒ. xxiiij.
Atticas,

Terebinthinæ vstæ seu purgatæ. 3. x.
xiiij. Act.

Myrrhæ

Schoenu anthos añ. 3. xij.

Cinnamomi. 3. iiij.

Lachrymæ bdellij

Spicæ nardi

Cassia bonæ & puræ

Cyperij

Baccarum iuniperi

Calami odorati añ. 3. iiij.

Aspalathi. 3. ij. β.

Croci. 3. i.

Mellis

Vini añ. modus mediocris.

Bdellium, myrrham, vinum in mortario tere ad mellis liquidi crassitiem, melle superaddito. Vuam cum alijs tere. Omnia vbi erunt læuia iniice, fac cyclos paruos.

Cyphi naribus admouetur vt grato odore destillationes à capite in partes subiectas concoquat, & grauedine ob-

structioneꝫ nos liberet, & cerebri ven-
triculos purget, & pestilentibus mor-
bis resistat. Sumitur etiam per os cum
ad hæc, tum ad ea quæ pectori inherent
coquenda, necnon ad frigidos hepatis
affectus. Miscetur medicamentis præ-
cipuè epithematibus & antidotis quæ
inde Cyphoidea vocantur.

Ceratum Alexandri

secundum M.

℞. Comarum absinthij

Thuris añ. 3. x.

Hammoniaci

Styracis

Calamitæ añ. 3. xij.

Spicæ nardi. 3. iij.

Ceræ. 3. iij.

Olei chamæmelini quantum sufficit.

Hammoniacum & thus vino horis
xxiij. macerentur: oleum & cera li-
quentur igne; reliqua trita & creta in-
spargantur.

Ceratum Alexandri ventriculum et
vētrem reliquum inferiorem roborat,
ab hisque duritiem dissipat.

*Alterum eiusdem secun-
dum M.*

℞. Castorij
Euphorbij
Piperis longi & nigri añ. ʒ. i.
Hammoniaci
Opopanacis
Galliæ añ. ʒ. i. β.
Medullæ cruris cerui
Medullæ cruris vaccæ añ. ʒ. ij.
Terebinthinæ. ʒ. vi.
Styracis liquidi. ʒ. i.
Adipis gallinæ
Adipis anatis
Adipis anseris
Adipis porci añ. ʒ. i. β.
Ceræ. lb. i.
Olei veteris
Olei nardini

Olei irini

Olei laurini

Olei chamæmelini

Olei leucoſij lutei

Olei naphthici añ. ʒ. viij.

Olei balsami. ʒ. iiij.

Vini veteris quant. ſuf. ad macerandũ.

Oſſypſi. ʒ. iiij.

Ceratum hoc valenter ſcirrhus diſſi-
pat articulorum, & neruorum omnium
dolores & affectus diuturnos à frigido
natos, & contractiones, & paralyſin,
& torturam.

Ceratum Andromachi

ſecundum M.

℞. Styracis. ʒ. β.

Mastiſches. ʒ. i. β.

Folij

Spicæ nardi añ. ʒ. iij. β.

Euphorbij. ʒ. iij.

Cinnamomi. ʒ. vi.

Ceræ albæ. ʒ. xx.

Olei balanini. ℥.viij.

Olei balsami. ℥.xv.

Ceratum Andromachi ventriculum frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat: affectus neruorum & iuncturarum frigidus, vt duritię, dolores, tumores, quos dissoluit, si digeri sunt habiles: aut coquit, & suppurat, si maturari possunt.

Ceratum de euphorbio

D. M.

℞. Olei cinnamomi *aut*

Olei antiqui. lb. i.

Cerę fluxę. ℥.ij.

Euphorbię recentis. ℥.i.

Fiat ceratum pro parte conuulsa mirabile.

Ceratum ad hernias ex pelle arietina D. Arnaldi de Villa Noua sec. Syl.

℞. Lithargyri

Auri

Opij

Sedenegi

Sanguinis draconis

Boli Armeni

Mastiches

Hammoniacci

Mumiæ

Galbani

Thuris

Costi

Lumbricorum terrestrium añ. 3.ß.

Picis naualis

Picis Græcæ

Ceræ albæ

Ceræ rubræ añ. 3.i.

Radicum soldaginis maioris

Radicis soldaginis mediæ

Radicis soldaginis minoris añ. 3.ij.

Collirium album, quod im-
ponitur Rhasi.

℞. Cerusæ lotæ, 3.x.

Amyli. 3. iij.

Gummi Arabici

Tragacanthæ añ. 3. ij.

Camphoræ. 3. β.

Pulueranda puluerentur, & dissoluantur gummi in aqua rosata, & formentur trochisci.

Conserua Buglossæ.

℞. Florum buglossæ. ℥. i.

Terantur in vase lapideo, deinde proniciantur super eos

Zucchari. ℥. iij.

Fiat conserua in modum opiatæ.

Conserua buglossæ cor confortat, maniacis & melancholicis confert, & syncopi, & cordis tremorem aufert; valet etiam cholæræ.

Conserua Anthos.

℞. Florum anthos. ℥. β.

Zucchari. ℥. i. β.

Fiat conserua secundū artem, vt decet.

Conserua Anthos valet ad confortandum cerebrum humidum, & nervosa membra, & ad melancholiam & ad phlegma.

Conserua Boraginis.

℞. Florum boraginis. ℥. iij.
Zucchari. ℥. xij.

Fiat conserua secundum artem.

Conserua boraginis datur in tremore cordis, & in syncopi, gaudium enim generat, & confert melancholiæ.

Conserua rosarum.

℞. Foliorum rosarum. lb. j.
Terantur in vase lapideo
Deinde projiciantur super eos
Zucchari. lb. ij.

Fiat conserua in modum opiatæ.

Conserua rosarum stomachum, cor, & omnia viscera confortat, & ad molificationem eorum maximè confert, & melancholiæ.

Conserua Violarum.

℞. Florum Violarum. ℥. j.

Terantur in vase lapideo & proijciatur super eos

Zucchari. ℥. j. β.

Fiat conserua secundum artem.

Conserua Violarū valet ad inflammationem cholerae, sitim extinguit, & ventrem lubricat.

Conserua capillorum Veneris.

℞. Capillorum Ven. ℥. j.

Terantur sicut prius

Zucchari. ℥. ij.

Fiat conserua.

Conserua capillorū Ven. valet pleuresi, & affectibus pectoris, & pulmonis: in affectibus etiam melancholicis, & cholerae rubrae maximè prodest.

Conserua Acori.

℞. Radicis Acori. ℥. j.

Bulliat in aqua vsque dum cocta fuerit,

rit, postea pistetur & passetur per sedatium, deinde ponatur super ignem, addendo Zucchari. lb. iij.

Fiat conserua in modum opiatæ.

Conserua Acori valet ægritudinibus cerebri & neruorum, valet in affectibus phlegmaticis.

Conserua Enulæ campanæ.

℞. Radicis Enulæ campanæ. lb. ij.

Bulliat in aqua vsque dum cocta fuerit, postea pistetur & passetur per sedatium, deinde ponatur super ignem, addendo Zucchari. lb. vi.

Fiat conserua in forma opiatæ.

Conserua Enulæ campanæ valet ad confortandum stomachum, & membra nutritionis & ad phlegma.

Conserua Cicoreæ.

℞. Florum Cicoreæ. lb. i.

Terantur in vase lapideo, proijciaturque super eos

Zucchari. lb. iij.

Fiat conserua.

Conserua Cicoreæ valet melancholicis & cholericis.

Conserua Acetosæ.

R₂. Acetosæ. ℥.β.

Teratur sicut prius, prouinciaturq; super eam

Zucchari. ℥.i.β. Fiat conserua.

Conserua acetosæ valet cholericis.

Condîtum Cotoneorum, Gallicè Gelée de Coings.

Hoc tantum describemus, propterea quod pleraque alia condita, vt cerasorum, pirorum, nucum, &c. tam vulgaria sunt apud nos præsertim, vt prope modũ muliercula nulla sit in hac vrbe, atque adeò patria, quæ olim non edocta fuerit ab stultulo quodam, ita credere verisimile est, Pharmacopola huius vrbis, qui quum placere mulierculis studebat, proh dolor quod præci-

puum erat in arte nostra, omittebat: Vt
tinam hæc ignorarent vt pleraque alia,
ne dicam omnia, nostrates mulierculæ,
& quæ honestatem muliebre de-
ant, potissimum curarent: fieret fortasse
vt aliqua ex parte medica ars tam diui-
na melius & purius tractaretur. quod
de mulieribus dico, de insanis quibus-
dam empiricis dici etiam volo, qui di-
gniores illos videas qui hircos in pa-
scua ducant, quam qui ægrôtis phar-
maca præscribant, quorum stolidita-
tem miror quare ciues nostrates ferant.
His omisis, ad Conditum redeamus
quod fit sic:

℞. Cotoneorum quantitatem quam
volueris, & fac coquere, de quorum
decoctione accipe. ℞. iij.

Zucchari. ℞. i. β.

Et deinde ad perfectionem vsque
facito coquere, totumq; reserua. aliqui
addunt in clarificando, ouorum albu-
mina.

Alius modus.

℞. Seminum cotoneorum. ʒ. iiij.

Temperetur per dimidiū diem cum tribus lb. succi cotoneorum. Deinde bulliant parum, & colentur, addendo Zucchari. lb. ij.

Deinde coquantur ad perfectionem, & totum in pixidibus reserua.

Carnium cotoneorum.

℞. Carnis cotoneorum lb. vi. post decoctionem adde lb. iiij. zucchari, coquantur simul omnia vsque ad perfectionem, & vt dictum est, in pixidibus reserua, & pro ratione vtere.

Condītum de pomis

D. M.

℞. Carnium pomorum dulcium & redolentium. lb. vi.

Sacchari albi boni. lb. v.

Aquæ rosatæ. lb. ij.

Ligni aloës. ʒ. v.

De litera C.

69

Santali flauī. 3. iij.

Caryophyllorum. 3. iij.

Cinnamomi. 3. iij. β.

Ambræ. 3. ij.

Moschi. 3. ij.

Conditum de pomis salubre est ad
cordis & stomachi imbecillitatem, co-
ctiōemq; iuuandam.

Conditum ex persicis

D. M.

℞. Carnis persicorū prope maturorū

Succi aliorum persicorum añ. lb. iij.

Sacchari albi. lb. ij.

Ligni aloës

Santali flauī añ. 3. ij.

Cinnamomi

Cubebæ

Macis añ. 3. iij.

Moschi. 3. β.

Confice sic: Caro intus & extra pur-
gata, succum & saccharum tere in me-
dullæ consistentiam, & coque cum sy-

rupō, vt incōdito ex cydonijs diximus
Coctū pulueriza reliquis aromatibus.

Conditum ex persicis ventriculi ardorem mitigādo ipsum roborat, sitim extinguit, tetrum oris halitū emendat.

Conditum ex prunis

D. M.

℞. Carnium prunorum nigrorum, oblongorum, mediorum, subdulcium, elixatorum in aqua, cui portulaca incocta fuit. ℔. ij.

Sacchari albi. ℔. i.

Aquæ violarum ℔. ij.

Coque igne lento ad crassitudinem, & vase vitreo reconde.

Conditum ex prunis ventriculi ardorem, & inde natam sitim extinguit, febres mitigat, aluum soluit, datur ab aureis iij. ad vi.

Conditum ex sorbis

D. M.

℞. Carnis sorborum propemodū ma-

turorum coctorum in aqua, cui rosæ prius fuerint coctæ, & cortices granatorum lb. iiij.

Mellis *uel*

Sacchari lb. ij.

Conditum ex sorbis ventriculum roborat, immodicam purgationem sistit.
Datur ʒ. i.

Conditum citri

D. M.

℞. Corticum vel foliorum citri. ʒ. iiij.

Cydoniorum. ʒ. ij.

Pomorum odororum cum pondere aromatum lb. viij.

Mellis despumati

Sacchari albiſſimi

Aquæ rosarum añ. lb. ij.

Moschi gra. xv.

Poma odora frustatim secta cum corticibus vel folijs, cydonijs macerentur biduo in vino antiquo. Post aliquoties ferueſiant, & cum melle, saccharo,

aqua percoquantur in crassitudinem iulep. Demum moscho aromatizetur,

Vel sic:

Rx. Corticum citri. ʒ. viij.

Buglossi uel

Menthæ. ʒ. i. β.

Melissophylli. ʒ. β.

Caryophyllorum aur. ij.

Ligni aloës aur. β.

Vini boni. lb. iij.

Sacchari. lb. ij.

Galliæ aur. β.

Croci gra. xv.

Mastiches. ʒ. i.

Moschi gra. x.

Cortices, mentham vel buglossum, melissophyllum, caryophyllum, lignum aloës triduo in vino macerentur: post cum saccharo coquantur. Demum cum gallia, croco, moscho & mastiche aromatizentur.

Conditum citri cor, ventriculum, hepar roborat, coctionem iuuat, oris

gratiam commendat.

Condîtum ex fructibus

D. . M.

℞. Carnis cydoniorum

Carnis pyrorum austerorum

Carnis malorum acidorum añ. lb. i.

Aceti in quo rhus xxiiij. horis mace-
ratus fuerit, quantum sufficit.

Omphacij ex acinis cū seminibus mul-
tum diuq; tritis expressi. lb. i.

Carnis sorborum immaturorum. ʒ. v.

Sacchari. lb. iiij.

Succi baccarum oxyacanthæ. ʒ. ij.

Spodij

Seminis oxalidis añ. ʒ. i.

Carnes ex aceto forti coque, deinde
adde omphacium & sorborum carnem
cum saccharo, coque ad mellis crassi-
tudinem: tunc reliquis additis perco-
ctum vase vitreo conde.

Conditum ex fructibus appetentiam
excitat, & bilem flauam ex ventriculo

deturbat, eiusq; intemperiem calidam
corrigit. Datur à ʒ. ij. ad ʒ. iij. cū aqua
frigida, & succo citri, aut succo ribes,
aut alio eiusdem naturæ.

Condītum ex succo fructuum

D. M.

℞. Succī cydoniorum ad dimidias co
cti lb. ij.

Succī malorum syluestrium ad dimi
dias cocti

Succī pyrorum syluestrium ad dimi
dias cocti añ. lb. i.

Vini antiqui lb. ij.

Coque vt prius cum vel sine aroma
tibus, cum melle vel saccharo.

Condītum buglossi

D. M.

℞. Buglossi

Menthæ siccæ

Florum rosarum

Corticum aut foliorum citri añ. ʒ. iij.

Ocymī caryophyllati. ʒ. i.

Trium generum cydoniorum

Trium generum pomorum añ. ʒ. i. β.

Serici crudi incisi

Nucis moschatae

Zedoariae

Galangae

Been vtriusque

Santali citrini

Croci añ. ʒ. i. β.

Ligni Aloës. ʒ. ij.

Vini

Aquae añ. lb. vi.

Mellis lb. viij.

Moschi. ʒ. i.

Galliae. ʒ. ij.

Conditū buglossi efficax & exper-
tum ad cordis tremorem, stomachi im-
becillitatem, & formae corruptionem.

Diagalangae.

℞. Galangae

Ligni aloës añ. 3.vi.

Caryophyllorum

Maceros

Kesin, id est, ligustici añ. 3.ij.

Zingiberis

Macropiperis, id est, piperis longi

Cinnamomi

Piperis albi añ. 3.i.β.

Calaminthæ siccæ

Mentæ siccæ añ. 3.i.

Heyl, id est, cardamomi

Spicæ nardi

Seminis apij

Fœniculi

Anisi

Carui añ. 3.i.

Calami aromatici. 3.i.

Zucchari tabarzet. i. finissimi. 3.x.β.

Mellis despumati quod sufficit.

Diagalange dicitur à galanga ingrediente in hac confectione.

Diagalange Mesues valet contra morbos ventositatum grossarum, &

acetosam eructationem, & est medicina experta ad malitiam digestionis, & bonificat operationes stomachi, & hepatis frigidi, imò emēdat defectionem ipsorum.

Diacyminum.

℞. Cymini per diem infusi aceto & exiccati. ʒ. viij. ʒ. i.

Darseni, id est, cinnamomi grossi

Caryophyllorum añ. ʒ. ij. β.

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Zingiberis añ. ʒ. ij. gra. v.

Galangæ

Tymbræ, id est, Satureiæ

Calaminthæ añ. ʒ. i. ʒ. ij.

Ammis

Leuistichi añ. ʒ. i. gra. xvij.

Macropiperis, id est, piperis lōgi. ʒ. i.

Spicæ nardi

Cardamomi

Nucis moschatæ añ. ʒ. ij. β.

Mellis quod sufficit.

Diacyminum

D. M.

℞. Ligni Aloës

Spicæ nardi

Galliæ moschatæ

Cyperī

Calami aromatici añ. 3.ij.

Cymini Carmani aceto horis vigin-
ti quatuor macerati & torrefacti 3.ij.

Seminis porri torrefacti. 3.i.β.

Myrobalanorum emblicarū succo cy-
donij maceratarum & tostarū 3.ij.β.

Seminis nasturtij tosti. 3.vi.

Seminis vuarum passarum 3.v.

Baccarum myrti tenuissimè tritarum
3.xvi.

Balauſtij

Concharum vistarum

Thuris

Fructus tamaricis añ. 3.ij.β.

Ameos 3.ij.

Tere omnia tenuissimè, & iterum

vino odoro frangātur & siccentur: de-
inde frangantur aqua cydoniorum, aut
aqua baccarū myrti & hypocystidos
& siccentur, probeq; perficcata in va-
se vitreo iterum tere & miua excipe.
Dantur 3. iij. cum syrupo cydoniorū,
aut myrtino.

Diacyminum aliud

D. M.

℞. Cymini pridie in aceto macerati
& siccati. 3. x.

Zingiberis

Cinnamomi añ. 3. ij. β.

Galangæ

Piperis longi

Cardamomi añ. 3. ij.

Moschi. 3. β.

Mellis despumati quantum sufficit.

Vel sic,

℞. Cymini pridie in aceto macerati
& siccati 3. xx.

Zingiberis

Thymi añ. 3. ij.

Piperis

Cinnamomi añ. 3. ij.

Ameos. 3. l. β.

Foliorum rutæ siccorum

Nitri rubri añ. 3. β.

Melle despumato excipe.

Electarium diacyminum ventricu-
lum & viscera reliqua calfacit, coctio-
nem iuuat, flatus in dictis visceribus
natos dissipat.

Dialacca magna

D. M.

℞. Lacca lotæ

Rhabarbari añ. 3. ij.

Spicæ nardi

Mastiches

Schoenu anthus

Costi

Myrrhæ

Crocī

Cinna

Cinnamomi

Bdellij

Seminum apij

Anisi

Ameos

Fœniculi

Succi absinthij

Succi eupatorij

Sabinæ

Asari

Aristolochiæ

Gentianæ

Hyssoi siccæ

Amygdalarum amararum

Rubiæ añ. 3. i. β.

Piperis nigri

Zingiberis añ. 3. i.

Mellis despumati quantum sufficit.

Myrrham & bdellium vino infunde, cætera tere, omnia melle excipe.

Dialacca magna ventriculum & hepato roborat, hepatis obstructions aperit, eius scirrhum dissolvit, & ex his na

scientem cachexiam & hydropem sanat, vrinas mouet, lapidemq; renum & vesicæ frangit.

Dialacca minor

D. M.

℞. Lacca lotæ

Croci

Costi

Schoenu anthus

Rubiæ

Aristolochiæ longæ

Glycyrrhizæ

Piperis añ. 3.i.β.

Rhabarbari. 3.iij.

Myrrhæ

Bdellij añ. 3.i.

Mistis vt in priore. Nam & eadē præstat, sed inefficacius.

Diacoston

D. M.

℞. Costi amari

Cassia

Cinnamomi añ. 3.v.

Asari. 3.iiij.

Rhabarbari

Schoenu anthus

Seminum apij

Anisi añ. 3.ij.

Croci

Aristolochiæ

Myrrhæ añ. 3.ij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium diacoston obstructa viscera liberat, & inde natum dolorem mitigat: hydropen gigni coeptum perfici prohibet.

Diambre

D. M.

℞. Cinnamomi

Doronici

Caryophyllorum

Maceros

Nucis moschatae

Foliū

Galangæ añ. 3. iij.

Spicæ nardi

Cardamomi maio. & mino. añ. 3. i.

Zingiberis. 3. i. β.

Santali citrini

Ligni Aloës

Piperis longi añ. 3. iij.

Ambraë aur. i. id est. 3. i. β.

Moschi. 3. β.

Confice cum Syrupo rosarum, & aqua rosarum.

Diambra dicitur, ab Ambra ingrediente in bona quantitate.

Diambra Mesue, est medicina sublimis, cerebrum & cor confortans, & stomachum, ventremq; reliquum inferiorem, & omnia membra: digestionem procurat, & vtentem eo laxificat, & membra nutritionis calefacit: senibus quoque conuenit & frigidis natura, & mulieribus, & ægritudinibus matricum.

Diamargaritum calidum

D. N.

℞. Caryophyllorum
Cinnamomi
Spicæ nardi
Galangæ
Ligni Aloës
Liquiritiæ
Trochiscorum diarrhodon
Trochiscorum dia vi, scilicet de vio-
lis añ. 3. i. β.
Nucis moschatae
Maceros
Aliptæ moschatae
Zedoariæ
Rhabarbari
Styracis calamitæ añ. 3. i.
Margaritarum perforatarum, & non
perforatarum
Zingiberis
Osis cordis ceruini
Rasuræ eboris

Blattæ Bizantiæ añ. 3.ß.

Moschi

Ambræ

Cardamomi

Leuistichi

Seminis basiliconis añ. 3. i. gra. ij.

Camphoræ gra. vi.

Mellis rosati quod sufficit.

Diamargaritum dicitur, à margaritis quas recipit: calidum verò, ad differentiationem alterius.

Diamargaritum omnem virium imbecillitatem firmat, ijs quos animus deficit, siue à corde, siue à stomacho deliquium originem ducat: omnem noxam causam vitalium partium discutit: insuper suspiriosis, tussientibus, tabidis auxiliatur: longo morbo deiectiones, & imbecillitate languentes recreat, & ad robur pristinum reducit.

Diamargaritum frigidum.

℞. Sandalorum omnium

Florum rosarum
Florum violarum
Seminum Melonum mundatorum
Trochiscorum diarrhodon
Serici combusti añ. 3. ij.
Osis cordis ceruini
Spodij
Doronici Romani
Vtriusque behen
Nardi, siue spicæ nardi
Croci añ. 3. ij.
Margaritarum perforatarum, & non
perforatarum
Rasuræ eboris
Saphirorum
Hyacinthorum
Smaragdorum
Seminis acetosæ
Seminis endiuix
Ligni Aloës
Ambre griseæ añ. 3. β.
Auri optimi 3. i.
Camphoræ 3. i.

Mofchi gra.ij.

Mifce fimul, & fiat puluis.

Diamargaritum dicitur, à duobus generibus margaritarū perforatarum, & non perforatarum.

Diacomerôn.

℞. Anthofolij. i. caryophylli groffi
Zingiberis añ. 3. v. 3. i. gr. xvi.

Cinnamomi

Caryophyllorū añ. 3. iij. 3. i. gr. xvi.

Carnium dactylorum tantundem

Galangæ

Spicæ nardi

Zedoariæ

Costi

Pyrethri

Corallij alb. & rub.

Tragacanthæ

Rhapontici

Saliuncæ. pro Saliunca pone spicam
celticam.

Anacardij

Ossium dactylorum

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Anisi

Seminis Iuniperi ana 3. i. ʒ. ij. grāñ.

viij.

Limaturæ auri & argenti

Ossis cordis ceruini añ. ʒ. ij. β.

Rasuræ eboris

Moschi añ. ʒ. i. gr. viij.

Ambræ. ʒ. i.

Mellis rosacei (quod rhodomeli nominant) quantum satis esse videbitur.

Confectio hæc non præparatur, nec est in vsu: aliqui tamen hac confectio-
ne magistraliter vtuntur.

Diacomeron, id est, ducēs hominem de morte ad vitam, efficaciter prodest difficulter spirantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis, & omni pectoris & stomachi offensæ, aquæ subter cutem fusæ, renum doloribus; voluptatem parit; corpora saginat.

Diarrhodon Abbatis.

℞. Sandali albi & rub, añ. ʒ. ij. β.

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Spo. liñ añ. ʒ. ij.

Asari

Mastiches

Spicæ nardi

Cardamomi

Succi liquiritiæ

Croci

Xyloaloës

Caryophyllorum

Galliæ moschatæ

Anisi

Marathri

Cinnamomi

Rhabarbari electi

Seminis basiliconis

Berberis

Seminis scaristolæ

Seminis portulacæ

Seminis papaveris albi

Qua. semin. frigid, maio. añ. ʒ. β.

Margaritarum

Osis cordis ceruini añ. ʒ. β.

Zucchari candi

Rosarum añ. ʒ. i. ʒ. iij.

Camphoræ gra. viij.

Moschi gra. iij. β.

Et confice cum Syrupo de aqua rosarum

Diarrhodon autem dicitur, à rosis quæ recipiuntur ibi plus quàm de alijs speciebus: Abbatis dicitur, ab Abbate, quoniam Abbas quidam de curia eam composuit.

Diarrhodon datur propriè Ictericis, hepaticis, ethicis, cardiacis, & ijs qui patiuntur ex calore, & calefactione stomachi, pulmonis et totius corporis: & conualescētibus ex longis & acutis ægitudinibus mirabiliter auxiliatur.

Diarrhodon commune

D. M.

R. Rosarum rubrarum. 3. xxx.

Trochiscorum diarrhodi

Trochiscorum ex spodio

Glycyrrhizæ añ. 3. β.

Caryophyllorum

Trium santalorum

Galliæ moschatæ añ. 3. iij.

Spodij

Croci

Mastiches

Ligni Aloës añ. 3. ij.

Asari

Spicæ nardi Indicæ

Macis

Cardamomi

Seminum portulacæ

Lactucæ

Sereos

Scariolæ

Cucumeris

Cucurbitæ

Melonis

Citrulli
 Margaritarum albarum
 Ozymi caryophyllati
 Rasuræ eboris
 Tragacanthi
 Gummi Arabici añ. 3. i.
 Caphuræ. 3. i. β.
 Moschi. 3. β.
 Syrupo rosato
 Aqua rosarum excipitur.

Diarrhodon commune ventriculum
 & hepar roborat, coctionem ob id iu-
 uat, & dolorem horum à calēti & acri,
 ac mordente bile mitigat.

Diarrhodon Iacobi Syluij.

ꝛ. Sacchari. lb. i. β.
 Succi rosarum rubrarum. lb. iij.
 Scammoni. 3. i.
 Trium santalorum añ. 3. β.
 Galliæ moschatæ
 Trochiscorum oxyacanthæ añ. 3. iij.
 Mannæ. 3. vi.

Caphuræ. ʒ. i.

Melle coque & serua *aut*

Saccharo forma testellas.

Diarrhodon Syluij cholagogum ci-
tra molestiam cephalalgiam, arthriti-
dem, vertiginem, oculorum dolores,
icterum & cæteros affectus calidos &
biliosos mirè leuat.

Diacalamantha

D. N.

℞. Calaminthæ

Pulegij

Hyslopi

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Seselis

* Petroselinij añ. ʒ. iij. ʒ. ij. * *Petroselinum*

Leuistichi añ. ʒ. i. ʒ. i.

uerum ad nos

Aprij ʒ. i.

non portatur:

Ammis

igitur loco ue-

Thymi

ri, olusuri semi-

Anethi

ne utendū est.

Anisi

Cinnamomi

Zingiberis añ. ʒ. ij.

Mellis quod sufficit.

Diacalamintha dicitur, à calamintha ingrediente. valet præcipuè ad omne vitium pectoris ex frigidityte, & maximè his qui sunt in senili ætate, valet tussientibus ex frigida causa.

Diatrion piperèon

D. M.

℞. Trium piperum aur. v.

Zingiberis

Hascæ, id est, Thymi

Anisi añ. aur. ij.

Spicæ. quando simpliciter ponitur spica, de spica nardi intelligitur.

Ammis

* Amomi

* *Amomo uero
caremus.*

Cinnamomi añ. aur. j.

Cassie lignæ

Seminis Apri

Seminis fœelis

Asari

Enulæ siccæ añ. aur. β.

Confice cum melle despumato.

Aureus secundū modernos, est pondus drachmæ vnius, cum dimidia.

Diatrion pipereon dicitur, à tribus generibus piperum quæ ingrediuntur compositionem ipsius: et sunt propriæ, Nigrum, Album, & Longum.

Diatrion pipereon Mesue, quod calescit stomachum & ventrem, remouet dolorem eorum ex humiditatibus phlegmaticis multis & crudis, & mundificat stomachum ab ipsis, & valet contra acidos ructus, & digestionem procurat.

Diaprasium D. N.

℞. Prasii viridis. 3. v. & β.

Tragacanthæ

Pinearum

Amygdalarum dulcium

Pistaceorum, id est, fisticorum

Carnium

Carnium dactylorum

Ficum pinguium

Passularum enucleatarum añ. 3. iij. β.

Cinamomi

Caryophyllorum

Nucis moschatae

Maceros

Ligni Aloës

Galangae

Spicae nardi

Zingiberis

* Zedoariae

Liquiritiae

Rhapontici

Anacardi

Styracis calamitae

Galbani

Terebinthinæ

Mastiches

Myrrhæ

Iridis

Aristolochiæ rotundæ

Radicis capparis

** Zedoaria, radix nunc
uulgò nota, antiquis uel
incognita, uel sub alio no-
mine scripta.*

Gentianæ

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Anisi

Fœniculi

Anethi

Seminis apij

Petri Macedonici

Saxifragiæ añ. 3. ij.

Hermodactylorum

Origani

Peucedani

Schoenu anthus

Cardamomi

Leucopiperis, id est, piperis albi

Carui

Leuistichi

Vincetoxicū, id est, antipharmacum,
ait Nicolaus Florentinus, & est con
solida minor añ. 3. i. β. gr. ij. β.

Balsamitæ, id est, menthæ aquaticæ

Pulegij

Dictami

Costi

Pyrethri

Satureiæ

Basiliconis

Pæoniæ

Macropiperis, id est, piperis longi

Amomi

Orobis, id est, erui añ. 3. i. gr. ij. & tertiam partem alterius

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Cassie fistulæ

Coralli

Rasuræ eboris

Carpobalsami, id est, seminis balsami.

*Dauci añ. 3. β.

*Daucus Creticus

Moschi

eligendus.

Ambræ

Osis cordis ceruini añ. gr. xiiij.

Mellis despumati quod sufficit.

Confice sic: In quatuor libris mellis despumati pone prasij viridis aliquantum contusi 3. v. β. & pineas recentes & mundatas, & adde 3. iij. vini vetustissimi & optimi, & bulliant si-

mul lento igne ad vini consumptionē,
& caricæ bene purgatæ intus & extrâ,
& dactyli mûdati similiter, & passulæ
sine granis suis: pineæ autem & amygdalæ & pistacæ, omnia ista sint bene mundata, & vnumquodque per se bene pistetur, & postea simul misceantur in mortario, & addatur ibi terebinthina. At omnia insimul iterum pistentur, & cum supradictō melle calido in eodem mortario paulatim posito distemperentur, & postea addantur pulueribus aliarum specierū supradictarum.

Diaprasium autem secūdum intentionem Compositoris, dicitur à prasio viridi, quod ibi ponit̃ plusquā de alijs.

Diaprasium, ad omnē pectoris infirmitatem, & maxime ad catarrhum, & cerebri frigiditatem mirè prodest: sanat etiam capitis vertigines, oculorum caliginem, palatum, et arterias: ad omnem item speciem catarrhi quæ fit ex frigiditate, maximè confert, & den-

tium dolorem mitigat.

Diaireos simplicis antidotum.

℞. Iridis ℥. i.

Zucchari candi

Tragacanthæ frigidæ añ. 3. iij.

Misce & fac pulveres.

• Diairis autem dicitur, à radice illa
quæ Iris appellatur.

Diairis Salomonis.

D. N.

℞. Iridis ℥. i.

Pulegij

Hyslopi

Liquiritiæ añ. 3. vi.

Tragacanthæ

Amygdalarum

Pinearum

Cinnamomi

Zingiberis

Piperis añ. 3. iij.

Caricarum

Carnium dactylorum

Passularum enucleatarum añ. 3. iij. β.

Styracis rubei 3. ij. 3. j.

Mellis quod sufficit.

Diairis dicitur, à radice illa quæ Iris appellatur: & Salomonis, ab arcu cœlesti.

Diairis Salomonis, tussiculosis, & difficulter spirantibus auxiliatur: abscissæ vocis iacturam refarcit, quæ perfrictione contracta sit.

Diasulphur.

D. M.

℞. Piperis albi & longi añ. 3. vj.

Sulphuris flauī

Thuris

Mei

Hyoscyami albi

Myrrhæ

Styracis

Cardamomi añ. 3. viij.

Rutæ

Costi

Cassia añ. 3.v.

Opij

Mandragoræ añ. 3.iiij.

Croci 3.ij.β.

Melle despumato excipe: post sex
mensesytere.

Diasulphur confert febribus diuturnis, vt melancholicis, phlegmaticis: thoracem & pulmones purgat pituita crassa lenta purê: ob id tussim antiquā, & difficultatem spirādi inde natam leuat. Splenis duriciem minuit, & inde natum hydropem: vrinas mouet, calculum frangit: morsibus venenatis, & poto iam veneno prodest.

Diatragacantha calida.

℞. Gummi tragacanthæ

Hyssopi añ. 3.iiij.

Pinearum

Amygdalarum ambarū purgatarum

Seminis lini añ. 3.vj.

Seminis fœnigræci

Cinnamomi añ. ʒ.β.

Liquiritiæ, & succi eius

Zingiberis añ. ʒ.ñ.

Fiat puluis.

Diatragacantha dicitur, à tragacantha quam recipit: calida autem, ad differentiationem alterius descriptionis quæ diatragacantha frigida dicitur.

Diatragacantha calida datur in structura pectoris facta à materia frigida grossa & viscosa.

Diatragacantha frigida.

℞. Diatragacanthæ albæ. ʒ.ñ.

Gummi arabici ʒ. i. ʒ.ñ.

Amyli. ʒ.β.

Liquiritiæ. ʒ.ñ.

Penidiorum. ʒ. iñ.

Quatuor seminum frigidorum, maiorum & mundatorum añ. ʒ.ñ.

Camphoræ ʒ.β.

Syrupi violati quantum sufficit.

Diatragacantha frigida medetur

omnibus pulmonū & pectoris causa-
rijs: maximè tabidis, macie confectis,
inflammatione lateris laborantibus,
& omnibus tussibus, calidis & siccis,
exasperationi linguæ & gurgulionis.
continet autem ægrotans in ore, vt li-
quefactum deuoret, quoad perfectè ex-
purgatur.

Diamorôn Potio.

D. M.

℞. Succī mororum celsi domesticorum ℥.β.

Succī mororum rubi ℥.j.

Mellis ℥.β.

Sapæ ʒ. iij.

Intellige quòd sapa, mustum ad ter-
tiam vsq; partē decoctum, & siræum,
idem sunt.

Confice sic: Succum cū melle & sa-
pa in vase æneo vel stanneo ad prunas
leues, & ad perfectā decoctionem bul-
lire desine; dum autem scire volueris si

coctum fuerit, pone ex eo guttā vnam super marmor, & inclinato marmore si se vt mel retinuerit, coctum est: cola & reserua in vase stanneo.

Diamorum Mesues, conueniens ad apostemata gutturis, & vlcera, & ad omnia genera præfocationum.

Confectio de Iacur secundum intentionem Galen. est DIACODIUM purum, & sic est secundum ueritatem. huius meminit Luminare maius.

℞. Decem capita papaueris nigri, in quibus sit mediocritas inter paruitatem & magnitudinem, humiditatem & exiccationem, & proijciatur super ea aquæ sextarium vnum, id est, lib. ij. β. & sit aqua pluuialis. & si sint humida plusquam sicca, dimittantur die ac nocte: & si sint sicciora, dimittantur plus. tunc coque ea vsque dum decocta sint, & aquæ duæ partes sint con

sumptæ, tunc verò cola succum eius.

Diacodium dicitur, à codia, quod papauer nigrum interpretatur, quod ibi intrat.

Diacodium propriè datur omni solutioni ventris, maximè dysentericis cum decoctione aque pluuiialis, in qua sit spodium coctum, vel cum aqua rosata, & lientericis.

Diapapauer.

D. M.

℞. Papaueris albi ʒ. xxv.
 Amygdalarum dulc. excorticatarum
 Granorum pini excorticatarum
 Gummi arabici
 Tragacanthæ
 Succu liquiritiæ añ. ʒ. x.
 Amyli ʒ. iij.
 Seminis portulacæ
 Seminis lactucæ
 Seminis cotoneorum añ. ʒ. iij.
 Croci ʒ. i.

Penidiorum 3.iiij.

Syrupi de papauere quod sufficit.

Diapapauer, mirè prodest Ethicis,
Phthificis, & nimium vigilantibus.

Diacurcuma.

℞. Croci

Asari

Seminum petroselini

Dauci

Anisi

Seminis apij añ. 3.iiij.

Rauedseni, id est, Rheubarbari

Meu, id est, foeniculi erratici, cuius ra-
dix est tortuosa

Spicæ nardi añ. 3.vj.

Costi

Myrrhæ

Cassia lignæ

Schoenu anthos

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Rub. tinctorum

Succi absinthij

Succi Eupatoriꝝ

Opobalsa. id est, liquoris balsa. añ. 3. ij

Calami aromatici

Cinnamomi añ. 3. i. β.

Scordium quia non inuenimus in hac
regione, loco eius ponimus allium
agreste.

Scolopendriæ, siue ceterac

Succi liquiritiæ añ. 3. ij. β.

Tragacanthæ 3. i.

Confice cum melle despumato.

Diacurcuma dicitur, quia color asimi-
latur curcumæ: vel dicitur à croco, qui
in ea ingreditur in bona quantitate. Et
quia vocabulum est corruptum, dicitur
diacurcuma, sed debet dici diacrocum.

Melius tamen est, Manardi iudicio,
hanc dimittere, quia non bene confici-
tur: si quis tamen conficere eam velit,
videat ut habeat verum eupatorium:
nam quo passim utuntur, mendax est.

Diacurcuma magna Mesues, confe-
rens ad ægitudines antiquas, & cache

xiam, & hydropisim iuuamētum manifestum, & eradicat ægritudines hepatis & splenis quæ iam indurate sunt, & confert ad corruptionem stomachi, & humiditatem frigidā, & ventositates grossas in eis, & ad dolorem renum & vesicæ, & vrinam prouocat.

Diacurcuma minor.

D. M.

℞. Spicæ nardi

Myrrhæ

Cassia

Croci

Schoënu anthus

Costi

Cinnamomi añ. &c.

Melle despumato excipitur.

Eadem præstat quæ maior, sed imbecillius.

Diasatyriôn.

℞. Testium satyrî viridis

Bauciæ, id est, pastinacæ

Nucis Indicæ

Pinearum purgatarum

Pistaceorum, id est, fisticorum.

Secacul, id est, sigilli sanctæ Mariæ,
huius meminit Luminare maius.

Caryophyllorum añ. 3. xij.

Zingiberis

Anisi

Eruçæ

Lingue auis. i. seminis Fraxini añ. 3. v

Cinnamomi

Caudarum Stincorum recentium

Seminis Bulbi añ. 3. ij. β.

Moschi gr. v.

Confice sic: In tanto mellis despumati
quod sufficit, ponatur testiculi satyrj,
baucia, & secacul, vnumquodque per
se prius bene tritum, & similiter vnũ
quodq; in supradicto melle mittatur,
& cum spatula bene misceatur, & bul-
liat aliquantulum, deinde addantur pi-
næ & pistacæ bene tritæ. Et quum
aliquantulum bullire voluerint, depo-

nantur ab igne, & pulueres prædictarum specierum ibi commiscendo adiungantur: ad vltimum verò, muscus cum aqua rosarum apponatur, & sic vsui referuetur.

Diasatyrium dicitur à satyrii radicibus: satyriasis enim Græcè, Latine dicitur erectio virgæ.

Diasatyrium pollet contra vesicæ & renum imbecillitatem: ipsi etiã auxilio est, qui vrinã reddere nequeunt: venerẽ mirũ in modũ stimulat, eamq̃ certa de causa cessantẽ, haud segniter restituit.

Diasatyrium.

D. M.

℞ Radicum satyrii recentium ℔.i.

Lactis ouini recentis q.s.

Olei recentis amygdalarum dulcium
℥.iij.

Syrupi ex succo buglossi despumati
℔.ij.

Succi pomorum dulcium ℥.xij.

Saccha

Sacchari optimi lb. iij.

Cinnamomi 3.v.

Been albi & rubri. añ. 3.ij.

Lignialoës 3.ij.

Croci

Santali flauri

Tragacanthi

Gummi Arabici

Ocymi caryophyllati

Cubebæ

Macis añ. 3.i.β.

Radices tufas & cum lacte ad lactis
consumptionem prius coctas, tere pi-
stillo ligneo cum oleo amygdala-
rum: deinde syrupum, succum pomo-
rum cum saccharo prius coctum super-
funde, misce percoquendo. Postremo
ab igne deposito inijce reliqua.

Diasatyrium analepticum est & nu-
tritorium phthificis, hec̃ticis, vel ali-
ter consumptis & emaciatis. Datur
ab aur. iij ad v.

Diaprunis. D. N.

℞. Prunorum Damascenorum viridiū, numero C. Ponantur in vase stanneo, & cum tanto aquæ quòd bene cooperiantur, & bulliant donec dissolui videantur, & tunc ab igne deponantur: quumq; tepefacta fuerint aliquantulum, ab aqua extrahantur, & in cribro super cathinum posito, tandiu pruna manibus fricentur vt nihil remaneat præter ossa & cortices: & in aqua in qua pruna cocta fuerint, ponatur ʒ. i. β. violarum, & iterum bullire permittantur. Et fiat Syrupus cum duabus libris zucchari, in quo Syrupo ponatur pulpa talis prunorū. Et ad spissitudinē coquantur, & incipiēte inspissari, ponatur cassiæ fistulæ mundæ cum prædicta aqua ʒ. i. Tamarindorum in prædicta aqua similiter prius dissolutorum & colatorum per caciā ʒ. i. Memento tamen quòd in prædicta

aqua prunorum bulliat 3. i. β. violarum, vt dictum est. Et coquantur ad perfectionem, semper & indefinenter agitādo cum spatula. Quumq; ad perfectionem decoctionis deuenierit, deponē ab igne, & semper cum spatula mouendo, pulueres harum specierum de super asperge,

Santali

Spodi

Rheubarbari

Rosarum

Violarum

Seminis portulacæ

Seminis scariolæ

Berberis

Succi liquiritiæ

Tragacanthæ añ. 3. ij.

Seminum frigidorum maio. añ. 3. i.

Si verò laxatiuū facere volueris, adde in vnaquaque libra quum ab igne deponitur.

Scammoniæ 3. β.

Diaprunis non solutium Nicolai, datur acutas & peracutas patientibus, & maximè caufoni & syncho in principio, in augmento & statu ægritudinis: & sine diagridio potest exhiberi in omni hora diei: cum diagridio verò, in aurora matutinali, & cum caute-la, quoniam est solutium forte.

Diaprunis autē, vel Diamascenon, à prunis damascenis dicitur, & ipsum potes componere solutium, & non solutium: & vtrunque est in vfu.

Diacydonium Galeni, secundum Sylium.

℞. Carnis cydoniorum

Mellis

Aceti albi añ. lb. iij.

Piperis

Zingiberis añ. ʒ. iij.

Petroselini Macedonici ʒ. i.

Diacydonium appetentiā languentem excitat, coctionem ciborum iuuat,

iecur & ventrem totum roborat: ventriculi dispositiones propè omnes, exceptis quæ ab æstu vehementi fiunt, modicè iuuat.

Aliud eiusdem secundum eundem Syluium.

℞. Succī malorum cotoneorum struthiorum.

Mellis Attici añ. sextarios Rom. ij.

Aceti sext. j. β.

Zingiberis ℥. iij.

Piperis ℥. ij.

At in calido ventriculo & bilioso aufer piper & zingiber.

Diacydonium.

D. M.

℞. Succī cydoniorum

Mellis despumati añ. lb. iij.

Aceti lb. ij.

Piperis longi

Zingiberis

Cinnamomi añ. ʒ. i.

Caryophyllorum

Ligni aloës añ. ʒ. ʒ.

Moschi ʒ. iij.

Succum, mel, acetum igne lento coque continenter despumando ad mellis crassitudinem: tunc insperge cætera.

Diacydonium ex succis cydoniorum appetentiam languentem excitat, ventriculum & hepar roborat, coctionem iuuat & retentionem, eam restringendo.

Diacydonium aliud

D. M.

℞. Carnis cydoniorum in vino coctorum

Mellis despumati añ. lb. iij.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Cardamomi

Galangæ añ. ʒ. i.

Cinnamomi crassi ʒ. iij.

Zingiberis

Piperis longi

Macis añ. 3. iij.

Carnem & mel igne lento percoque,
tunc adde reliqua.

Diacydonium hoc firmat ventricu-
lum, coctionem iuuat, vomitum bilio-
sum & pituitosum sistit, colorem cor-
poris floridum efficit.

Diacydonion cholagogum.

D. M.

R. Succicydoniorum lb. iij.

Mellis albi lb. ij.

Scammoni ʒ. i. β.

Galliæ bonæ

Caryophyllorum

Zingiberis

Mastiches

Piperis longi

Cinnamomi

Nucis moschatæ añ. 3. iij.

At si cholagogum simul & phlegma-

gogum facere velis

R̄. Scammonij 3.v.

Turbith 3.xij.

Si solum phlegmagogum, abiecto
scammonio

R̄. Turbith 3.xxv.

Cnici excorticati pondus scammonij.

Si bilem atrā vacuare velis, horū loco

R̄. Elleborum nigrum, vel huius loco
epithymum.

Quidam cum saccharo coquunt: alij
cum carnibus tantum, alij cum succo
tantum, alij cum ambobus.

Diacydonium hoc colico dolori,
& alijs partium nutritoriarum morbis
salubre datur ab aur. i. ad iij.

*Διὰ καρύων Galeni, secun-
dum Syluium.*

R̄. Succī corticis exterioris nucum
virentium in pila contusarum

Mellis optimi ana partes æquales.

Coque hæc ad mellis spissitudinem

& vtere.

Διὰ κηρύων efficacissimum ad oris
vulnera vt & quæ sequuntur simili mo-
do ac ratione parata stomatica: διὰ γλίω
κηϑ, διὰ ρότων, διὰ μήλων &c.

Diaphœnicon.

℞. Dactylorum κερρώων infusorum in
aceto, tribus diebus ac tribus nocti-
bus ʒ. vi. ʒ. ij.

Penidiorum sahari, id est, penidiorum
quæ fiunt ex Zuccharo dissoluto in
aqua decoctionis hordei ʒ. iij. ʒ. i.

Amygdalarum mundatarum ʒ. xv.

Turbith ʒ. ij. β.

Scammonia ʒ. vi.

Zingiberis

Piperis longi

Foliorum rutæ siccorum

Cinnamomi

Maceros

Ligni Aloës

Anisi

Foeniculi

Dauci

Galangæ añ. ʒ. i. gr. xv.

Fiat omnium trituration bona, & conficiatur cum melle despumato.

Diaphœnicon autē dicitur propter dactylos qui ingrediuntur. Inde confectio de dactylis, id est diaphœnicon, vt dicit Mesue.

Diaphœnicon Mesues, cōferens ad febres compositas, est medicina securitatis; confert etiā ad colicam, & dolorē ventris, humorem crudum, & frigora.

Diaphysalidon

D. M.

℞. Succorum lupi salictarij

Intybi

Aprij purgatorum añ. lb. iiij.

Myrobalanorum citrearum, cepularum añ. ʒ. xij.

Emblicarum ʒ. l.

Indarum, bellericarum añ. ʒ. viij.

Agarici

Ireos añ. 3. x.

Absinthij

Calluthæ

Radicis apij

Fœniculi

Anisi añ. 3. iij.

Vuarum passarũ mundatarũ. 3. lxxx.

Tamar Indorum

Cheiri

Cassia fistulæ añ. 3. viij.

Mannæ 3. iij.

Penidiorum hordeatorum lb. iij.

Olei Sesamini recentis 3. v.

Trochiscorum diarrhodon

Trochiscorum de eupatorio

Trochiscorum de absinthio

Trochiscorũ de rhabarbaro añ. 3. i. β.

Ireos 3. i.

Agarici

Foliorum thymelææ nutritorum in a-

ceto añ. aur. viij.

Scammonij

Succi eupatorii

Succi absinthij

Croci

Laccæ lotæ

Mirobalanorum citrearum, cepularum añ.aur.iiij.

Bellericarum, emblicarum Indarum añ.aur.ij.

Spicæ

Anisi añ.aur.ij.

Turbith ʒ.vi.

Olei thymelææ ʒ.iiij.

Myrobalana, agaricum, irin, absinthiū, cassutha, radices omnes, vuas passas, in succis indita coquuntur igne lento ad consumptionem succorum dimidij: manibus fricantur probè & colantur. Vni huius parti adde tamar Indorum, cheiri, cassiam, mannam: cola & munda. Alteri succorum parti adde penidia hordeata: misce omnia simul: bis feruefiant: tunc adde oleum sesaminum: percoque ad mellis crassitudi-

nem, ab igne depositis adde trochiscos
& reliqua.

Alkekangi efficacissimū est ad hydropem & cachexiam & affectus hepatis, lienis, iuncturarū, lubricitatem partium nutritoriarum, formæ corruptionem, hæmorroidas.

Diacartami.

℞. Pul. Tragacanthæ frigidæ ʒ.β.

Carnium cotoneorum ʒ.i.

Medullæ cartami ʒ.iiij.

Zingiberis alb. ʒ.ij.

Diagridij ʒ.ij.

Turbith alb. ʒ.vj.

Mannæ granatæ ʒ.ij.

Mellis rosati colati ʒ.i.

Zucchari ʒ.vij.

Hermodylorum ʒ.iiij.

Fiat Electuarium, addendo

Zucchari quod sufficit.

Diacartamū magistrale prodest in euacuatione cholæræ & phlegmatis.

Diacalaminthum

D. M.

℞. Calaminthes fluuialis & montanæ
 Seseleos
 Petroselini
 Ligustici añ. 3.vi.
 Zingiberis 3.iij.
 Seminis apij
 Summitatum thymi añ. 3.ij.
 Piperis nigri 3.i.ß.
 Melle despumato excipe.

Electarium diacalaminthæ Galeni
 humores crassos & lentos tenuat, fla-
 tus etiam crassos dissipat, singultum
 inde natum vehementem soluit.

*Dianacardon Actuarij**secundum Syl.*

℞. Anacardiorum
 Epithymi
 Acori
 Piperis

Saxifragæ

Mastiches

Iridis

Myrobalani singulorum quadrantem

Croci

Cassia

Foliij

Spicæ Nardi

Mei

Agarici

Iunci odorati

Rhei sing. fescunciam

Aloës sextantem

Caryophyllorum ʒ.i.

Mellis quantum sufficit.

Dianacardon Actuarij ad vertiginos, comitiales, difficulter spirātes, & ileosos, menses pellit, incipientem hydropen, & cachexiam sanat.

Diacorallium magistrale.

℞. Specierū diarrhodō Abbatis ʒ.iiij.

Vtriusque corallij

Fragmentorum pretiosorum

Margaritarum nō perforatarū añ. 3.β.

Puluerentur subtiliter, & addatur

Zucchari dissoluti in aqua Rosarum
3.vñ.β.

Et fiat confectio in morsellis.

Diacorallium dicitur, à Corallo
ingrediente compositionem ipsius.

Diacorallium magistrale mirabili
ter valens ad confortationem cordis
& stomachi, & maximè quum ex longa
egritudine & calida sunt debilitata.

*Diacassia fistula magistra-
lis pro enematibus.*

℞. Florum Violarum

Matrum violarum, id est, foliorum

Maluarum

Mercurialis

Bletarum, id est, Cicle

Parietariæ añ. M.i.

Absinthij Rom. añ. M.β.

Omniū viridiū, fiat ex his decoctio
in suf

in sufficienti quantitate aquæ, postea
coletur manibus exprimendo, in qua
colatura dissolue

Cassia fistulæ lb. i.

Mellis electi lb. β.

Coquatur totum vsque ad consum-
ptionem decoctionis.

Diacassia autem dicitur, quòd in
ipsa cassia ingreditur.

Diacassia est lenitiua ventris & le-
nis, & est medicina pro delicatis, ca-
rens acuitate & mordicatione, & om-
ni excessu lædente.

Diacassia

D. N.

℞. Succorum violæ

Betæ

Mercurialis

Maluæ

Herbæ muralis añ. quartarium. i.

Succi absinthij Pontici ℥. ij.

Mellis quantum sufficit.

Medullæ cassiæ lb. j.

Succos cum melle ad iustam crassitiem coque, tunc adde cassiam.

Diacassia vtile catharticum pauperibus, etiam diuitum clysteribus per commodum.

Diasene D. N.

℞. Ligni aloës

Caryophyllorum

Galangæ

Nucis moschatæ

*Folij

Maceros

Cinnamomi añ. ʒ. ij.

Lapidis lazuli

Lapidis armenici añ. ʒ. ij. β.

Senæ in duplo prædictorum

Croci ʒ. j.

Serici crudi & combusti añ. ʒ. ij.

Rasuræ eboris

Spodij

Anacardij

*Folium, Græci

μαλάκιδον νο-

cant.

Osis cordis ceruini

Blattæ bizantiæ añ. 3. ij.

Hermodactylorum 3. i.

Myrrhæ

Gentianæ

Baccarum lauri

Ellebori nigri añ. 3. ij.

Auellanarum combustarum num̃, xv.

Ambræ 3. ij.

Mellis quantum sufficit.

Quidam addũt pro leprosis, Carnium
serpentum 3. ij.

Diasene sic dicitur, quia plus de sena
ingreditur descriptionem hanc, quàm
de alijs speciebus.

Diasene valet propriè melancholi-
cis, maniacis, cardiacis, & tristibus,
quartanarijs & spleneticis.

Confectio hæc non præparatur, nec
est in vsu apud nos: aliqui tamen hac
vtuntur.

Decoctio pectoralis.

℞. Hyssopi siccæ
Capillorum Veneris
Ficuum
Dactylorum
Sebesten
Passularum
Hordei

Liquiritiæ añ. partes æquales.

Bulliant hæc in aqua sufficientis
quantitatis secundum artem, deinde co-
lentur & reseruentur.

Decoctionis pectoralis magistralis, le-
niens pectus & conferens ad tussim, &
raucedinem vocis.

Decoctionis communis.

℞. Prunorum
Thamarindorum
Passularum
Violarum
Liquiritiæ
Hordei añ. partes æquales.

Bulliant hæc in aqua sufficientis

quantitatis secundum artem, & colentur, & reserua.

Decoctionis communis, quæ in acutis febribus, & alijs passionibus calidis, & tempore calido est multum in usu ad distemperandum medicinas, quæ in his temporibus & passionibus assumuntur: variantur autem istæ decoctiones à medicis peritis secundum diuersitatem ægritudinum magis & minus calidarum, & in exigentia dispositionum.

Decoctionis adianthi albi D. M.

℞. Adianthi albi ℥.i.β.

Fumariæ ℥.i.

Lupi salictarij

Violarum siccarum añ. 3. viij.

Pruna num. xl.

Zizipha num. xx.

Aquæ lb. iij.

Cassie fistulæ purgatæ ℥.iij.

Tamar Indorum ℥.ij.

Mannæ ℥.i.

Rhabarbari boni ʒ.iiij.

Confice sic: Omnibus in aqua coctis ad duarum librarum consumptionem, adde cassiam, tamar Indorum, mannam & rhabarbarum, frica manibus & cola. Interdum loco aquæ, coquuntur hæc in seri lactis caprini lb.iiij.

Apozema adianthi albi sanguinem à mistis ipsi putribus materijs purgat, clarumq; reddit, & ardorem ipsius & fluxibilis compescit.

Decoctum fumarie

D. M.

℞. Succi cichorij

Succi intybi

Succi lupi

Succi buglossi añ. ʒ.iiij.

Succi fumarie ʒ.i.β.

Myrobalanorum flauarum & Indarum añ. ʒ.ij.

Passarum purgatarum tritarum ʒ.i.

Tamar Indorum ʒ.iiij.

Succis coctis & purgatis adduntur
myrobalani, passulæ & tamar Indi, vt
artis est.

Decoctum fumarix sanguinem bi-
le flaua, & adustis humoribus purgat,
nundumq; reddit: hepatis obstructio-
nem aperit, ac inde natum icterum
sanat.

Decoctum thymi

D. M.

℞. Thymi

Cassuthæ

Hyssopi añ. ʒ. i.

Passarum purgatarum ʒ. xx.

Cepularum, emblicarum añ. ʒ. i.

Turbith ʒ. iiij.

Stechados

Polypodij añ. ʒ. v.

Eupatoriij

Abſinthij

Anisi

Lauci añ. ʒ. iiij.

Radiciſ apij

Radiciſ fœniculi añ. 3. viij.

Turbith

Agarici añ. 3. i.

Zingiberis 3. β.

Aquæ lib. iij.

Facta coctione ad librarum duarum
conſumptionem, colato adde turbith,
agaricum, zingiber, macerari per no-
ctem ſine, poſtridie cola & vtere.

Decoctionum hoc phlegmagogum,
ob id ſenibus & aliter pituitoliſ ſalu-
bre, ventriculum firmat, coctionem iu-
uat, flatuſ à viſceribus & hypochon-
drijs diſſoluit.

Decoctionum myrobalanorum

D. M.

℞. Myrobalanorum flauarum

Cepularum Indarum añ. 3. i.

Tamar Indorum 3. i. β.

Fumariæ 3. viij.

Absinthij 3. ij.

Pruna num̄. xxx.

Pasſularum purgatarum ℥.j.

Aquæ lb. iij.

Cassia ℥.ij. vel. j. & tunc

Turbith

Agarici añ. ʒ.β.

Aqua cum alijs ad duarū librarum
consumptionem cocta, reliquæ libræ
adde cassia ℥.ij. sine turbith & agari-
co: quæ cum vna libra cassia adduntur
cum valentius cupimus, & cum aqua
casei coquimus.

Apozema myrobalanorum bilem
vtramq; & pituitam purgat.

Decoctum stœchados

D. M.

℞. Stœchados

Origani añ. ʒ. iij.

Seminis apij

Seminis fœniculi

Eupatoriñ añ. ʒ. iij.

Schœnanthi

Hyssopi añ. 3. ij.

Passularum purgatarum 3. viij.

Turbith albi arundinacei 3. iij.

Decoctum stœchados confert pituitosis affectibus, vt febribus quotidianis, iuncturarum & neruorum dolori & frigida intemperiei.

Decoctum eupatoriij

D. M.

R. Eupatoriij

Absinthij

Asari

Spicæ

Adianthi albi

*Cyperi

Rhabarbari

Fumariæ

*Spinæ albæ

*Spinæ Aegyptiæ añ. 3. iij. *sucaba.

Cepularum, Indarum añ. 3. viij.

Passarum purgatarum 3. i.

Decoctum eupatoriij, hepatis & lie.

* alij cypri, id est,
florum ligustri.

* bedagar.

nis obstructionem, & inde nascentes
dolores & febres compositas iuuat,

Decoctum epithymi

D. M.

℞. Myrobalanorum Indarum

Stœchados

Epithymi

Passarum purgatarum añ. ʒ. i.

Cepularum

Fumarix añ. ʒ. iiij.

Folliculorum senæ ʒ. viij.

Polypodij ʒ. vi.

Turbith ʒ. iiij.

Eupatoriij ʒ. v.

Aquæ casei lb. iij.

Ellebori nigri ʒ. i.

Agarici ʒ. β.

Salis Indi aur. i.

Omnia præter epithymum conco-
quantur in aqua casei ad duarum libra-
rum consumptionem; tunc adde epi-

thymum, & semel feruefac, cola, frica
in eo elleborum, agaricum, & sal.

Decoctum epithymi atram bilem
vacuat, ob id affectibus melancholi-
cis, vt cancro, elephantiasi, & cate-
ris confert.

Diacaryon

D. M.

℞. Succum ex corticibus nucum viridi-
um, canicularibus diebus extractum,
semel feruefactum lb. iij.

Mellis lb. ij. additis coquuntur ad mel-
lis crassitiem.

Diacaryon efficax est ad catarrhum
acrem & tenuem à capite in asperam
arteriam, pulmones, thoracem, à quo
phlegmone, suffocatio, mors impen-
det. Idcirco medicamentum pueris, mu-
lieribus, & natura humidis salubre est.
Quod si phlegmone initium, adstrin-
gentium aliquid miscendum est, vt
rosa, balaustium; si in statu, crocus &

myrrha : si in declinatione , nitrum &
sal hammoniacus, & similia.

Electuarium

Catholicum.

℞. Sene bene mundatæ
Cassia fistulæ mundæ
Thamarindorum añ. ʒ. viij.
Rheubarbari
Violarum
Polypodij
Anisi añ. ʒ. iiij.
Liquiritiæ mundatæ
Penidiorum
Zucchari candi añ. ʒ. iiij.
Quatuor seminum frigidorum maio-
rum añ. ʒ. i.
Tunc accipe libram vnā polypodij,
& tere , & in aqua diutissimè deco-
que, & ex colatura fac Syrupum cum
viij. lb. zucchari, distempera cassiam

fistulam & Thamarindos, & in fine decoctionis, species pone, deinde confice electarium.

Catholicon dicitur, ab inuentoris descriptione.

D I A C A T H O L I C O N
Nic. datur in acutis & peracutis, quia mollificat, digerit, & confortat, valet hepaticis & spleneticis.

*Electarium de succo
rosarum.*

Rx. Zucchari
Succi rosarum añ. lb. i. ʒ. iiij.
Trium sandalorum añ. ʒ. vi.
Spodiij ʒ. iij.
Diagridij ʒ. xij.
Camphoræ ʒ. i.

Tempera ad modum Electarij cum syrupo facto de eodem Zuccharo & Rosis.

Dicitur autem Electarium de suc-

co rosarum, ab eodem succo quem recipit.

Electarium Rosarum Mesues solutione educens choleram sine molestia, & valet ad ægritudines ex ea factas, & ad ægritudines iuncturarum calidas, & ad sodam calidam, & vertiginem, & oculorum dolores, & ad icteritiam citrinam, & est sanum & expertum.

Electarium de Psyllio.

℞. Succu Buglossæ sylvestris & domesticæ

Succi Endiviæ

Succi Apij, coctorum & depuratorum
añ. lb. ij.

Et proijce desuper,

Seminis cuscutæ

Anisi

Folliculorum senæ añ. ʒ. β.

Capillorum Veneris M. j.

Succi sumiterræ ʒ. iij.

Asari ℥.iiij.

Spicæ, siue spicæ nardi 3.ij.

Dimitte die ac nocte, deinde bulliat ebullitione vna, & proijciatur desuper

Violarum viridiū, aut siccarum 3.iiij.

Epithymi 3.ij.

Et bulliant iterum alia ebullitione parua, deinde coletur & exprimatur, & in colatura ponantur

Psyllij 3.iiij.

Et dimittantur per diem & noctem, omni hora tamen agitando cum spatula, deinde exprimatur viscositas tota, deinde accipe huius viscositatis lb. iiij. & proijce desuper

Zucchari albi lb. ij. β.

Scammonix coctæ in pomo 3.iiij. β.

Et coquatur cum facilitate, & postquam coctum fuerit, proijciatur super ipsum puluis

Trochiscorum Diarrhodon

Trochiscorum de Spodio

Trochiscorum de Rhabarbaro añ. 3. j.

Trochiscorum de Berberis 3. β.

Hic debet grosso modo puluerari Asarum, vt sit magis solutiuum, quàm pro uocatiuum. In hac etiam confectiōe ponitur, violarum viridium: in alia prunorum: & vtraque litera est bona, & conueniunt proposito: & adhuc erit melius si vtrunq; ponatur, scilicet violæ, & prunæ: sed debent poni pruna sicca non viridia.

Nicolaus in suo Antidotario inquit, electarium Psylliticum, à psyllio dictum.

Electarium de Psyllio Mesue, solutione educens choleram citrinam, & conferens ad vertiginem quæ fit à fumis cholericis.

Electarium dianifon

D. M.

℞. Anisi 3. xx.
Glycyrrhizæ

Mastiches añ. ʒ. i.

Foeniculi

Carui

Macis

Galangæ

Zingiberis

Cinnamomi añ. ʒ. v.

Trium piperum

Calaminthes

Pyrethri

Cassia añ. ʒ. ij.

Cardamomi

Caryophyllorum

Cubebæ

Croci

Spicæ nardi añ. ʒ. i. β.

Sacchari ʒ. ij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium dianison intemperiem
frigida ventriculi à pituita cruda vel
etiam flatibus sanat, & tussim diutur-
nam à frigida causa genitam.

Electarium de cinnamomo

D. M.

℞. Cinnamomi subtilis ℥. xv.

Cinnamomi crassi

Cymini

Enulæ campanæ añ. ℥. β.

Galangæ ℥. vñ.

Caryophyllorum

Piperis longi

Cardamomi vtriusque

Zingiberis

Macis

Nucis moschatæ

Ligni aloës añ. ℥. iñ.

Crocī ℥. j.

Sacchari ℥. v.

Mellis despumatis, quantum sufficit.

Sacchari leuissimè tritū duplo ad pul-
 ueres tenuissimos, pondere excipi-
 unt, & siccum seruant.

Moschi secundum alios ℥. ñ.

Electariū de cinnamomo coctionem

iuuat, etiam pituitæ putredinem prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet.

Electarium de aromatibus

D. M.

℞. Ligni aloës crudi

Rosarum añ. aur. xij.

Calami aromatici aur. iij.

Galliæ moschatae

Menthæ siccae

Spicæ nardi

Cassiae

Mastiches

Cinnamomi

Caryophyllorum

Asari añ. aur. iij.

Croci

Cardamomi maioris & minoris

Trium fantalorum

Rhabarbari

Costi

Cubearum

Zingiberis

seminis fœniculi

seminis anisi

seminis ligustici añ. aur. ij.

sacchari ℥.vi.

Mixturæ aromaticæ ℥.xij.

Mellis despumati quantum sufficit.

Electarium de aromatibus ad ventericulum & hepatis affectus frigidos, & pituita crassa & flatibus natos effluat. Flatus enim discutit, coctionem iuvat: ob id acidos ructus, nauseam, cibi fastidium compescit, colorem cuti floridum affert, canitiem tardat, oris & odoris odorem commendat: sed hepar & renes immodicè calfacit, ac inde senectutem & venerem promouet. Datur à .ij. vsq; ad aur. vi.

Electarium de baccis myrti

D. M.

Baccarum myrti tenuissimè triturarum lb. j.

Myrobalanorum nigrarum

Bellericarum

Emblicarum in aqua cydoniorum &
vino odorifero semel feruefactarum
añ. 3.vij.

Seminum anisi

Cymini

Apñ aceto horis vigintiquatuor ma-
ceratorum & siccatorum añ. 3.v.

Electarium de baccis myrti ventri-
culum & hepar firmat, eorumq; coctio-
nem iuuat: ob id lienterix & dysente-
rix hepaticæ confert, datum cum sy-
rupō decoctionis cydoniorum.

Electarium de seminibus

D. M.

℞. Seminum cymini

Anisi

Fœniculi

Cari

Dauci

Ameos

Ap̃ij

Amomi aceto horis vigintiquatuor
maceratorũ & siccatorum añ. 3. vi.

Cinnamomi

Zingiberis

Macropiperis

Seseleos

Galangæ añ. 3. v.

Cardamomi

Spicæ nardi

Caryophyllorum añ. 3. iiij.

Libystici 3. iiij.

Melle despumato excipiuntur, vel du-
plo

Sacchari adiecto pulvis fit leuissimus.

Electarium de seminibus coctionem
iuuat, obstructions aperit: ob hæc lien-
teriam sanat, & dolores viscerum à fla-
tibus excitatos placat.

Electarium Regium D. M.

℞. Strobilorum excorticatorũ 3. viij.

Amygdalarum purgatarum 3. vi.

Sacchari lb. iiij.

Aquæ rosatæ lb. i. β.

Olei amygdalarum dulcium recentis

Olei rosati añ. 3. iij.

Cinnamomi 3. viij. β.

Caryophyllorum

Santali citrei añ. 3. iij.

Ligni aloës 3. iij.

Ambræ 3. i.

Moschi 3. β.

Electarium Regium cerebrum, cor,
thoracem, ventriculum roborat.

Electarium ex granis tinctorijs

D. M.

℞. Serici succo granorum tinctorum
recenter tincti lb. i.

Succi pomorum dulcium

Aquæ rosarum añ. lb. i. β.

Sacchari optimi lb. i. β.

Ambræ crudę minutim cōscissæ 3. iij.

Ligni aloës crudi

Cinnamomi crassi añ. 3. vi.

Lapidis cyanei loti & præparati

Margaritarum albarum añ. 3. ij.

Foliorum auri boni 3. i.

Moschi laudatissimi 3. i.

Confice sic: Sericum aqua & succo maceretur viginti quatuor horas: deinde paulisper his incoquetur, donec liquores isti rubeant: quos expresso & abiecto serico coque cum saccharo ad mellis crassitudinem. Ab igne depositis & adhuc calētibus misce ambram, qua liquata inijce puluerē ligni aloës, cinnamomi, lapidis cyanei, margaritarum, folia auri & moschum.

Confectio alkermes; id est, electariū ex granis tinctorijs ad cordis palpitationem, syncopen, mētis alienationem seu desipientiam, mœrorem sine causa manifesta: facultates enim nostrum corpus dispensantes mirificè roborat. Datur ab aur. i. ad aur. ij. β.

Electarium xylaloës

D. M.

℞. Ligni aloës crudi
Rosarum rubrarum añ. 3. viij.
Caryophyllorum
Spicæ nardi
Macis
Nucis moschatæ
Galliæ moschatæ
Cubebæ
Cardamomi vtriusque
Mastiches
Cinnamomi
Cyperi
Schoënu anthus
Zedoariæ
Folij behen albi & rubri
Serici crudi
Margaritarum
Corallij rubri
Succini
Citri corticum & foliorum
Ozymi caryophyllati
Sisymbrij aquatici

Menthæ siccæ

Piperis longi

Zingiberis añ. 3. iiij.

Ambraë 3. i. β.

Moschi 3. i.

Melle emblicarum

Miua aromatizata excipitur.

Confectio ligni aloës morbos cordis, ventriculi, hepatis frigidos sanat, & partes ipsas roborat: ob id cordis palpitationem, syncopem sanat, exhilarat, coctionem iuuat, ac inde & odore suo halitum oris commendat.

Electarium lætificans D. M.

℞. Rosarum

Ligni aloës añ. 3. vi.

Macis

Nucis moschataë

Galliæ moschataë

Cardamomi vtriusque añ. 3. ij.

Cinnamomi

Croci añ. 3. ij.

Ciperi 3.v.

Caryophyllorum

Mastiches

Spicæ nardi

Asari añ. 3.ij.

Melle emblicarum excipe

Moschi gr. xv. aromatiza.

Electuarium lætificans ad affectus cordis, vētriculi, hepatis, quas parteis etiam roborat, palpitationem cordis emēdat, valenter exhilarat, coctionem iuuat: proindeq; oris & corporis reliqui odorem commendat, coloremq; viuū facit. Datur à 3.i. ad 3.ij.

Electarium ex citro

D. M.

℞. Corticum citri aur. xx.

Caryophyllorum

Ligni aloës

Cinnamomi

Macis

Galangæ añ. 3.ij.

Cardamomi

Zingiberis añ. 3.i.

Moschi 3.v.

Melle excipitur.

Electarium ex citro cor & ventricul-
culum roborat, coctionem tuuat, oris
halitum commendat, flatus crassos dis-
sipat.

Electarium ex rhabarbaro

D. M.

R. Rhabarbari

Succi eupatoriij

Succi absinthij añ. 3.v.

Myrrhæ

Croci añ. 3.i.

Spicæ nardi

Asari

Cassia

Schoenu anthus

Fumariæ

Seminum anisi

Apij

Amygdalarum amararum excorticatarum añ. 3.β.

Melle despumato excipitur.

Hoc electarium obstructions potenter aperit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas etiam inueteratas, formæ corruptionem sanat.

Electarium alkanzi

D. M.

R̄. Rosarum

Costi

Spicæ añ. 3.β.

Balaustiorum 3.i.

Nucis moschatae

Calami Aromatici

Caryophyllorum

Macis

Cardamomi añ. 3.iij.β.

Zingiberis 3.ij.

Myrobalanorum Indarum, emblicarum, bellericarum añ. 3.vj.

Granorum myrti lb. j.

Citini

Thuris

Corticum citri

Fructus tamaricis añ. 3. β.

Vini generosi, quantum sufficit.

Succi cydoniorum; quantum sufficit.

Miuæ quantum sufficit.

Feruefiant semel omnia in vino generoso antiquo, post siccentur: Feruefiant deinde semel in succo cydoniorum, exiccenturq; in vase terreo vitrato: terantur tenuissime, miua excipiantur.

Electarium alkanzi ventriculum & hepar calfacit & roborat: ob id appetentiam excitat, coctionem iuuat, flatus dissipat, vomitum pituitosum, & ab eo virium dissolutionem emendat. Dantur 3. iij. cū syrupo cydoniorum.

Electarium ex lasere

D. M.

℞. Liqueoris Cyrenaici

Piperis

Myrrhæ

Foliorum rutæ siccorum añ. ʒ.β.

Melle despumato excipitur.

Electarium ex lasere ad febres antiquas, & circuitu repetentes: vt quartanas, quotidianas, somnum grauem, tremorem, venenosos morsus. Datur à ʒ. i. ad aureum vnum in febre cum oxymelite per horam ante accessionē; contra venenum, cum vino calido.

Electarium anacardinum

D. M.

℞. Piperis nigri & longi

Myrobalanorum cepularum, emblicarum, bellericarum, Indarum

Castorij añ. ʒ. ij.

Costi

Anacardi

Melanthij

Sacchari boni añ. ʒ. vi.

Cyperij ʒ. iiij.

Butyri

Butyri vaccini, quantum sufficit.

Mellis quantum sufficit.

Tere anacardos per se: deinde alia excipe butyro & melle simul coctis portione æquali. Datur post sex menses ad 3.ij. cum aqua foeniculi & apij: quo sumpto, vitatur labor, ira, coitus, ebrietas.

Confectio anacardina ad ventris totius inferioris & cerebri affectus frigidus: sanguinem reddit puriorem, & inde spiritu animali reddito purgatior & tenuiore, sensus omnes, apprehensionem, intellectum & memoriam iuvat, coloremq; viuidū corpori tribuit.

Electarium Aiac Bryoniacs Democriti secundum M.

℞. Radicis bryoniæ purgatæ & tri-
tæ lb.ß.

Sapæ

Vuarum passarum lb.iiij.

Scillæ assatæ

Strobilorum depellatorum añ. 3. i. β.

Nucis moschatae

Cardamomi

Macis

Zingiberis añ. 3. ij.

Caryophyllorum

Piperis longi

Stœchados añ. 3. i. β.

Seseleos

Salis gemmæ

Galliæ añ. 3. i.

Spicæ 3. β.

Agarici 3. iij.

Alpheſera Democriti cerebrum & nervos purgat excrementis: ob id epilepsiæ, paralyſi, vertigini, & alijs cerebri & nervorū frigidis affectibus medetur. Datur poſt ſex meſes à 3. ij. ad 3. iij.

Electarium *Εὐκλειδὸς κινδύου*

D. M.

℞. Foliorum thymelææ præparato-

rum partes x.

Carnis cydoniorū in aceto coctorum

Saccari ana partes lxxx.

Mannæ partes xl.

Olei ex cocco gnidio partes xij.

Seri lactis in quo agarius sit infusus
partes xxx.

Confice sic: Saccharum & manna
dissoluantur in sero lactis, caro cydo.
admisceatur, & coquatur igne lento ad
mellis crassitiem: demū thymelæ pul
uis cum prædicto oleo mistus addatur.

Almezereon hydragogum in hy
drope efficacissimum: datur ad 3. iij.

Electarium de eupatorio

D. M.

℞. Succieupatoriij

Rhabarbari añ. 3. iij.

Croci 3. ij.

Laccæ

Seminis cassuthæ

Cacuminum Schænu anthus

Seminum citreoli

Cucumeris

Portulacæ

Succi absinthij añ. 3. iij.

Scammonij in cydonio cocti 3. ij. β.

Electarium de eupatorio ad icterum
& hydropen incipientem datur aureo
vno cum aqua casei alcherigi. Quod
si calor adest, succo solani, aut intybi,
aut volubilis reprime.

Electarium Indum minus

D. M.

℞. Turbith

Sacchari añ. 3. C.

Macis

Piperis

Zingiberis

Caryophyllorum

Cinnamomi

Cardamomi

Nucis moschatæ añ. 3. vij.

Scammonij 3. xij.

Mellis despumati quantum sufficit.
 Misce, da ad aur. iij. Nam eadem quæ
 maius pollicetur.

Electarium Episcopi secundum M.

℞. Scammoni Antiocheni
 Turbith albi añ. 3. vi.
 Caryophyllorum
 Cinnamomi
 Zingiberis
 Nucis moschatæ
 Emblicarum
 Polypodij añ. 3. ij. β.
 Sacchari 3. vi.
 Melle despumato excipitur.

Hoc Electarium excremēta flatusq̃
 corpore toto educit, ob id dolorem co-
 licum, hypochondriorum, iuncturarum
 leuat, renes & vesicam purgat, venē-
 rem excitat.

Electarium Hamech alterum

secundum M.

℞. Myrobalanorum nigrarum, cepu-
larum

Epithymi añ. 3. l.

Thymi

Calaminthes

Polypodij

Agarici

Glycyrrhizæ

Buglossi añ. 3. x.

Stœchados

Chamædryos

Chamæpityos

Spinæ albæ

Anisi añ. 3. v.

Pruna

Zizypha

Myxa ana num. lxx.

Vuarum passarum mundatarum lb. j.

Aquæ quantum sufficit.

Sapæ lb. ij.

Mellis lb. i.

Scammonij 3. ij.

In aqua omnia coque ad partē tertiā
in qua ad mellis crassitiem igne lento
percoque sapam, mel & scāmonium.

Hamech alterum purgat melancholia
& vstos humores alios: ob id ver
tiginī, mania, melancholiā confert, &
obliuioni, & vitijis cutis qualia sunt
psora, lepra, alphi, cancer, elephantia,
impetigo.

Electarium rosatum cholagogū

D. M.

℞. Succī rosarum rubrarum perfectarum
℔. iij.

Sacchari ℔. i. β.

Mannæ puræ & recentis ℥. vi.

Scammonij Antiocheni ℥. i. β.

Trochiscorum spodij ℥. i.

Galliæ

Crocī añ. ℥. ij.

Trochiscorum oxyacanthæ ℥. iij.

Repone vitreo vase.

Electuarium rosatum cholagogum

clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, vertigini, oculorum dolori, ictero : datur ad 3.v.

Electarium rosatum minus

D. M.

℞. Rosarum rubrarum 3.x.

Ligni aloës

Santalorum citreorum añ. 3.ij.

Cinnamomi 3.β.

Mastiches 3.iiij.

Ambraë 3.ij.

Moschi 3.i.

Syrupi rosati quantum sufficit.

Electarium rosatum minus cor, ventriculum roborat, & eorum flatus, & ab his inflationes dissipat.

Electarium Indi maioris.

℞. Cinnamomi

Caryophyllorum

Spica

Rosarum

Cassia, siue cassia lignea

Maceros

Cyperī añ. 3. iij.

Santalorum citri. 3. ij. β.

Ligni aloës

Nucis moschatae añ. 3. ij.

Turbith 3. l.

Zucchari

Penidiorum añ. 3. xx.

Galangæ

Heil, id est Cardamomi

Asari

Mastiches añ. 3. i. β.

Scammonij boni & in malo cidonio
decocti 3. xij.

Omnia cum oleo amygdalino fricentur.
deinde

Succi cotoneorum, &

Granatorum

Succi apij, &

Fœniculi añ. lb. β.

Deinde pone succos cum melle de

spumato ad spissitudinem conuenientem, & confice cum speciebus, & fiat.

Istud electuarium secundum communem hactenus obseruatū vsus dispensari solet, quicquid dicant alij.

Electuarium Indum dicitur, ad differentiam alterius.

Electuarium Indum Mesue maius, educens solutionem, superfluitates humorum, & propriè phlegmaticorum & putridorū ab stomacho, & ab alijs membris nutritionis, ventositatem in eis grossam resoluit, & morbos factos ab eorum exuberantia curat, sicut est dolor stomachi & viscerum: colicam & dolores renū, & materias quæ sunt in iuncturis educit.

Electarium confortatiuum stomachi.

℞. Granorum myrti tritorum, sicut alchool, id est, subtilissimè ʒ. xij.
Rosarum

Spodiij

Sumach

Trium piperum, scilicet longi, albi, &
nigri

Santali albi, lutei, rubri

Balaustiij

Gummi afsi añ. 3. i. β.

Quando simpliciter ponitur gummi,
de Arabico intelligitur.

Granorum granatorum acidorum assa-
torum 3. viij.

Coriãdri infusi in aceto & assati 3. iiij.

Seminis Acetosæ

Plantaginis

Seminis rosarum añ. 3. ij.

Fiat omnium trituration bona, & fri-
centur, deinde inuolue in aqua acetosa.

Electarium dicitur, quasi electum
ex varijs rebus.

Electarium hoc si bene paretur, con-
fortat stomachum & viscera, & absin-
dit fluxum vëtris de significationibus
caliditatis, & confert ei cuius venter

soluitur superfluè ab operatione cathar-
tici, augetq; appetitum sibi.

Electarium de gemmis.

℞. Albarum margaritarum 3. ij.

Fragmentorum sapphiri

Hyacinthi

Sardinis

Granatorum

Feruzegi, id est, Smaragdi añ. 3. i. β.

Zedoariæ

Doronic

Corticum Citri

Maceros

Seminis alfelengemisch, id est, Ocy-
mi añ. 3. ij.

Coralliorum rubeorum

Charabe

Limaturæ eboris añ. 3. i. 3. ij.

Behen alb. & rub.

Caryophyllorum

Zingiberis

Piperis longi

Spicæ

Folij

Croci

Heil, id est, cardamomi añ. 3. i.

Trochisci diarrhodon

Ligni aloës añ. 3. v.

Cinnamomi

Galangæ

Zurumbet añ. 3. i. β.

Autor Pandectarum facit speciem zedoariæ. Rei veritas hoc manifestò reprehendit, propterea quòd vtrunque ab autoribus in receptis scribi solet. vnde liquet rem nō esse eandem. zedoariæ radices sunt nobis notæ: zurumbet radices sunt incognitæ nobis.

Foliorum auri & argenti añ. aur. β.

Moschi boni 3. β.

Ambræ 3. ij.

Confice cum melle emblicorum, & colatura è geleniabin, id est, de rosis, partibus æqualibus quantum sufficit.

Electarium de gemmis cuius iuua-

mentum est magnum ad ægritudines
 cerebri, cordis, & stomachi, hepatis &
 matricis frigidas : & nos sumus exper
 ti bonitatem eius ad tremorem cordis,
 syncopem, & debilitatem stomachi.
 Et quando aliquis tristatur, & nescit
 radicem : & ei qui diligit solitudinem.
 Et sunt eo vsi reges & magnates. Tra
 hit enim eos in consequentiam bono
 rum mortū, nobilium dilatat animam,
 & facit corporis odorem, & colorem
 bonum.

Eclegma ex pulmone uulpis

D. M.

℞. Pulmonis vulpis siccati

Succi liquiritiæ

Adianthi albi

Seminis fœniculi añ. ʒ. iij.

Sacchari in aqua bimpinellę soluti, &
 aquæ quantū sufficit ad cōficiendū.

Succus myrtinus additus valentius ro
 borat.

Eclegma ex pulmone vulpis ad phthi-
sim valens est.

Eclegma de amygdalis

D. M.

℞. Amygdalarū dulciū & amararum
Seminis lini torrefacti

Nucleorum pineorum

Anisi

Tragacanthi

Gummi Arabici sicci

Liquiritiæ añ. 3. i. β.

Sacchari

Penidiorum añ. 3. iij.

Mellis quantum sufficit.

Succi foeniculi quantum sufficit.

Eclegma de amygdalis ad intem-
periem multum siccam pulmonis &
thoracis, & tussim inde siccam.

Eclegma ex pineis nucleis

D. M.

℞. Nucleorum pineorum 3. xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthi

Gummi Arabici

Glycyrrhizæ

Succi amyli

Adianthi albi

Ireos añ. 3. iij.

Carnis dactylorū fuluorum 3. xxxv.

Amygdalarum amararum 3. iij.

Sapæ

Vuarum passarum

Sacchari albi

Butyri recentis añ. 3. iij.

Mellis quantum sufficit.

Eclegma ex pineis nucleis tussim
antiquam, sputū glutinosum, asthma,
& spirandi ex partium spiritalium an-
gustia difficultatē iuuat lambendo 3. i.

Eclegma papauerinum

D. M.

R̄. Papaueris albi 3. xxv.

Amyg

Amygdalarum dulciū depellatarum

Nucleorum pineorum

Gummi Arabici

Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ añ. ʒ. x.

Amyli

Seminum portulacæ

Lactucæ

Cydoniorum añ. ʒ. iiij.

Croci ʒ. i.

Penidiorum alborum ʒ. iiij.

Syrupi papaueris præsertim albi & nigri cum semine lactucæ & violis facti quantum sufficit.

Eclegma papauerinum iuuat tussim & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui: eū enim coquit & crassat.

Eclegma de Scilla

D. M.

R̄. Succi scillæ

Mellis despumati partes conuenientes coquēdas ad eclegmatis cōsistentiā.

Eclegma de scilla materiã crassam,
lentam, coctu difficilem in partibus re-
spiratorijs expelli facilem strenuè red-
dit, & natam inde spirandi difficulta-
tem & thoracis dolorem leuat.

Eclegma de scilla aliud

D. M.

℞. Scillæ assatæ 3.iiij.

Radiciſ ireos 3.ij.

Hyssopi

Prasiij añ. 3.

Myrrhæ

Croci añ. 3.β.

Mellis quantũ sufficit ad excipiendũ.

Hoc eclegma valens est ad asthma
& tussim antiquam, humorem enim
crassum tenuat.

Eclegma sanum

D. M.

℞. Cinnamomi

Hyssopi siccæ

Glycyrrhizæ añ. 3.β.

Zizipha

Myxa añ. num. xxx.

Vuarũ passarum à semine purgatarum

Ficum passarum siccarum

Dactylorum pinguium añ. 3.ij.

Fœnigræci 3.v.

Adianthi albi M.j.

Seminum anisi

Fœniculi

Lini

Ireos

Calaminthes añ. 3.iiij.

Penidiorum lb.ij.

Nucleorum pineorũ depellatorũ 3.v.

Amygdalarum mundatarum

Glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi Arabici

Amyli añ. 3.ij.

Ireos 3.ij.

Confice sic: Coque omnia in lb.iiij.
aquæ ad librarũ duarũ consumptionẽ,

colatum coque cum penidijs ad mel-
lis crassitudinem, tunc adde nucleos pi-
neos, amygdalas, glycyrrhizam, tra-
gacanthum, gummi Arabicum, amy-
lum, irin & misce omnia probè, do-
nec album fiat medicamentum.

Eclegma sanum ad tussim, raucedi-
nem à frigore, vel pítuita crassa, thora-
ce aut pulmone comprehensa, datur à
drachmis quinque ad 3. x. & lambèdo
sumitur.

*Emplastrum diachylon commu-
ne, siue diachylon album.*

℞. Fœnigræci

Seminis lini

Radicis althææ

A quibus omnibus extrahantur mucī
lagines, & accipe ex ipsis mucilagi-
nibus añ. vnam lb.

Lithargyrii contriti contritione vlti-
ma & mundati à plumbo & scoria,
lb. i. β.

Olei antiqui clari lb. iij.

Lithargyrium & oleum diu in morario lapideo cum pistello ferreo conquassentur, & elaboretur in eorum conquassatione multum: deinde bulliant super ignem cum facilitate, semper & incessanter agitādo cum spatula vsque dum coaguletur lithargyrium. Tunc deponatur ab igne, & dimittatur infrigidari paulatim: postea ℞. mucilagines, & bulliant bullitione aliqua. Deinde paulatim projice mucilagines super lithargyrium & oleum, semper cum pistello conquassando, donec fiat eorum conueniens permixtio. Tunc vero coquatur super ignem vsquequo inspissetur. Et si vis ipsum facere Ireatum, tunc de intentione filij Hamech, permisce puluerem Ireos subtilissimum. & sunt alij qui pro communi oleo ponunt oleum Irinum: & si addas mucilaginem seminis Meliloti, erit sedatio eius fortior.

Emplastrum diachylon, cuius iuua-
mentum notum est ad apostemata du-
ra, & ad duritiem hepatis, splenis, &
stomachi, & ad scrophulas, omnemq[ue]
duritiem.

*Emplastrum diachylon
paruum.*

℞. Lithargyrj ℥.vi.
Olei veteris clari lb.i.
Mucilaginis psyllj ℥.iij.
Mucilaginis hyoscyami ℥.i.β.
Mucilaginis seminis lini
Mucilaginis radice Maluæ añ. ℥.ij.
Fiat emplastrum secundum artem.

Diachylon paruum resoluēs & ma-
turans tumores à caliditate factos, &
apostemata.

*Emplastrum diachylon
magnum.*

℞. Lithargyrj mundi triti & cribel-
lati ℥.xij.

Olei irini, id est, ireos

Olei chamæmelini

Olei anethini añ. 3. viij.

Mucilaginis seminis lini

Mucilaginis fœnigræci, & Radicum
althææ

Mucilaginis ficuum pinguium

Mucilaginis passularum

Succi Iridis

Succi scyllæ

* Hyssopi humidæ

* Mes. æsypi.

Glutinis alkanach, id est, glutinis pi-
scium añ. 3. xij. 1/2.

Terebinthinæ 3. iij.

Resinæ pini

Ceræ citrinæ añ. 3. ij.

Conficiantur hoc modo: Lithargyriũ
& suprascripta olea diu in mortario la-
pideo cum pistello ferreo conquassentur
per spatiũ mediæ horæ, deinde bul-
liant super ignem leuem cum facilitate
semper agitando cum spatula donec
coagulentur: tunc deponantur ab igne.

& dimittantur in frigidari, deinde ℞.
mucilagines ac alia & simul iterum
bulliant, donec efficiatur eius forma du-
ra: deinde ab igne deponantur super
marmor, & fiant magdaleones.

Emplastrum diachylon magnum,
operosius est quam præcedens: & ideo
ad resoluendum, & ad maturationem
omnis duritiei, & inflammationis ex-
pertum.

Emplastrum de Muci- laginibus.

℞. Mucilaginis seminis althææ
Seminis lini
Mediani corticis vlmī
Fœnigræci añ. ʒ. iij. β.
Oleorum chamæmeli
De lilio
Anethi añ. ʒ. i. β.
Ammoniaci
Galbani
Opopanacis

Serapini añ. ʒ.β.

Ceræ nouæ ʒ. xx.

Croci ʒ. ij.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Fiat emplastrum vt decet.

Emplastrum de Mucilagibus est
lenitium & mollificatium omnis
duritie.

Emplastrum ad Stomachum

& Hepar.

℞. Ligni Aloës

Absinthij

Gummi arabici

Mastiches

Cyperij

* Costi

Zingiberis añ. ʒ.β.

Calami aromatici

Olibani

Aloës añ. ʒ. ij.

Caryophylli

Maceros

* Costi uera res
dice caremus.

Cinnamomi

Spicæ

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ

Spicæ nardi

Schænoanthos añ. 3. i. β.

Aggregentur omnia cum miua aromatica, id est, miua cum speciebus : & extende super pannum, & suffumigetur super ligno aloës, & superponatur.

Emplastrum stomachum & hepar confortans, & calefaciens ea.

Emplastrum de granis lauri.

R_x. Olibani

Mastiches

Myrrhæ añ. 3. i.

Granorum lauri 3. ij.

Cyperì

Costi añ. 3. β.

Mellis colati quātum sufficit ad aggregandum : & extendatur in panno, & calidum superponatur vbi oportet.

Si autem triplicetur cyperus, & ponatur de stercore vaccarum aut caprarum sicco, inuenitur mirabile ad hydropisim, & inflationes discutiendas.

Emplastrum de granis lauri Mesue, conferens ad dolores ex frigidityte factos, & ventositate, & propriè ad dolorem ventris & stomachi, renum & matricum, vesicæ, & aliorum viscerum præsidio est.

Emplastrum de meliloto.

℞. Meliloti ℥.vi.

Florum chamæmeli

Fœnigræci .

Granorum lauri

Radicis althææ

Absinthij añ. ʒ. iij.

Seminis apij

Cordumeni, id est, carui agrestis

Iridis

Cyperij

Spicæ nardi

Cassia lignea

Ammis

Anisi añ. ʒ. ij. β.

Sampsuchi ʒ. ij.

Hammoniaci ʒ. x.

Styracis calamita

Bdellij añ. ʒ. v.

Terebinthinæ ʒ. i. β.

Ficum pinguium num. xij.

Sepi hircini

Resinæ añ. ʒ. ij. β.

Ceræ ʒ. vi.

Olei sampsuchini

Olei de spica añ. quod sufficit, ad infundendum & contundendum.

Emplastrum de Meliloto mollificans omnem duritiem quæ est in stomacho, hepate & splene, & omnia viscera mollificat.

Emplastrum de gallia

D. M.

℞. Gallia moschata

Schænu anthus añ. 3. l. β.

Ramich

Rhois

Acaciæ

Hypocistidos

Ladani

Gallarum non perforatarum

Calami aromatici

Rosarum

Seminis rosarum

Santalorum alborum

Santalorum rubrorum

Mastiches

Xylaloës

Cariophyllorum

Spicæ nardi

Thuris

Costi

Myrrhæ

Cyperi

Absinthij añ. 3. ij.

Panis biscocti 3. iij.

Dactyli sicci num. xij.

Succi myrti

Succi lauri

Aquæ rosarum

Vini austeri añ. ʒ. i. β.

Miux aromaticæ ʒ. iij. vel iij.

Gummi Arabici assati ʒ. vij.

Terantur accuratè omnia, deinde panis & dactyli xxiiij. horis macerentur in succis. Hæc læuiga & miua excipe, gummis additis coquantur igne lento ad mellis crassitudinem: quibus in mortario diu permisce puluerem prædictum donec totū fiat viscosum: tempore vtendi suffitur ligno aloës panno illitum.

Emplastrum de gallia ventrem totum inferiorem roborat adstringendo & calefaciendo: quare lenterias, diarrhœas, dysenterias iuuat à causâ frigida productas.

Emplastrum alterum de gallia

D. M.

℞. Gallix
Rhamich
Foliorum & seminis rosarum
Rhois
Santali albi & rubri
Spodij
Sanguinis draconis
Electri
Balauftij
Capitum granatorum
Hypocystidos
Acacia
Corticum mandragoræ añ. 3. ij.
Caphuræ 3. β.
Polentæ
Baccarum myrti
Gummi Arabici
Asari tenuissimè tritorum añ. 3. β.
Succi vuarum agrestium 3. i.
Succi capreolorum vitis agrestis 3. ij.
Succi extremitatum myrti
* Aceti añ. 3. iij. * alij. i.
Miuxacidæ 3. ij. vel iij.

Tere omnia tenuiter, polentā, bac-
cas myrti, gummi, asarum tenuissimē
trita succis vuarū, capreolorum, myr-
ti & aceto macera: quibus adde mi-
uam & coque igne lento ad glutino-
sam crassitiem: tunc pulueres his dili-
genter misce. Ex hoc portio alutæ illi-
ta tempore vtendi suffiatur xylaloë.

Emplastrum hoc de gallia ad affe-
ctus eosdem, sed à causa calida profe-
ctos valet.

Emplastrum Andromachi

secundum M.

℞. Sepi arietum

Picis añ. 3. xviii.

Gummi pini 3. vii.

Sandarachæ

Auripigmenti

Aluminis scissilis

Calcis viuæ añ. 3. iij.

Hammoniacy 3. ij.

Hammoniacum super ignem dissol-
uatur

uatur vino rubro, eiꝯqꝰ adde olei lb. ij.
& reliqua probè puluerata.

Emplastr. Andromachi podagram,
gonagram, ischiadem & reliquos ar-
ticulorum dolores antiquos, ac eorum
tumores & laterum, scirrhumꝯqꝰ sple-
nis & hydropem iuuat.

*Emplastrum Andromachi
causticum sec. M.*

℞. Aquæ ardentis lb. iiij.

Seminis orizæ

Frumenti excorticati añ. 3. vij.

Macera in vase vitreo bene obstru-
cto, donec granis dissolutis totum fiat
mucosum: serua, sed diebus singulis li-
gneo baculo moue, & obtura: exce-
ptum cortice auellanæ vel arundinis,
vel cera pertusa, & parti admotum, tri-
bus horis aut eo plus cauterij vice vl-
cerat & vrit.

Emplastrum filij Zachariæ

secundum M.

℞. Ceræ flauæ

Medullæ cruris vaccæ

Adipis anatis

Adipis gallinæ

Muccaginis seminis lini pares por-
tiones.

Olei lini quantum sufficit.

Muccaginis althææ

Muccaginis fœnigræci portiões pares.

Olei leucoſij pro oleo lini vel cum eo.

Muccaginis œsypi

Muccaginis ichthyocollæ quan. suff.

Emplaſtrum hoc iuncturarũ tophos
ac nodos duros mollit, diſſoluit, &
crassa lenta'que pulmonis & thoracis
excrementa expectorare magis habi-
lia reddit.

Emplaſtrum Ceroneum

D. N.

℞. Picis naualis bene colatæ

Ceræ añ. ʒ.ij. & ʒ.ij.

Serapini ℥.ij.

Hammoniāci

Terebinthinæ

Colophonix

Croci añ. ℥.i. & ℥.ij.

Aloës

Thuris

Myrrhæ añ. ℥.i.

Opopanacis

Styracis calamithæ

Galbani

Mastiches

Aluminis

Fœnigræci añ. ℥.ij.

Confitæ, id est, fecis Styracis liquidæ.

Bdellij añ. ℥.ij.

Lithargyrj ℥.i.β.

Confice sic: Serapinum, Galbanum, Opopanacum, Hammoniācū gummi, aliquantulum tusa cum vino temperentur: deinde ad mediæ partis vini consumptionem bulliant: & vase stanneo posito super ignem, cum incœperit bul

lire, pix naualis bene colata addatur, & cum spatula bene agitetur, donec liquefiat: liquefacta pice, addatur cera, & ea liquefacta ponatur colophonia: tum styrax cum pistello calido trita frustatim imponatur: postea mastiche & olibanum, deinde myrrha cum bdellio: & interuallo facto ponatur terebinthina, & consequenter alumen & lithargyrium: ad vltimum, fœnum græcum. Et cum decoctum fuerit, fundatur supra aquam tepidam, & ab aqua extracto, manibus exprimatur, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloës super marmor inunctum cum oleo laurino malaxetur: postremum crocopuluerato, & inunctis manibus cum eodem oleo laurino magdaleones informentur.

Emplastrum Ceroneum, à cera dictum, præcipuè valet ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigiditate: & si humor frigidus illuc fecerit

discursum, mirè soluit, & splenem remollit: valet ad hydropisim de frigida causa hepatis: de eadem causa matricis frigiditati superpositum multum resistit.

Emplastrum Oxycroceum

D. N.

R̄. Piciſ naualis

Croci

Colophonix

Ceræ añ. ʒ. iij.

Terebinthinæ

Galbani

Ammoniaci

Myrrhæ

Olibani

Mastiches añ. ʒ. i. & ʒ. iij.

Conficitur sic: Galbanum & Ammoniacum aliquantulum contusa ponantur in sufficienti aceto per noctem, mane verò ponantur super ignem vt eliquentur; & eliquata per cacia co-

lentur, & coquantur iterum donec pars aceti consumatur, & tunc pix naualis bene colata addatur: & eliquata pice, pone ceram: cera liquefacta, pone colophoniam, deinde terebinthinam: & facto interuallo ponatur mastix & olibanum, & myrrha, semper agitando cum spatula à principio ad vltimum. Quum autem coctum fuerit; in aqua frigida ponatur, & ab aqua extractum manibus exprimatur vt tota aqua exeat, & super marmor inunctum oleo, lauetur, & puluere croci superposito malaxentur, & fiant magdaleones.

Emplastrum oxycroceum Nicolai in magno antidotario, ex aceto & croco nomen habet.

Emplastrum oxycroceum valet præcipuè ad fracturas ossium, & ad membra quæ dolore aliquo affliguntur, & apostemata dura in quacunque parte corporis fuerint, remollit & dissoluit.

Emplaſtrum de Ianua

D. M.

℞. Succibethonicæ

Succi plantaginis

Succi apij añ. ℔. j.

Ceræ

Picis, resinæ

Terebinthinæ añ. ℔. β.

Fiat emplaſtrum.

Emplaſtrum gratia Dei

D. N.

℞. Terebinthinæ ℔. β.

Resinæ ℔. j.

Ceræ albæ ℥. iiij.

Maſtiches ℥. j.

Verbenæ

Bethonicæ

Bipinnellæ añ. M. j.

Herbæ piſtentur, & in vino albo forti bulliant uſque ad conſumptionem tertiæ partis, colentur, & inde ſubſtan-

tia herbarum abijciatur, & cera, resina,
& mastix cum colatura ponantur, &
bulliant, agitando donec optimè incor
porentur, & tunc deponantur ab igne,
& addatur terebinthina, & totum agi
tetur cum spatula, & fiat emplastrum.

Emplastrum contra rupturam.

℞. Picis naualis

Aloës añ. ʒ. iij.

Lithargyrj

Ceræ rubæ

Colophonix

Galbani

Ammoniaci añ. ʒ. ij.

Visci quercini ʒ. vi.

Gypsi

Vtriusque aristolochix

Myrrhæ

Thuris añ. ʒ. vi.

Terebinthinæ ʒ. ij.

Isculi, id est, vermis terræ ʒ. iij.

Gallarum ʒ. iij.

Vtriusque consolidæ

Boli armenici añ. ʒ. iiij.

Sanguinis humani lb. i.

Confice sic: Primo ponatur viscus quercinus, & dimittatur diu bullire in aqua decoctionis pellis arietinæ, sic vt remouetur ab ariete, quæ debet decoqui per diem & noctem. Postea ponatur ab igne, & ponantur terebinthina, lithagyrion, & colophonia: postea mastix, thuris isculi, myrrha & galbanum & ammoniacum: paulopost consolida maior & minor, gypsus, & bolus armenus. Postea super ignem ponatur, & ponatur sanguis humanus: consequenter aristolochia longa & rotunda, & ad vltimum aloë, & semper agitari debet sine intermissione fortiter cum spatula. Signum decoctionis est, quando digitis non adhæret. Postea ponantur super marmor vnctum oleo violato, & manibus malaxentur. Postea teratur iterum in mortario assidue

per duos vel tres dies. Deinde vsui re-
serua.

Emplastrum diuinum

D. N.

℞. Galbani ℥.i. 3.ij.
Hammoniaci ℥.iij. 3.ij.
Opopanacis ℥.i.
Lithargyrj lb. i. β.
Cera nouæ ℥.viij.
Olei oliuarum lb. i. β.
Olibani ℥.i. 3. i.
Myrrhæ ℥.i. 3. ij.
Viridis æris ℥.i.
Bdellij ℥.ij.
Aristolochiæ ℥.i.
Mastiches ℥.i.
Aymenis ℥.iij.

Misce omnia sicut decet, & fiat em-
plastrum.

Emplastrum pro matrice.

℞. Radicis bistortæ lb. i.

Ligni aloës
 Santali muscatelini, id est, citrini
 Nucis moschatæ
 Berberis
 Antheræ añ. ʒ. i.
 Cinnamomi
 Caryophyllorum
 Schoënoanthos
 Florum chamæmeli añ. ʒ. β.
 Thuris
 * Mastiches
 Aiptæ moschatæ
 Galliæ moschatæ
 Styracis calamithæ
 Styracis rub. añ. ʒ. iiij.
 Moschi fini ʒ. β.
 Ceræ lb. i. β.
 Terebinthinæ lb. β.
 Ladani lb. iiij.
 Picis naualis lb. iiij.
 Fiat emplastrum secundum artem.

* *Mastiche laue-
 datissima Cbia,
 candida,*

Emplastrum de minio, cu-

*iuss descriptionem ponit
de Vigo.*

℞. Olei rosacei odoriferi ℔.j.β.
 Olei myrtei
 Vnguenti populeonis añ. ʒ.iiij.
 Pinguedinis gallinæ ʒ.ij.
 Sepi castrati & vaccini añ. ℔.β.
 Pinguedinis porcine ʒ.vij.
 Lithargyri auri & argenti añ. ʒ.ij.β.
 Cerussæ ʒ.iiij.
 Minij ʒ.ij.
 Terebinthinæ ʒ.x.
 Cere quantum sufficit.

Et fiat emplastrum secundum artem
 tendens ad nigredinem.

Emplastrum de Minio valet ad vl-
 cera mala & antiqua, quod probatum
 fuit & expertum à Ioanne de Vigo.

Emplastrum de Cerussa.

℞. Olei rosati ℔.ij.
 Cerussæ ℔.iiij.

Ceræ albæ ʒ. vi.

Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum de Cerussa conueniens quibuscunque malis complexionibus calidis factis caliditate solis, vel quomodolibet, & fricationi seu excoriationi cum calefactione mala.

Emplastrum Palmeum

D. M.

℞. Lithargyrj auri lb. iij.

Olei oliuarum

Pinguedinis porci recentis añ. lb. j. β.

Vitreoli viridis ʒ. iij.

Extremitatum tenerrimarum palmæ,
ad libitum, & semper agitando cum
spatula palmæ.

Et loco extremitatum palmæ tu potes
ponere radices cannæ.

Emplastrum palmeum valens ad
vulnera ubi est sanguis, & apostemata
pestilentialia & exituras, & adustio-
nem et compressione, & attractionem.

*Emplastrum triphar-
macum.*

R ξ . Olei lb. iij.

Lithargyrii auri lb. ij.

Aceti lb. β .

Fiat emplastrum secundum artem.

Emplastrum tripharmacum faciens
nasci carnem in vulneribus & consoli-
dans ea.

*Emplastrum desiccatiuum
rubeum.*

R ξ . Lithargyrii auri \mathfrak{z} . iij.

Olei rosati

Olei violati añ. lb. β .

Ceræ \mathfrak{z} . xij.

Lapidis calaminaris

Terræ sigillatæ

Minij añ. \mathfrak{z} . iij.

Camphoræ \mathfrak{z} . i.

Fiat emplastrum in mortario secun-
dum artem vt decet.

Emplastrum desiccantium rubeum
est in usu apud Chirurgos ad desiccandum
ulcera mundificata.

Formulae aui- um Cypri.

℞. Benioin ℥.β.

Styracis calamithæ ℥.ij.

Carbonis salicis ℥.ij.

Pulueris caryophyllorum ℥.β.

Pistentur omnia cum gummi tragacanthæ, cum aqua rosarum odorata, fiant formulæ, aues, sorices, candelæ, tripedes.

Hiera picra

G A L E N I.

℞. Croci

Spicæ

Ligni balsami

Ligni cassiæ

Cinnamomi

Mastiches añ. 3. vi.

Aloæ 3. C.

Mellis quod sufficit.

Terantur omnia, & in brassicæ vel absinthij succo vel vino, vt fermentescant, subigantur. Huic scammonium commiscentes, vt in vnitatem coëant, bilem flauam aluo deijcimus. Si verò agaricum & medullam, pituitam subducimus: Non secus atque si addiderimus epithymum, atram bilem depurgamus. Sunt qui vt stomacho, medicamentum ex aloë reddant accommodatius, & minus aluum cieat, aloën dupla ad species omnium proportionem coniungant: tritamq; prius eluant, & in aquam mittētes, subsidere sinant: dein emergentem summatim aquam cum ea quæ supernatat, spurcitia vel sordes, quæ existit, humori, effundūt: hoc idem opus iterum atque iterum obeunt. vbi
suffic

sufficienter lauerint, confidunt stomacho pacatum iri medicamentum: nec interanea vellicare, inter eos conuenit: dein reliquas, quas diximus, admiscēt species: sic vtile reddi imbecillis stomachi medicamen, author est Galenus.

HIERA PICRA Galeni, quæ ex aloë fieri consuevit, contra iliosos, putres, marcidosq; humores, qui os ventriculi insederunt, remedio est: item ijs quorum faciem pallor decolorauit: ijs quoque quorum oculis, obiectæ cili- cum aut pilorum imagines obuersantur: alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur vsque progrediens: lædit hos, quibus iecur calidius exhibet negotium, & stomachum iuuat.

Hiera Hermetis cum dracunculo sec. M.

℞. Aloës ʒ.i.

Trochiscorum Alandhal aureos viij.

Turbith

Agarici

Dracunculi vtriusque sicci

Iridis

Sagapeni

Myrobalanorum cepularum, citrea-
rum, Indarum añ. 3. i. β.

Zingiberis

Cinnamomi

Mastiches

Bdellij

Ellebori nigri

Euphorbij

Asari

Cassiae lignae

Salis Indi

Castorij

Croci

Apij

Ligustici

Cocci gnidij

Stœchados añ. 3. i.

Scillae assatae 3. ij. β.

Scammoniꝝ 3.ij.

Vini odoriferi, quantum sufficit.

Succi cucumeris agrestis quantũ suff.

Mellis quantum sufficit.

Olei quantum sufficit.

Curiose omnia terātur, gūmi & succi
vino odoro dissoluātur, pulueres succo
cucumeris agrestis comprehendantur.
Siccētur iterũ eodē succo & pauco mel
le, oleo excipiātur, et siccent; postremo
melle despumato omnia cōprehendan-
tur. Datur post mēses sex à 3.i. ad 3.ij.

Hiera Hermetis cū dracunculo ma-
ximarum & certissimarum est virium
ad cephalalgiam, hemicraniam, verti-
ginem, paralyfin, epilepsiā, tremorem,
spasmus cynicum, dolorem colicum,
nephriticum, vterinum, arthriticũ. Va-
cuat enim humores tam tenues, quàm
crassos & lētos à capite, vētriculo, ner-
uis, iuncturis, & reliquis partibus.

Hiera Archigenis

℞. Pulpæ colocynthidos 3.ʒ.

Praſi

Stœchados

Ellebori nigri

Chamædryos

Scammoni

Leucopiperis

Macropiperis añ. 3.ʒ.

Scyllæ affatæ

Euphorbi

Aloës

Croci

Gentianæ

Petroselini

Hammoniaci

Opopanacis añ. 3.ʒ.

Polii

Cinnamomi

Sagapeni

Myrrhæ

Spicæ nardi

Schoënu anthus

Calaminthes montanæ

Aristolochiæ rotundæ añ. 3. ij.

Melle sufficienti excipiantur omnia

Epithymi decocto, &

Vuarum passarum mundatarum.

Hiera Archigenis confert vertigini, epilepsiæ, spasmo, hypochrissi incipienti, voci ob humiditatem rauæ, do-
lenti asperæ arteriæ, difficultati spiran-
di, pforæ, lepræ & cæteris tuberculis à
crassa materia nascentibus, aut seroso
excremento, ventriculo, intestinis, me-
saræo, vtero à flatu dolentibus aut præ-
dictis humoribus, id est affectibus me-
lancholicis & ex pituita crassa natis
confert. daturq; ad aur. iij.

Hiera dia colocynthidos à

Ruso inuenta, sec. M.

℞. Stœchados

Agarici

Chamædryos añ. 3. x.

Colocynthidos 3.xx.

Sagapeni

Opopanacis añ. 3.viij.

Petroselini

Aristolochiæ rotundæ

Piperis albi añ. 3.v.

Cassia 3.vij.

Cinnamomi

Croci

Spicæ nardi

Myrrhæ

Polij añ. 3.iiij.

Vini quantum sufficit.

Mellis despumati, quantum sufficit.

Myrrham vino infunde: cætera tere,
& melle despumato excipe.

Hiera dia colocynthidos caput, ventriculum, & corpus reliquum purgat humore crasso & lento, & atra bile: ob id mania, melancholia, epilepsia, paralysis, spasmo cynico, vertigini cōfert ac vlceribus malignis, fistulosis, cancro, elephantia: flatus quoque discutit,

ventriculum roborat, coctionē firmat.

Hedychroon magma Andromachi, secundum Syl.

℞. Mari

Amaraci añ. 3. ij.

Asari

Aspalathi

Schoënu anthus

Calami aromatici

Phu Pontici

Xylobalsami

Opobalsami

Costi

Cinnamomi añ. 3. iij.

Myrrhæ

Folij malabathri

Cassix

Nardi Indicæ añ. 3. vi.

Amomi duplum.

Mastiches Chiæ 3. i.

Omnia vino Falerno sparge, fac
magma.

*Eiusdem magmatis compo-
sitio alia.*

℞. Corticis radicis aspalathi

Calami aromatici

Schoënu anthus

Phu

Costi

Asari

Xylobalsami

Cassia

Mastiches

Foliorum malabathri añ. 3. vi.

Nardi Indicæ 3. xvi.

Croci 3. xix.

Amaraci 3. xx.

Cinnamomi

Amomi

Myrrhæ añ. 3. xxiij.

Vino Falerno excipe & opobalsami
contactu pastillos confice, sicca in
vmbra.

Iulep Rosatum

D. M.

Rx. Aquæ rosarum lb. iij.

Zucchari albi, clarificati & cocti, libras duas.

Et fiat Iulep lento igne, debito modo decoquendo & leuiter.

Iulep rosatum Mesues, conueniens ad extinguendum sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, & hepatis supercalefacti & cordis, & resistens putredini.

Apothecarij his temporibus non faciunt hoc modo, sed clarificato zuccharo cum aqua communi, quum propinquum est coctioni, addunt pro omni libra zucchari, aquæ rosarum ℥. ij.

Iste non est modus, & ideo non habetur utilitas à Doctoribus malorum posita. Et hoc propter auaritiam apothecariorum.

Iulepum Rosatum

D. M.

℞. Aquæ in qua rosæ sunt maceratæ
libras quinque.

Sacchari lb. iij.

Igni lento coque ad iustam crassitiem. Vel, quo Rex frequenter vtitur:

℞. Aquæ rosarum lb. iij.

Sacchari lb. ij.

Iulepum rosatum febrium, thoracis, & ventriculi incendiū caloremq; flammæum extinguit, sitim inexpectam sedat, datum cum aqua frigida.

Iulepus Zizyphorum

D. M.

℞. Iuiubarum num. centum

Aquæ lb. iij.

Sacchari lb. i.

Coque ad dimidias aquæ, reliquū cū saccharo percoque in Iulepū simplex.

Iulepum ex iuiubis asperitatem gut-

turis & tussim iuuat, sputū tenue, quia
incrassat, facilius expelli facit: ob id
raucitati & pleuritidi confert.

Iulep Violatum.

℞. Aquæ florum violarum ℔.iij.
Zucchari albi clari & cocti ℔.ij.

Misce, & coquantur cum facilitate,
& reseruentur.

Iulep violatum conuenit acutè fe-
brientibus, & habentibus hepar calefa-
ctum & cor: cōfert etiam asperitati can-
næ, gutturis, pleuresi, & tussi siccæ.

Infusio Rosarum

D. M.

℞. Foliorum rosarum ℔.vj.
Aquæ calfactæ ℔.xv.

Macerentur horis octo in vase terreo
vittrato, stricti oris operculato: postea
colentur. Eidem aquæ iterum calfactæ
rosarum recentium tantundem immit-
titur, tandiu maceratur, colatur, Id si

velis seruare, oleo affuso, & vase eodem bene operculato dies quadraginta insola.

Infusum aquæ casei

D. M.

℞. Foliorum rosarum recentium completarum ʒ.ij.

R habarbari boni aureum vnum & dimidium.

Spicæ ʒ.i.β.

Seri caprini lactis, si haberi potest libras duas.

R habarbarum & rosæ parum terantur & macerentur in sero lactis per noctem, mane cola & propina. & si rosæ recentes non habeantur, vtere siccis.

Infusum aquæ casei bilē flauam clementer educendo, sanguinem purgat.

Infusum succi herbarum

D. M.

℞. Succorum intybi purgatorum

Lupi

Buglossi añ. ʒ. viij.

Corticum myrobalani flauæ ʒ. i.

Rhabarbari boni ʒ. iij.

Tamar Indorum ʒ. i. β.

Cassix fistulæ ʒ. iij.

In succis macera corticem, rhabarbarum, tamar Indorum & cassiam: cola & vtere. Ad eadem enim vt præcedens valet.

Infusum Hieræ D. M.

℞. Hieræ

Aloës añ. ʒ. v.

Decocti eupatoriij lb. i.

Decocto in vase vitreo posito hieram & aloën insolando macera duodecim dies vel plures.

Infusum hieræ ventriculum & caput purgat, proinde amborum doloribus etiam assiduis & hemicranix confert, ac febribus antiquis; datur ʒ. i. plus minusve.

Aliud eiusdem.

℞. Hieræ

Aloës añ. 3.v.

Decocti epithymi lb.i.

Macera & vtere vt priore.

Hoc infusum purgat humorem crassum & melancholicum, ob id affectibus cerebri melancholici salubre.

Loch de pino

D. Mesues.

℞. Granorum pini 3. xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellandarum assatarum

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Liquiritiæ & succi eius

Amyli

Capillorum Veneris

Radicum lilij coelestis añ. 3. iij.

Carnium daſtylorum ʒ. xxxv.

Amygdalarum amararum ʒ. iij.

Mellis paſſulati

Zucchari taberzet, id eſt, finiſſimi

Butyri recentis añ. ʒ. iij.

Mellis taberzet, quod ſufficit.

Loch de Pino Meſue conferens ad
tuſſim antiquam, & ad aſthma, & ſpu-
ti viſcoſitatem, & conſtrictionem an-
helitus.

Loch de Scylla

D. M.

Rx. Succı ſcyllæ

Mellis deſpumati añ. lb. ʒ.

Coque in ſubſtantia loch.

Loch de Scylla Meſues, quod eſt
medicamen iuamenti magni eis, qui-
bus materia groſſa & viſcoſa, & diffi-
cilis maturationis exuberat in mēbris
anhelitus, reddens eam facilem ad ex-
pellendum: & confert difficultati anhe-
litus, & dolori pectoris, & laterum.

Lochsanum D. M.

℞. Cinnamomi

Hyssopi siccæ

Succi liquiritiæ añ. ʒ.β.

Iuiubarum

Sebesten añ. num. xxx.

Passularum enucleatarum

Ficuum siccarum

Dactylorum pinguium añ. ʒ. ij.

Fœnigræci ʒ. v.

Capillorum Veneris M. j.

Anisi

Marathri

Iridis

Calaminthæ

Seminis lini añ. ʒ. iiij.

Hæc omnia coquantur in lib. iiij. aque donec remaneant lib. ij. & pone super ea penidiorum libras duas, & coque vsque ad mellis spissitudinem, deinde proijce desuper

Pinearum mundatarum ʒ. v.

Amyg

Amygdalarum mundatarum

Liquiritiæ

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Amyli añ. 3. ij.

Iridis 3. ij.

Malaxentur omnia & agitentur, vsque dum medicamen maturetur, & fiat album.

Loch sanum & expertum Mesues, conferens ad tussim, & raucedinem vocis quæ est propter frigiditatem, & phlegma grossum quod in pectore continetur & pulmone.

Loch de Caulibus, domini

Gordonij.

℞. Succī caulium rubeorum libram vnam.

Croci 3. ij.

Zucchari

Mellis añ. ℥. β.

Misce simul vt decet, & fiat Loch.

*Loch de pulmone Vulpis
dom. Mes.*

*℞. Pulmonis Vulpis sicci
Succi liquiritiæ
Capillorum Veneris
Seminis foeniculi añ. 3. iiij.*

*Confice cum zuccharo decocto in
aqua quantum sufficit.*

*Quandoque etiam conficitur cum
Rob myrteo, & est lenituum & con-
fortatiuum amplius.*

*Loch de pulmone vulpis magistra-
le domini Mesue in capite de Phthisi
ponit ipsum de mente Galeni,*

Auicennæ: etiam xij. cap.

de cura vlcenum pecto-

ris. & est ex Medi-

cinis mirabilis

iuuamenti,

aggre-

gantibus virtutem conforta-

tionis & mundificationis pulmonis.

Mithridatum

expertum D. Ioannis

Manardi.

℞. Sanguinis sicci anatis maris

Anatis foeminæ

Anseris

Hoedi

Rutæ sylvestris

Seminis foeniculi

Cymini

Anethi

Napi sylvestris, vel loco eius domesti-
ci añ. 3. iij. Quidam loco eius ponūt
semen sinapis: quod an verum sit, iu-
dicet lector.

Radiciſ Gentianæ

Trifoliij

Schoënoanthos

Thuris

Rosarum siccarum añ. 3. iij.

Piperis albi

Piperis longi

Costi

Phu, id est, valerianæ

Anisi

Cinnamomi añ. 3. ij.

Myrrhæ

Nardi, siue spicæ nardi añ. 3. vi.

Benzoi, id est, assæ aromaticæ

Asari

Hammoniæ añ. 3. iij.

Maceros

Agarici añ. 3. ij.

Carpobalsami 3. i.

Iridis

Croci

Rhei barbari ac pontici

Mastiches añ. 3. i.

Stœchados 3. v.

Fiat pulvis subtilissimus ex omnibus, & cum quadruplo mellis electi bene oꝝ expumati fiat mistura.

Mithridati experti D. Ioan. Manardi descriptio, quæ à multis hac ratione probatur, eò quòd ea quæ hãc ingrediuntur, facilius inueniuntur, quàm ea quæ aliam descriptionem. Non immeritò igitur hanc probauit Manardus, vir in arte medica peritissimus,

Mithridatum

D. N.

℞. Styracis calam. 3. i. 3. i.

Caryophyllorum

Nardi, siue spicæ nardi

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Orobi, id est, erui

Lentisci, malè, sed Leuistichi

Tragacanthæ

Massiches

Galbani

Gummi Cedri. & quia nō habemus, loco eius ponimus gummi Iuniperi: secundum Matthæum Syluaticum, est Vernix, vt apparet in cap. de vernice.

Aspalathi

Castorij

Offrei, id est, gummi hederæ

Bdellij

Terræ sigillatæ

Meliloti

Ladani

Opopanacis

Hammoniæ

Opij

Sulphuris viui

* Liquiritiæ

Nitri, siue salis nitri

Hypocystidis

Acaciæ

Rosarum

Chamædryos

Hypericonis

Abrotani

Pæoniæ

Hyssopi

Origani

Elenij, id est, Enulæ campanæ

* Glycyrrhizæ
uocant.

Ramicedri, quia non reperiuntur hic,
loco ipsorum ponunt folia Sauineæ:
quidam verò ramusculos Iuniperi,
sed Sauineæ melius est.

Daphnoidis, id est, foliorum lauri

Aristolochiæ longæ

Epithymi

Peucedani

Rorismarini

Centaureæ, scilicet minoris

Eryngij

Balauſtiæ

Cimarum myrti

Pſidiæ

Romei, id est, seminis Raphani

Scyllæ

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Anisi

Gith, id est, nigellæ

Hyoscyami

Fœniculi

Cymini

Cardamomi

Sefelis

Tesapij, id est, sinapis albi

Ammis

Sinoni, id est, Petroselini Macedonici

Seminis rutæ

Meconis, id est, papaueris albi

Apj

Dauci

Ormini, id est, seminis rapæ

Macropiperis, id est, piperis longi

Ocymi, id est, basiliconis

Amomi añ. 3. j.

Acori

Illaseos, id est, bardanæ

Cassami : secundum Compositorem,
est panis porcinus

Philis, id est, capparis

Zuccorariæ, id est, floris agni casti

Cathanecis, id est, cornu cerui añ. 3. ij.

Balsami, id est, liquoris emanantis
ab arbore balsami. & sunt qui in loco
balsami, quia non inuenimus, ponunt
myrrham liquidam

Cinnamomi

Croci

Costi

Schœnoanthos

Zingiberis

Foliū, id est, malabathri, & non sunt
folia caryophyllorum, vt quidam cre-
dunt: & in loco foliū, ponimus folium
caryophylli, vel spicam nardi.

Terebinthinæ

Myrrhæ

Olibani

Cassia, siue cassia lignæ

Agarici

Spicæ celticæ

Rhapontici

Iridis

Asari

Dictami

Prasij

Interioris colocynthidis

Stœchadis

Arthemisiæ

Calaminthæ

Scordij. & quia non inueniunt in hac regione, loco eius ponimus allium agreste.

Silphij, id est, assæ foetidæ

Chamæpityos

Melanopiperis, id est, piperis nigri

Leucopiperis, id est, piperis albi

Seminis petroselini

Anagodam, id est, Sumach

Cardami, id est, Nasturtij

Pentaphillon, i. quinquefolij añ. 3. j.

Daphnoidis, id est, baccarum lauri
grañ. vi. β.

Vini fortissimi & vetustissimi 3. j.

Mellis quod sufficit.

Mithridatum Nicol. dicitur mater omnium antidotorum, à Mithridate rege dictum qui composuit, faciens ad omnes passiones capitis virorum vel mulierum, si fuerint ex frigiditate: & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemicranicis confert, & do-

lorem supercilij patientibus, & lachrymantibus oculis, & ad omnia capitis vitia vel aurium: subuenit dentium doloribus & palato, & omnibus vitijs oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur, & iterum ad modum emplastri ponatur in temporibus unde fit discursio: Squinantiam soluit: apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripleumoniacis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanum fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & lientericis confert, si detur cum decoctione balauftiæ: extensionem humerorum, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: diaphragmati & hypochondrijs subuenit: renibus & vesicæ opitulatur, calculos frangit, menstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit, schlirosim patientibus & podagricis singulis præsidio est: præcipuè datur contra venena omnia; venenatos morsus, siue rabidi

canis, seu cuiuscunque reptilis, imposi-
tum siue bibitum, cum magna admira-
tione emendat: quotidianarijs & quar-
tanarijs etiam ante horam accessionis
cum vino tepido datū mirificè prodest.

Mithridatum Andromachi

secundum Syl.

℞. Acori

Phu Pontici

Hyperici

Acaciæ

Gummi añ. 3. ij.

Scinci 3. ij. oboli ij.

Anisi 3. iij.

Folij nardi Celticæ & Indicæ

Rosarum siccarum

Seminis foeniculi

Meu Athamanthici

Cardamomi

* Gentianæ añ. 3. iij. * alij trium postre-

Opj 3. iij. oboli ij. moram 3. ij.

Petroselini 3. iij. oboli iij.

Calsij

Polij

Seseleos

Costi añ. 3.v.oboli ij.

*Gallij 3.v.obo.ij. * *alijs* 3.vj.

Styracis 3.v.obo.iiij.

Myrrhæ

Castorij

Thuris

Succi hypocyfidos añ. 3.vj.

Spicæ nardi

Opopanacis

Schoenu anthus

Resinæ terebinthinæ

Scordij

Cypheos añ. 3.vj.oboli ij.

Seminis dauci 3.vj.oboli ij.

Opobalsami

Tapseos añ. 3.vj.oboli iiij.

Galbani 3.vij.

Croci

Cinnamomi

Zingiberis añ. 3.vij.oboli ij.

Glycyrrhizæ 3.vñ.ß.oboli iij.

Vini Chñ quantum sufficit.

Mellis Attici quantum sufficit.

Mithridatum Andromachi ad de-
leteria efficax est, & ad internos om-
nes affectus.

Mithridatum Damocratis

secundum Syl.

℞. Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis
Crocī

Agarici

Zingiberis

Cinnamomi

Spicæ nardi

Thuris

Thapseos añ. 3. x.

Opobalsami

Seseleos

Schoenu anthus

Stœchados

Terebinthinæ

Galbani

Costi

Piperis longi

Castorei Pontici

Succi hypocystidos

Styracis boni

Opopanacis

Foliorum malabathri noui añ. 3. viij.

Cassia nigræ

Polij

Piperis albi

Scordiij

Seminis dauci Cretici

Carpobalsami

Cypheos

Bdellij añ. 3. viij.

Nardi Celticæ

Gummi Arabici

Petroselini

Succi papaueris

Cardamomi

Seminis foeniculi

Gentianæ

Foliorum rosæ añ. 3. v.

Dictamni Cretici amplior vel æqualis portio.

Anisi

Ari

Acori

Phu

Sagapeni

Meu Athamantici

Acaciæ

Scinci ventris

Seminis hyperici añ. 3. ij. β.

Vini

Mellis ana quantum sufficit.

Micleta D. N.

Rx. Myrobalanorum citrinorum Indorum, chebulorum mundatorum & assatorum añ. 3. ij. β.

Cymini

Anisi

Marathri

Ammis

Carui añ. 3. i. β.

Bellericorum

Emblicorum assatorum añ. 3. ij.

Nasturtij torrefacti 3. ij. β.

Infusa sint in aceto die ac nocte, & postea assata puluerentur, tunc adde

Spodij

Balaustix

Mastiches.

Gummi Arabici

Sumach añ. 3. i. gra. xv.

Fricentur omnia cum oleo rosarum & distemperentur cum Syropo myrteo.

Micleta Nicol. experta est, & valet propriè ad hæmorrhoidas, & ad ventris torsionem & rugitum, lienterix & dysenterix, & optima est omni solutioni ventris.

Miua aromatica

D. M.

℞. Succu cydoniorū acidorum lb. xx.

Vini antiqui boni lb. x.

Mellis despumati lb. vi.

Cinnamomi

Cardamomi añ. 3. iij.

Caryophyllorum 3. ij.

Zingiberis

Macis

Ligni Aloës

Mastiches añ. 3. i. β.

Croci 3. ij.

Moschi 3. iij.

Galliæ 3. ij.

Confice sic: Succum & vinum igni lento semper despumando coque ad tertiæ partis consumptionem: cola, residendo clarescat. Claro adde mel, iterum coque & in eo suspende nodulo ligata aromata mediocriter trita præter crocum: identidem fricando eum in ipso medicamento donec crassescat. Deinde aromatiza moscho & galliæ.

Sunt qui saccharum loco mellis ponunt, & vtrunque sine, & cum aromatibus componunt.

Conditum ex cydonijs ventricu-
lum, hepar & cætera viscera roborat,
appetentiam excitat, coctionem iuuat,
vomitum & lienteriam sedat, medica-
mentum est celebre, ac expertum.

Miua simplex

D. M.

℞. Succī cydoniorum ℔. C.
Vini antiqui ℔. xl.

Succum coque in vase lapideo igni
lento ad dimidias, semper despuman-
do, cola: horis circiter tribus resideat:
claram partem exemptam cum vino
antiquo coque prunis ad crassitiem.

Potes etiam sic:

℞. Succī cydoniorum ℔. xl.
Aceti albi ℔. xx.

Succum ad dimidias coque, & cum
aceto percoque.

Vel sic:

℞. Succī cydoniorum acidorum li-
bras lx,

Menthæ siccæ

Foliorum citri añ. ʒ. viij.

Foliorum rosarum ʒ. iij.

Vini albi antiqui lb. xxv.

Mellis *uel*

Sacchari quantum sufficit.

Coque ad dimidias, cola, cum vino percoque addito melle vel saccharo, cum vel sine aromatibus. Quidā item vini loco acetum incoquant.

Condita hæc ex cydonijs eandem ferè cum superiore facultatem habent.

Mel Rosaceum

D. M.

℞. Rosarum rubearum præparatarum
vt in conferva, añ. partes ij.

Mellis boni, partes vi.

Coquantur cum facilitate sicut oportet. Et sunt qui ponunt mellis & succi rosarum partes equales, & non ponunt aliquid ex folijs omnino. sunt etiā qui ponunt foliorum partem j. ℞.

Succi, partem i.ß.

Mellis, partes iij.

Mel Rosaceum, stomachum confortat & mūdificat, & est digestivum materialiarum phlegmaticarū in stomacho & meseraicis contentarum.

Mel passulatum

D. Syl.

℞. Vuas passas, horis vigintiquatuor macera, percoque, colo exprime, expressum ad mellis consistentiam recoque & reconde.

Mel Violaceum.

℞. Florum violarum, partem i.

Mellis boni, partes iij.

Coquantur cū facilitate sicut oportet.

Mel violaceum, confert tepidè febrientibus, corpus humectat & relaxat, & valet ad siccitatem pectoris.

Mel Anthosatum.

℞. Florum Anthos, partem i.

Mellis, partes iij.

Fiat vt prius.

Manus Christi perlati.

℞. Zucchari clarificati & ab aqua
consumpti ℔.i.

Aquæ rosarum ℔.β.

Misce hæc duo, & simul bulliant
vsque ad aquæ consumptionem, &
zucchari duram coctionem. In fine
verò addatur

Margaritarum subtilissimè puluera-
tarum ℥.β.

Et proijciatur super marmor aspersum
vt suprà, & reseruetur.

Medicamentum de bryonia

D. M.

℞. Radicis bryoniæ mundatæ & tri-
tæ ℔.β.

Sapæ

Vuarum passarum añ. ℔.iiij.

Squillæ allatæ

Strobilorum purgatorum añ. ℥.i.β.

Seseleos

Salis gemmæ

Galliæ añ. 3. i.

Spicæ 3. β.

Agarici 3. iij.

Ex bryonia medicamentum apertè
efficax ad epilepsiam, paralytim, ver-
tiginem, & cæteros affectus frigidos
cerebri, spinalis medullæ, & tortorum
vtrinçq; neruorum. Datur post sex men-
ses à 3. ij. ad 3. v.

Oesypum sic

extrahit D. M.

℞. Lanæ ouium succidæ lb. circiter se-
xaginta, aqua calida horis octo mer-
guntur, semel feruefiunt, exprimuntur:
colatum reliquum igni lento in vase
stannato percoquitur semper ad mel-
lis fluxilis crassitiem, fundum mouen-
do lata rudicula lignea ne vratur.

Oxymel simplex.

℞. Mellis boni, partes ij.

Aceti, partem vnam

Aquæ fontis, partes iiij.

Et debent primò simul decoqui mel
& aqua, & despumari, ita quòd non
permittatur crescere spuma desuper.
Postea ponatur acetum, & decoquatur
ad perfectionem: & dicit Auicē. quòd
tantum debent decoqui quod hæc tria,
secundum acetum crudum: & quanto
mel magis spumat, tanto est deterius,
& tanto longiori & perfectiori indi-
get decoctione.

Oxymel simplex Mesues, conferens
in materiebus phlegmaticis grossis &
viscosis subtiliando, incidendo, & ab-
stergendo, aperiendo, & diuidendo, &
digerit materias febriū longi tēporis.

*Oxymel diureticum, quod com-
muniter præparatur.*

℞. Corticum radicum apij

Fœniculi añ. ℔. j.

Petroselini

Brusci

Sparagi

Seminis apij

Seminis fœnigræci añ. ʒ. i.

Decoquantur prædictæ radices & semina, in libris duabus aquæ, & in librayna aceti, vsquequo redeant ad medietatem ad modicū plus. Deinde cum melle quantum sufficit fiat Syrupus, qui decoquatur tādīu, donec suam perfectam habeat decoctionem.

Oxymel scylliticum

D. M.

℞. Mellis despumati ℔. iij.

Aceti scyllitici ℔. ij.

Coquatur vsque ad perfectam coctionem, & reseruetur.

Oxymel scylliticum Mesue valet contra materias frigidas, difficiles, &

submersas in locis difficilis eradicationis : contra eructationem acetosam, & vesicæ mollificationem mirè prodest.

Oxymel de radicibus, seu
diureticum D. M.

℞. Corticum mundatorum & incisorum radicis apij

Fœniculi añ. ʒ. ij.

Seminum apij

Fœniculi

Anisi añ. ʒ. i.

Aceti lb. x.

Aquæ lb. xx.

Mellis dimidium.

Conficitur sic : Cortices & semina vigintiquatuor horis macerantur in vase lapideo aceti & aquæ, tum coquantur ad tertiæ partis consumptionem, colato additur mellis dimidium & lento igne percoquitur.

Oxymel diureticum incidit, tenuat, terget; ob id obstructions ventriculi,

hepatis, lienis aperit : febres diuturnas
à bile crassa aut pituita iuuat, vrinam
mouet.

*Oxymel compositum de
quinque radicibus
Iac. Syl.*

℞. Corticum radicum apij

Fœniculi

Petroselini

Rusci

Asparagi añ. ʒ. ij.

Seminis apij

Seminis fœniculi añ. ʒ. i.

Aquæ lb. xij.

Aceti lb. i.

Mellis quantum sufficit.

Omnia in aceto & aqua macerantur & ad dimidias coquuntur : expressum post mellis quantitate idonea percoquitur.

Oxymel ex ligustico

D. M.

℞. Radicum apij

Foeniculi

Petroselini

Calaminthes

Dauci añ. ʒ. i.

Zingiberis

Seminis ligustici

Seminis apij

Seminis fœniculi

Anisi

Cari

Eupatoriij

Asari

Absynthij añ. ʒ. β.

Caryophylli

Galangæ añ. ʒ. iij.

Spicæ nardi ʒ. ij.

Aceti lb. x.

Mellis lb. v.

Coque in aceto ad dimidias, & cum
melle percoque.

Oxymel ex ligustico ad piquitatem

crassam, lentam, putrem, obstructions
hepatis & lienis aperiendas, vrinam
mouendam facit.

Oxymel ex calaminthe

D. M.

℞. Radicis apij

Radicis foeniculi

Radicis intybi añ. ʒ. i.

Schoenu anthus ʒ. ij.

Seminis apij

Seminis foeniculi

Anisi añ. ʒ. vi.

Calaminthes montanæ & domesticæ

Spicæ

Asari

Cassia

Mastiches

Dauci

Petroselini añ. ʒ. β.

Caryophyllorum

Ligustici

Zingiberis

Galangæ añ. 3. ij.

Aceti lb. viij.

Aquæ lb. vi.

Mellis despumati lb. v.

Vt artis est coque in aceto & aqua ad duarum partium consumptionem : demum mel adde.

Oxymel ex calamintha calfacit, incidit, terget humores crassos, lentos, putres : ob id intemperiem frigidam ventriculi & hepatis corrigit, scirrhum lienis & aliorum viscerum dissipat, febres diuturnas iuuat. Datur ab 3. i. ad ij.

Οἶνομέλι Vinum mulsum

D. M.

℞. Vini antiqui boni lb. x.

Mellis boni & despumati lb. ij.

Cinnamomi 3. v.

Spicæ nardi 3. i.

Caryophylli

Zingiberis

Ligni aloës

Macis añ. ʒ.β.

Cardamomi * ʒ.ij. *alij ʒ.iiij.

Croci ʒ.i.β.

Moschi ʒ.iiij.

Paratur sic: Tere omnia negligenter, cola panno raro & moscho aromatiza.

Vinum mulsum intemperiem frigidam ventriculi, hepatis sanat: flatus in eis & hypochondrijs dissipat: oris odorem, cutis colorem commendat.

Oxyzacchara simplex

D. N.

℞. Zucchari lb.i.

Succi malorum granatorum acetosorum ʒ.viiij.

Aceti ʒ.iiij.

Ponantur omnia ad ignem, donec ad formam syrupi redeant.

Oxyzacchara Nicol. ab oxos, quod est acetum, & zuccharo dicitur: valet

tertianæ, acutis, & quartanæ: nam verè purgant choleram in stomacho existentem.

Oxyzacchara composita.

℞. Capillorum Veneris
Scolopendriæ, siue ceterac
Hemionitidis, siue linguæ ceruinæ,
quam vulgò Scolopēdriam vocant,
sed falsò.

Polytrichi

Hepaticæ

Violarum

Fœniculi

Brusci

Sparagi

Graminis añ. ℔. i.

Confice sic: In succo malorum granatorum acetosorum, herbas & radices infunde per tres dies, quarta die modicum bullire desine, & cola cum depressione fortissima. Postea adde Zucchari quod sufficit; coque ad perfectam.

Etiam spissitudinem.

Oleum de Amygdalis dulcibus

D. M.

R̃. Ex amygdalis mundis ab vtraque cortice, partem aliquam, & tere contritione vltima, & fac pastones ex eis, & dimitte in loco calido per spatium quinque horarum. Iterum tere & pone in zainari, id est, in torculari, & exprime, & manabit oleum. Si autem in vase duplici per spatium horæ coxeris, deinde expresseris in torculari, emanabit abundantius. aut si amygdalis tritis saccellos impleueris, & sub cinere calido aut arena calida inter pannos sepelias, postea exprimas, abundantius emanabit oleum.

Oleum amygdalarum dulcium Me-
sues, leniens asperitatem gutturis, pul-
monis, & partium omnium exteriorum,
& omnes durities & stecitates
membrorum & iuncturarum, & cōfert

ethicis, & impinguat & augmentat
sperma, & iniectum confert ardori vul
uæ & vesicæ.

Oleum Amygdalarum amararum.

Sic fit præparatio amygdalarum ama
rarum sicut dulcium.

Oleum de amygdalis amaris est ape
ritivum opilationum, carminativum
ventositatum & resolutivum: & con
fert dolori aurium, & surditati, & sibi
lo: lenit asperitates & delet panum fa
ciei, & confert doloribus neruorum, &
duritiem eorum lenit.

Oleum Laurinum.

℞. Baccarum lauri electarum & ma
turarum & contritarum. in aqua diu
coquantur & colentur, quumq; infri
gidatum fuerit, illud pingue quod su
pernatat colligatur.

Oleum Laurinum excalfacit yehes

menter, & emollit: ita vt ñ, qui scabie
scatent, & asperis impetiginibus obsi-
dentur, illiti in balineo, persanentur.
Sed eo conuenit abstinere, lichenibus
& psoris, inflammationem minanti-
bus: in calidis quoque temperaturis &
biliosis: siquidē frigidis corporibus,
humidis & pituitosis congruit: item
iñs, quorum articuli algoribus, aut per-
frictione affliguntur: ischiadicis subsi-
dio est: vermes & pediculos enecat, fur-
fures capitis emendat, alopetias & o-
phiasas corrigit. Vfus eius, in lauacro
nitri: postea detergere oportet vino &
melle, & fœnigræci farina: sed cauē-
dum est, ne capiti dolorem sentiētī, lau-
rinum hoc oleum admoveatur.

Oleum Sesaminum

D. M.

Mundetur Sesamum ab omnibus im-
munditijs, deinde roretur super ipsum
aqua cum sale paucō, & confricetur

manibus, iterumq; roretur donec madescat: postea expandatur vt exiccetur, deinde affetur affatione modica, & ponatur in sacculo pāni asperi, & fricetur multū, donec excorticetur, deinde mundetur à corticibus, & molatur, & trahatur oleum sicut de amygdalis.

Hoc modo fiunt olea de semine lini, de granis papaueris, de semine lactucę, præterquàm non oportet vt excorticetur semen lini. Mesue in litera.

Olei Sesamini & eius iuuamenta sunt, quia impinguat, & addit in spermate, & leuat duritiem & asperitates, & clarificat vocem, & lenit guttur, & est materia multorum oleorum.

Oleum nardinum

D. M.

℞. Spicę aromaticę, id est, spicę nardi ʒ. iij.

Vini

Aquę añ. ʒ. ij. β.

Olei Sesamini lb.β.

Decoquatur in vase duplici, lento igne quasi per horas quatuor, & frequenter moueatur omni hora.

Vel sic:

℞. Spicæ nardi ℥.iiij.

Sampsuchi ℥.ij.

Xylaloës

Enulæ

Folij Indi

Calami aromatici

Foliorum lauri

Cyperi

Schoënu anthus

Cardamomi añ. ℥.i.β.

Vini

Aqua quantum sufficit.

Olei sesamini lb.vi.

Antequam terantur vino & aqua sufficienti, & oleo sesamino mergantur: coque vase duplici igni lento horis sex singulis horis mouendo. Vel sic:

℞. Spicæ nardi ℥.iiij.

Styracis

Caryophyllorum añ. ʒ. iij.

Nucis moschatæ ʒ. v.

Olei balsami ʒ. vi.

Olei sesamini lb. iij.

Coque vt prius horis quinque.

Oleum nardinum, est oleum benedictum, & prodest maximè ad omnes ægri-
tudines frigiditatis & ventositatis,
neruorum, stomachi, hepatis, splenis,
renum, vesicæ & matricis: & cōfert do-
lori capitis, & hemicranæ secundum
omnem formam administrationis.

Oleum de Costo

D. M.

Rx. Costi amari ʒ. iij.

Cassia ʒ. i.

Extremitatum sampsuchi ʒ. viij.

Vini odoriferi quod sufficit, ad infun-
dendum noctibus duabus.

Olei sesamini lb. iij.

Decoque sicut oleum Nardinum.

Oleum costinum Mesues, neruos & lacertos calefaciens, & aperiens oppilationes eorum, & confortans omnia membra neruosa, & confert stomacho & hepati, & confortat capillos, & prohibet caniciem, & facit colorem, & odorem corporis bonum.

Oleum Rutaceum

D. N.

℞. Olei oliuarum completarum lb. iij.
Foliorum rutæ
Succi earum añ. 3. iij.
Et fiat oleum secundū artem vt decet.

Oleum rutaceum, calfacit & resiccat: quare destillationibus auxiliatur: doloribus cum thoracis, tum reliquarum partium quæ vim caloris desiderant, remedio est.

Oleum Anethinum

D. M.

℞. Olei communis lb. ij. 3. iij.

Florum anethi ℥.x. ʒ.ij.

Flos anethi tribus diebus infundatur in oleo: quartaverò die lento igne modicum coquatur diligenter & extrahatur, & iterum decoctioni addantur florum anethi ʒ.ij. & ad solem suspendatur, & vsui diligenter reseruetur.

Oleum anethinum Mesues, sedatiuum dolorum, resolutiuum, prouocatiuum sudoris, conferens rigori febris inuncta spina, prouocans somnum, & confert dolori capitis.

Oleum Chamæmelinum

D. M.

℞. Olei dulcis lb. ij. ʒ. iij.

Florum Chamæmeli lb. i.

Fiat sicut oleum anethinum, vt decet secundum artem.

Oleum Chamæmelinum Mesues, benedictum, expertorum iuuamentorum, sedatiuum dolorū & resolutiuum, & est in eo prohibitio cursus materiae

rum propter stipticitatem eius modicam, & confortat nervos & nervosa omnia, & confert doloribus eorum.

Galenus ei vim laxandi, non adstringendi adscribit. Paulus sumit florum absque albo, per naturalem diem siccatorum ℥. ij. pro sextario vno Italico, & tegit vas linteo simplici vt transpiret, & exponit soli per quadraginta dies: post bene obturato vase reponit. vbi non habes flores virides, potes facere ex siccis, & coquere in vase duplici, sed erit debilius.

Chamæmelinum oleum, vt inquit Actuarius, illitum per se vel cum temperato calore, rarefacit, longas maxime febres discutit: quod si ex mero calido, dolores omnium corporis membrorum illitu leuat.

Oleum Myrteum.

℞. Olei lb. ij.

Myrtorum lb. j. confrangantur

Vini optimi lb. ij.

Misce simul, bulliant vsque ad consumptionem vini, deinde coletur & reseruetur.

Oleum myrteum, refrigerat & adstringit: ideoq; coeliacis adfectibus subuenit: sanat igne ambusta: pustulas erumpentes illitu emendat: attritus hyeme concitatos & intertrigines, illitum corrigit: sedis rimas, condylomata, laxatos artus persanat, & sudores coërcet.

Oleum Irinum.

℞. Radicum Iridis ʒ. ij.

Floris eius ʒ. iiij.

Aqua decoctionis radicum eius lb. j.

Olei oliuarum uel

Olei sesamini lb. ij.

Bulliant in duplici vase, vsque ad aquæ consumptionem, deinde cola, & permuta radices & flores & aquam decoctionis, & hoc bis fiat, deinde cola & reserua.

In hunc modum communiter parāt.
Aliud vide apud Dioscorid. quod certe magnarum esset virium si bene pararetur.

Oleum Irinū Mesues, abstersivum, resolutivum, maturatiuū, & sedativum dolorum frigidorum: subtiliativum & maturativum materialium in pectore, & pulmone existentium, & confert doloribus iuncturarum, & lenit durities earum, & apostemata dura, & scrophulas, & confert dolori & frigiditati matricis, & spasmo, & dolori auris, & foetori narium.

Oleum Rosaceum

D. M.

Accipe oleum de oliivis, aut oleum sesaminum recens, lauetur cum aqua fontium lotionibus pluribus, deinde accipe foliorum Rosarum rubearum recentium contusarum quantitatem sufficientem, & sepelias in oleo quod la-

uasti, & obtura orificium eius, & expone soli per dies septem: deinde coque in vase duplici per horas tres: deinde fac permutationem foliorum rosarum, & vtere alijs recentibus, & dimitte per alios dies septem: deinde exerce coctionem in eo sicut fecisti prius, & fac de nouò permutationem foliorum rosarum, & proijce super illud aquæ infusionis descriptæ in litera I. sicut est quantitas olei, & stringe orificium vasis, & dimitte in sole per dies quadraginta.

Alij non soli exponunt, sed in puteo ponunt: alij fodiunt sub terra quadraginta dies.

Oleum rosaceum Mesue, & est primus modus, confortatiuum & resolutiui conuenienter, lenitiuum & sedatiuum. Rude verò est extinctiui inflammationum, confortatiuum, aggregatiuum, & prohibitiuum cursuum: propter quod potentissimum est potatum ad dysenteriam, & ad fluxum ma-

teriarum per corpus. Et differt completum à rudi: quoniam materia completi est cum folijs rosarum completarum. Materia autem rudis est, ex oliuis quibus nondum accidit maturatio, & ex folijs rosarum non completarum.

Oleum rosaceum virtutem habet frigidam & stypticam, & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimum est: ardores autem & calores quos stomachus plenus sua ventositate conficit, in toto seu in parte aufert: & doloribus quandoq; in capite toto vel in parte confert, si ex ipso inungatur caput: confert etiam doloribus existentibus in stomacho, seu in intestinis ex acedine humorum, mixtum cum mastiches ʒ. ij. & sufficienti cera in ipso solutum: & postea locis inunctis ad erysipelas est vtile.

Oleum Violaceum.

℞. Olei oliuarum lb. ij.

Violarum \mathfrak{z} .iij. scilicet viridium, con-
tusarum.

Reponantur in vase vitreo, & soli ex-
ponantur per dies septem, deinde bul-
liant in duplici vase per horas tres.

Postea colentur, & vsui referuentur.

Oleum hoc, Iaton vocat Paulus, con-
ficiq; dicit vel ex purpureis, vel ex cro-
ceis, vel leucoio. Et modus operatio-
nis vt rosacei: non tamen tandiu in sole
morari debet, sed dies tantum decem:
mutandasq; dicit ter violas, exacteq;
claudendum vas ne transpiret: adden-
dasq; demum siccas violas.

Oleum violaceum Mesues, inflam-
mationes sedans vbicunque sint, & le-
nit asperitates pectoris & pulmonis, et
sedat apostemata calida & pleuresim.

Oleum ex Cotoneis

D. M.

\mathfrak{R} . Carnium cotoneorum tritorum
cum cortice suo quibus media acci-

dit maturatio.

Succi eorum añ. partes æquales.

Olei ex oliuis incompletis quod sufficit.

Pone in vase vitreo per dies quinde-
cim ad solem, deinde coque in vase du-
plici per horas quatuor : post illud fiat
mutatio cotoneorum, & succi eorum,
& fiat sicut dictum est bis vel ter, dein-
de cola & reconde.

Oleum cotoneorum Mesues, stoma-
chum & membra nutritionis confor-
tans, & nervos, quibus accidit laxitas,
& prohibet multitudinem sudoris.

Magni vsus est etiam in ventris flu-
xibus. Vide aliam pulchriorem præ-
parationem apud Dioscorid. Paulus
melinon appellat, & in hunc modum
componit : Cotoneorum bene deterfo-
rum & cum suis corticibus incisorum
accipit ʒ. iij. olei omphacini sextari-
um vnum, exponit soli diebus quadra-
ginta.

Oleum Mastichinum.

℞. Mastiches ℥.iij.

* Olei rosati ℥.xij. * Mes. sesamini

Vini boni ℥.viij.

Coque in vase duplici vt decet.

Oleum mastichinum Mesues, secundum quod in usu est, confortans stomachum, nervos, hepar & iuncturas, & lenit apostemata dura, & sedat dolores.

Oleum ex pomis mandragoræ

D. M.

℞. Succi pomorum mandragoræ maturorum

Olei sesamini añ. partes æquales.

Coque in vase duplici ad succi consumptionem. Succus tantundem sufficit, coque vt prius: Idem tertio fac & reconde.

Oleum ex mandragoræ pomis inflammationem omnem extinguat, somnum conciliat.

Oleum

Oleum enulatum

D. M.

℞. Radices enulæ tufas
 Succī aliarum enulæ radicū
 Olei ſeſamini ana partes æquales.
 Vini odori partem dimidiā.

Coque atque confice vt in oleo myr-
 tino dictum eſt.

Oleum enulatum calfacit, tenuat, di-
 gerit: ob id affectibus neruorum, vteri,
 veſicæ frigidis prodeſt, ac febrīum ri-
 gori, & colo à flatibus dolenti.

Oleum ex ſtyrace

D. M.

℞. Styracis ℥. iij. uel iij.
 Olei ſeſamini lb. i.

Coque vt maſtichinum, & colatum
 repone.

Oleum ex ſtyrace calfacit: ob id con-
 fert dolentibus à frigore renibus, veſi-
 cæ, vtero, neruis, muſculis, tendoni-

bus, iuncturis.

Oleum Cyprinum

D. M.

Rx. Florum cypri ℥.iiiſs.

Olei veteris ℥.x.

Coque vt rosatum. vel penuria florum folia cum modico vino bis mutata coque in dicta olei mensura.

Oleum de alkanna partes neruofas roborat, capillos à canitie vindicat.

Oleum de Castoreo.

Rx. Castorei ℥.i.

Olei lb.i.

Decoquatur castoreum in oleo vsq; ad consumptionē tertiæ partis, & conseruetur oleum in puluere castorei.

Oleum de Euphorbio.

Rx. Euphorbiſs ℥.β.

Olei de cheiri ℥.v.

Vini odoriferi tantundem.

Coque vsque ad vini consumptionē

nem, & vtere. Vel sic:

℞. Staphidos agnæ

Struthij añ. ʒ.β.

Pyrethri ʒ.vi.

Succi calaminthes montanæ ʒ.i.β.

Costi ʒ.x.

Castorij ʒ.v.

Vini odori lb.iiij.

Olei leucoij lutei uel

Olei sesamini lb.ii.β.

Euphorbij recentis albi & tenuissimè
triti ʒ.iiij.

Omnia trita triduoq; in vino mace-
rata ad dimidias coquantur: deinde fri-
ca multum diuq; manibus; & cola. Co-
latum cum oleo percoque ad vini reli-
qui consumptionem: tunc insperge eu-
phorbium, & miscendo coque.

Oleum de Euphorbio est medicina
solennis ad ægrotudines neruorum fri-
gidas, & dolorem eorum, & dolorem
iuncturarum, & dolorem hepatis &
splenis, & fit caputpurgium ex eo ad

sodam hemicraneam & lithargiam.

Galenus ex solo euphorbio & oleo parat, euphorbium vel augens vel minuens, iuxta maiorem minorem uel indigentiam. vide lib. ij. de compos. medic. secundum locos.

Oleum Vulpinum

D. M.

℞. Vulpem integram tantum exenteratam

Aquæ fontanæ

Aquæ marinæ añ. sext. i.

Olei antiqui clari sext. ij. β.

Salis ℥. iij.

Aquæ dulcis cui hyssopi anethi ana
M. i. sit incoctus, quantum sufficit
ad affusionem

Hyssopi

Anethi añ. lb. i.

Vulpem exenteratam aquis, oleo & sale coque ad aquarum cōsumptionem & vulpis artuum dissolutionē. Postea

aquam dulcem affunde vasi, & cum dictis herbis ad huius aquæ consumptionem recoque. Vel vulpes in aqua fontana & falsa cum herbis dictis sine oleo percoquatur, ad carniū vulpis & artuum dissolutionem.

Aqua hæc ad fotum vel balneum paritium affectarum est efficax.

Vulpem viuam sumit Paulus, & coquit in oleo.

Oleum vulpinum Mesues, est medicamen nobile, vltimū ad arthriticam, podagram, dolorem renum, & dorsi.

Oleum ex Tartaro.

℞. Tartari, id est, vini albi ℔.ij. vel quantum volueris. Pulueretur, & inuoluatur in panno lineo, vel in stupis, deinde madefiat in aceto albo forti, vt totum sit madidum, deinde coquatur sub cineribus optimè calidis quousque bene nigrescat, tunc iterum pulueretur, & ponatur in catino inclinato in loco

frigido, & stet sic per octo dies, quousque resoluatur in oleum & fluat: & si non fluxerit, exprimatur in vase vitreo, & reseruetur.

Oleum ex tartaro est, quo mulieres leniunt facies suas: abstergit enim faciem mirabiliter.

Oleum Scorpionum

D. M.

℞. Scorpiones viginti, vel plus, vel minus, secundum quantitatem eorum, & pone in vase vitreo, & funde desuper olei amygdalarum amararum libras duas, & stringe caput vasis, & dimitte in sole diebus triginta, deinde cola & vtere. Vel sic:

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Cyperī

Corticum radicis capparis añ. ʒ. i.

Olei amygdalarum amararum sext. i.

Scorpionum num̃. à x. ad xv.

Omnibus in oleo coniectis, diebus viginti insolentur in vase vitreo operculato: deinde scorpiones oleo iniice, obtura, insola iterum mense vno.

Oleum scorpionū Mesues, lapidem in renibus & vesica frangit, & expellit eum: lumbis, pubi, perinæo illitum, & iniectum per virgam. Paratur nunc cum oleo antiquo, additis multis simplicibus medicamentis ad venena laudatis: estque mirabile in pestilentia & venenis omnibus.

Oleum de Lilio.

℞. Olei oliuarum ℔.j.

Florum liliorum alborum sine croceo
℥.iiij.

Fiat oleum, sicut oleum chamæmelinum.

Vel sic:

℞. Foliorum lilij ℥.viij.

Mastiches

Calami aromatici

Costi

Carpobalsami añ. ʒ. i.

Caryophyllorum

Cinnamomi añ. ʒ. ʒ.

Croci ʒ. iij.

Olei dulcis *uel*

Olei sesamini lb. ij.

Florum lilij quantum sufficit.

Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente vigintiquatuor horis mace-
rentur, semel aut bis ferueant. Tunc in-
ijce oleum & additis floribus in vase
vitreo insola dies quadraginta: post
colatum reponatur.

Oleum è lilio calfacit, resoluit: ob-
id à frigore dolores thoracis, ventricu-
li, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, lenit
& coquit, muliebribus vitijs congruit:
vlcera capitis manantia, furfures, va-
ros & feruidas eruptiones illitu emen-
dat, & vitia à frigore contracta sanat:
omnem discutit inflammationem, cum
croco perunctum: potum, deiectionem

bilis molitur : stomacho inimicum, & nauseam parit.

Oleum de floribus Papaueris Mes.

℞. Florum, foliorum, & capitum papaueris viridium contusorū añ. ʒ. iij.
Olei oliuarum incompleti lb. i. ʒ. iij.
Fiat oleum secundum artem vt decet.

Oleum de floribus papaueris Mesues, sedans dolores calidos & faciens principaliter ad somnum prouocandū, quando causa vigiliārū est mala complexio calida ab ascensione vaporum acutorum ad caput, si ex ipso inungantur tempora, nares, aures, & tota frons.

Oleum de Nenufare

D. M.

℞. Olei oliuarum immaturarum lb. i.
Florum Nenufaris viridium contusorum ʒ. iij.

Reponantur in vase vitreo & facias

prout de oleo violaceo tibi dixi, & de positione ad solem, et de decoctione, & de permutatione florum, & de additione infusionis.

Oleum de Nenufare Mesues, conuenit ferè cum oleo de Papauere, quum non sit tantę stupefactionis: sæpe tamen quum quærimus somnum prouocare, permiscemus adinuicē oleum hoc cum oleo de papauere: est etiam alteratiuum malæ complexionis calidæ ubi cunque reperiat.

Oleum Menthæ.

℞. Foliorum menthæ

Succi eius añ. ʒ. iij.

Olei oliuarum completarum lb. iij.

Tria hæc reponantur in vase vitreo, et soli exponantur per dies quindecim, os vasis obturando: deinde bulliant per quatuor horas, deinde colentur manibus fortiter exprimendo: & hoc idem ter reiteretur semper modo prædicto sa-

ciendo, deinde cola & reserua.

Oleum Menthæ magistrale, stomacho debili, frigido, & nauseanti miro modo subueniens, ipsum refocillās, & omnem eius iniuriam detergens: nauseam & vomitum sedans, & digestionem confortans, & appetitum procurans, soluens schlirosim, & duritiem apostematum.

Oleum de Absinthio.

℞. Summitatum absinthij

Succi eius añ. ʒ. iij.

Olei oliuarum lb. iij.

Ex his facias prout superius tibi monstraui.

Oleum de absinthio magistrale calefaciens & confortans membra frigida, corroborans stomachum, & excitans appetitum mortuum, oppilationes aperiens, & morbos oppilationum à causa frigida curans, vermes interficiens & educens si in vnguentis & em.

plastris contra ipsos apponatur.

Oleum Lumbricorum.

℞. Vermium terræ ℥.β.

Olei oliuarum ℥.ij.

Vini ℥.ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum
vt decet.

Oleum lumbricorum nervos infri-
gidatos confortat, vtile est doloribus
iuncturarum.

Oleum de Cheiri.

℞. Cheiri ℥.xij.

Olei oliuarum ℥.ij.

Flos cheiri tribus diebus infundatur
in oleo: quarto verò die lento igne mo-
dicum coquatur diligenter & extraha-
tur. Et iterum decoctioni addantur flo-
rum cheiri ℥.ij. & ad solem suspenda-
tur, & vsui diligenter reseruetur.

Oleum de cheiri est resolutiuum, se-
datiuum dolorū qui fiunt in nervis, in
iuncturis, & pectore, renibus, et vesica.

Oleum ex thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ ℥. iij.

Aquæ lb. i.

Olei sesamini ℥. viij.

Lactis dulcis & recentis ℥. vi.

Macera folia in aqua vigintiquatuor horis, post coque cum oleo & lacte ad aquæ & lactis consumptionem; colatum reconde.

Oleum ex mezereo hydropi confert, ac vlceribus malignis, cutis fœditatem terget.

Oleum de thymo

D. M.

℞. Thymi ℥. iij.

Zingiberis ℥. i. β.

Aquæ dulcis quantum sufficit.

Succi extremitatum thymi ℥. iij.

Olei sesamini ℥. xij.

Coquantur in vase vitrato ad aquæ

& succi consumptionem. Vel sic;

℞. Succi thymi

Olei sesamini

Lactis vaccini recentis añ. ℥. ij.

Penidiarum albarum ℥. v.

Zingiberis albi ℥. i. β.

Coquantur ad lactis & succi consumptionem.

Oleum Sericinum renum, vesicæ, ilium dolori confert: vrinæ difficultatem leuat iniectum in sedem, vel meatum vrinarium. Posterior compositio etiam dictas partes & iuncturas roborat, earumq; dolorem lenit, colorem bonum reddit, venerem excitat.

Oleum de cucumere asinino

D. M.

℞. Succi cucumeris agrestis maturi

Olei sesamini ana partes æquales.

Coque ad succi consumptionem.

Vel sic;

℞. Succi radicum cucumeris asinini

Radicum ipsius tritarum añ. lb. β.

Olei sesamini lb. j.

Coque ad succi consumptionem.

Oleū *σινώνιον* epilepsiā, hemicraniā
& alios cerebri affectus frigidos nari-
bus immissum leuat, & strumas, & sur-
ditatē, panū & cicatrices nigras delet.

*Oleum de pomis citreis vel
arantijs D. M.*

℞. Pomorum citreorum vel arantio-
rum maturorum num. xij.

Olei sesamini lb. ij.

Aquæ fontanæ

Aquæ marinæ añ. quantum sufficit.

Penidiarum albarum ℥. viij.

Poma integra in vase vitrato cum a-
quis & oleo coque ad aquæ cōsumptio-
nem. Iterū in aquæ dulcis lb. j. β. cū pe-
nidijs coque ad aquæ cōsumptionem.

Oleum de pomis citrangulorum ad
iuncturarum dolorem datur ab ℥. j. ad
℥. ij. cum potu, cibo, obsonijs.

Oleum croci

D. M.

℞. Croci ʒ. i.

Myrrhæ puræ ʒ. β.

Aceti quantum sufficit ad macerandum

Cardamomi ʒ. ix.

Olei lb. i. β.

Crocum & myrrham diebus quinque aceto macerentur: die sexto adde cardamomum: septimo cum oleo coquantur igni lento ad aceti consumptionem. Loco aceti sunt, qui vinum supponant.

Oleum croci nervos & vterum roborat, amborumq; dolorem sedat, durities dissipat, coloris gratiam efficit.

Oleum ex piperibus

D. M.

℞. Trium piperum añ. ʒ. iij.

Cepularum

Bellericarum

Embli

Emblicarum

Indarum añ. 3.v.

Radicum apii

Fœniculi añ. 3.iiñ.ß.

Sagapeni

Opopanacis

Hyoscyami albi añ. 3.ñ.ß.

Turbith honi albi 3.xñ.

Zingiberis 3.iiñ.

Surculorum hyssopi recentium

Foliorum ruthæ virentium añ. M.j.

Aquæ lb. xxiiñ.

Olei cicini heminañ.

Omnia parum trita coquātur ad tertiam partem in aqua, coletur, cum oleo cicini ad aquæ consumptionem percoquatur. Alij addunt:

Ireos 3.vi.

Thapsiæ 3.ñ.

Anisi

Cardamomi añ. 3.i.ß.

Calami aromatici 3.ñ.ß.

Spicæ nardi 3.i.

Expresſionis hyſſopi

Expresſionis thymi, ſextarios iſſ.

Poteſt poni loco cicini oleum

Irinum *vel*

Leucoii lutei *vel*

Amygdalarum amararum

Vel omnium ſimul quatuor, añ. hemina
nam dimidiam.

Oleum ex piperibus iuuat morbos
neruorum frigidos, vt paralyſin, ſpaſ-
mum, ſpaſmum cynicum, tremorem,
epilepſiam: ad hæc iſchiadem & cæte-
ras arthritidis differentias, & vteri, &
coli, renum, veſicæ affectus frigidos:
quia calefacit, tenuat, terget: ob id ob-
ſtructiones aperit, calculum frangit.

Oleum ex uiperis

D. M.

℞. Viperarum nigrarum integrarum
lb. ij.

Olei ſeſamini ſextarium i. β.

Ad diſſolutionem carniū igne leno

ro in vase vitreato angusti oris exactè obturato, ne illius obnoxio vapore offendaris, percoque, & vbi refrixerit, vitreo vase repone.

Oleum de serpentibus cutim expurgat, impetigines sanat, penna partibus affectis illitum.

Oleum ex ranis

D. M.

℞. Caput ranarum antiquarū lb. β.
Olei sesamini sext. β.

Coque capita cū oleo in vitreo vase bene obturato ad caput dissolutionem, vti viperinum oleum.

Oleum ex ranis refrigerat: ob id podagram & alias arthritidis species calidas mitigat, & incendium febrium ardentium fronti & tēporibus illitum: quando etiam somnum conciliat.

Oleum de ouis D. M.

℞. Vitelli ouorum elixando durato.

rum num̃. xxx. aut circiter manibus friati in sartagine terrea plumbata frigrantur igne mediocri, mouēdo ligneo cochleari, aut terreo donec rubescēt, & oleū ab his resoluatur, quod pressi cochlearii largius remittent. Vel, Iidem vitelli elixando indurati mola frangantur, deinde in offas tundantur, & torculari exprimantur, quale in oleo amygdalino explicuimus, & oleum destillabit. Vel, ipsi vitelli corpulento vasi imponantur, oleumq; in capitellum ignis violentia tollatur, qualiter oleū philosophorum.

Oleum de ouis probatum est cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare, capillos regnere, vlcera maligna & fistulosa curare.

Oleum ex frumento

D. M.

℞. Frumētum quod inter laminas fer-

reas mediocriter ignitas preme, oleumq; excipe. Vel, Triticum excorticatum vase sublimationis destilletur, qualiter oleum philosophorum.

Oleum ex frumento impetigines & cutis asperitates curat.

Oleum iuniperi

D. M.

℞. Sarmenta iuniperi tenuia, in vase vitrato oris angusti conice ac reple, laminam ferri tenuem foraminibus multis in cribri triticei modum pertusam ori toti applica, luta eandem cum ore tum dicti vasis tum alterius minoris etiam vitrati oleum excepturi quod terræ ubi infoderis, igne luculento maius alterum iuniperi frustula capiens, circumda horis duabus, sicq; oleū in vas minus destillabit.

Oleum Iuniperi emendat cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna qualia quæ in tibiis & cruri-

bus quorundam : malum mortuum recentiores vocant.

Oleum Philosophorum

D. M.

℞. Lateres ex terra rubente multum antiquatos in frusta cōminutos ac carbonibus non fumantibus accende, donec igniti rubeant: tunc concha, oleo roſis marini, vel antiquo claro plena extingue, & quoad eius fieri poteſt, oleo imbuere, ſicca per ſe in capſulis, poſt minutiffimè tere, & vaſi per ſublimationem deſtillandum trade, tuto chymiſtarum capitello cōmitte, carbonibus in fornace accenſis coque donec oleum deſtillet in phialam vitream, naſo imo capitelli agglutinatam, quam exactè obſtructam reconde & ſerua: quanto enim antiquiùs, tantò valentiùs.

Oleum philoſophorum artificiale (nam Naphtha minerale eſt) veterum omniũ conſenſu effectibus ſecretis non

paucis est efficacissimū. Calfacit enim
siccat, essentiæ tenuitate in altum pene-
trat, digerit. Proinde materiā omnem
excrementosam consumit. Ob id epile-
psiæ, paralyssi, vertigini, obliuioni, &
lienisi, renum, vesicæ, vteri, neruorum,
articularum omnium, & reliquarum
partium neruosarum doloribus frigi-
dis maiorem in modum confert.

Puluis violarum

odoriferus, quem ego in officina mea soleo dispensare.

R. Iridis Florentiæ lb. β.

Rosarum ʒ. iij.

Cyperī ʒ. β.

Maioranæ

Caryophyllorum añ. ʒ. i.

Santali albi odoriferi

Beniouin añ. ʒ. iij.

Styracis calamitæ ʒ.i.

Pulvis violarum odoratus

D. Syl.

℞. Radicis iridis Florentiæ lb. iij.

Maioranæ siccæ quart. j.

Calami aromatici ʒ. iij.

Rosarum

Violarum añ. ʒ. v.

Caryophyllorum ʒ. j. β.

Moschi ʒ. j.

Pomum Ambræ

D. Syl.

℞. Styracis calamitæ ʒ. j.

Caryophyllorum ʒ. ij.

Benioin ʒ. β.

Ambræ ʒ. β.

Moschi gra. xv.

Pulvis violarum dicti, quantum sufficit.

Aquæ rosarum, quantum sufficit ad co-
gendum.

Pomum Ambræ.

In hac forma quam tu vides consueui
sic conficere.

℞. Styracis calamitæ ʒ.i.β.

Benioin ʒ.ij.

*Ladani ʒ.β.

*Ladanum de cio
stho colligitur.

Caryophyllorum

Santali albi añ. 3.iiij.

Rosarum

Maioranæ añ. 3.ij.β.

Moschi

Ambræ añ. ʒ.i.

Formetur pomum cum infusione gum
mi tragacanthæ in aqua rosarum.

Puluis contra Pestem.

℞. Radicum tormentillæ

*Dictami

*Dictamo vera
caremus.

Tunicis

Scabiosæ

Radici buglossæ añ. ʒ.β.

Seminis citri

Seminis acetosæ añ. 3.iiij.

Coriandri præparati 3.ij.

Rosarum rubearum 3.i.

Seminis portulacæ 3.ij.

Rasuræ eboris 3.ij.

Corallii albi

Corallii rubei añ. 3.i.β.

Terræ sigillatæ 3.β.

Boli Armenici 3.ij.

Misce, & fiat puluis.

Puluis Electarij de bolo.

℞. Omnium santalorum

Galangæ

Ligni aloës

Cinnamomi

Corallii rubei

Rosarum rubearum

Seminis melonum añ. 3.β.

Radicis tunicis

Radicis tormentillæ añ. 3.iij.

Rasuræ eboris

Cornu cerui añ. 3.β.

Nucis muscatæ num. j.

Maceros

Cubebæ añ. 3. i.

Anisi

Marathri

Zingiberis añ. gra. xv.

Seminis acetosæ

Seminis citri

Seminis iuniperi

Seminis coti, id est, Bombacis.

Caryophyllorum añ. 3. β.

Boli Armenici 3. ij.

Fiat puluis.

Dosis ad pestē. Boli Armeni 3. ij.
cum aqua rosarum 3. ij.

Vini 3. β.

Puluis contra Lumbricos.

Rx. Seminis contra Lumbricos
3. i.

Lupinorum 3. β.

Absinthii 3. ij.

Cornu cerui vsti 3. j. β.

Misce, & fiat puluis.

Pulvis Bezeardicus.

℞. Boli Armenici ʒ.ij.

Rosarum rubearum ʒ.j.

Seminis acetosæ

Seminis citri mundati

Cornu cerui adusti

Seminis ruthæ

Doronici Romani

* Carabe

Seminis cardui benedi-

cti añ. ʒ.iiij.

Vtriusque corallii

Ligni aloës

Serici crudi

Omnium Santalorum

Margaritarum perforatarum

Ossis cordis ceruini añ. ʒ.j.

Smaragdorum ʒ.ij.

Pulvis diamargariton. frigid.

* Tormentillæ

Dictami

Tunicis

* ὕλη καρπὸν Græc

ci : Latini succia-

nun vocant.

* Pentaphyllum

vocant.

Scabiosæ

Coriandri

Terræ sigillatæ añ. ʒ. ij.

Camphoræ ʒ. ij.

Croci gra. xv.

Ambra ʒ. ij.

Moschi ʒ. iij.

Fiat puluis.

Puluis xylaloës

D. M.

℞. Ligni aloës ʒ. β.

Galliæ aur. i. β.

Sacchari albi ʒ. i. β.

Puluis ligni aloës ventriculi humiditatem immodicam siccatur. flatus dissolvit, coctionem iuvat. Potatur ʒ. iij. cum miua.

Puluis ligni aloës alius

D. M.

℞. Xylaloës ʒ. iij.

Cardamomi

Menthæ siccæ

Spicæ

Marrubii

Cyperii

Corticis citri añ. ʒ. ʒ.

Galliæ

Schoenu anthus añ. ʒ. i.

Mastiches

Anisi

Apii añ. ʒ. ʒ.

Sacchari pondus omnium.

Hic puluis cor & ventriculum roborat, oris odorem commendat, coctionem iuuat. Datur cum miua.

Puluis diarrhodon

D. M.

℞. Trochiscorum diarrhodon

Mastiches añ. ʒ. i. ʒ.

Succini

Menthæ siccæ

Ligni aloës añ. ʒ. ʒ. β.

Puluis diarrhod. intemperiem venæ

triculi frigidā corrigit: ob id dolorem
inde natum sanat, ipsumq; roborat. Da
tur ʒ. j. cum vino odorifero.

Puluis aromatum

D. M.

℞. Anisi aur. xij.

Seminis fœniculi aur. iiij.

Glycyrrhizæ

Zingiberis añ. aur. iij.

Caryophyllorum

Macis

Cinnamomi electi

Galangæ

Galliæ muscatæ añ. aur. ij.

Ligni aloës

Corticis citri ana aur. j. ʒ.

Moschi boni ʒ. i. quartam.

Sacchari albi ad pondus omnium

Sacchari candefacti dimidium pōdus
omnium.

Puluis arom. ventriculum roborat,
coctionem iuuat, flatus dissoluit, hali-

tus gratiam commēdat. Dantur aur. ij.
cum vino bono.

Pulvis impinguare expertus

D. M.

℞. Farinæ cicerum ter lacti dulci in-
fusorum, & siccatorum, deinde co-
ctorum ℥. vi.

Oryzæ frequenter lotæ ℥. ij.

Tritici

℥

Hordei exiccatorum & sæpe lotorum
& excorticatorum: & sæpe lacti in-
fusorum & siccatorum añ. ℥. iij.

Amygdalarum dulcium ℥. v.

Papaueris.

Panis albi bis cocti

Seui añ. ℥. iij.

Sacchari albi lb. i.

Tere, da sorbendas in dies mane ℥.
iij. coctas cum lacte aut aqua cicerum.

Pulvis baccarum myrti

D. M.

℞. Bac

℞. Baccharum myrti

Granorum granatorum acidorum to-
storum añ. 3. xx.

Cymini Carmani aceto vigintiqua-
tuor horas infusi & siccati

Coriandri sicci similiter infusi, siccati
& torrefacti

Polentæ

Succi mespilorum immaturorum

Cerationum

Rhois

Glandium añ. 3. x.

Acaciæ

Hypocystidos añ. 3. v.

Pulvis baccharum myrti ad ventri-
culi & aliorum viscerum imbecillita-
tem datur.

*Pulvis ad tussim & thoracis
dolorem D. M.*

℞. Amygdalarum dulcium

Sacchari añ. 3. ij.

Seminis foeniculi 3. j.

Tere, da cum iulep violato & aqua
adianthi albi.

Pulvis pro epithemate cordis

D. Syl.

℞. Florum buglossi

Boraginis

Melissæ añ. M. β.

Santalorum omnium

Rosarum rubrarum añ. 3. iiij.

Doronici

Behen albi & rubri. .

Carabæ

Osis de corde cerui añ. 3. iiij.

Corticum citri

Seminis oxalidis

Ligni aloës

Caryophyllorum añ. 3. j. β.

Croci 3. β.

Margaritarum 3. β.

Moschi gra. iiij.

Camphoræ gra. vi.

Fragmentorum lapillorum omnium

pretiosorum 3.j.
Corallii vtriusque
Spodii añ. 3.β.
Trita per se misce.

Pulvis Cordialis

D. Syl.

℞. Corallii vtriusque
Sigilli Lemni veri añ. 3. j. β.
Rasuræ eboris
Cornu cerui añ. 3. ij.
Margaritarum 3. j.
Coriandri præparati
Spodii
Rosarum añ. 3. ij.
Seminis oxalidis
Fragmentorum lapidum pretio-
forum
Ossis à corde cerui añ. 3. β.
Sacchari 3. ij.
Folia auri & argenti añ. xxv.
Per se trita probè serua & vtere vt
artis est.

*Penidiæ ex D. Bul. in
Seruitore.*

Accipe de zuccharo albo & mundo librā vnam vel duas, vel ad plus tres, quia non possunt bene fieri in multa quantitate, & pone in vase æneo stan- nato, vel in vase terreo interius vitrea- to, cuius os sit latum: sed vas æneum est melius: & liquefac zuccharum cū tan- ta quantitate aquæ dulcis, qua coope- riatur: & si zuccharum est forte, pone cum eo pro qualibet libra eius ʒ. i. mel- lis, & distilla super ipsum de oleo amy- gdalarum dulcium si habes: & si non habes, mitte loco eius aliud oleum, & pone vas super ignem ex prunis sine fu- mo, & misce semper æqualiter, & co- que quousq; sit prope consumptionem aquæ: & experire proiecta gutta ex eo super marmore, & tange cum digitis: & quum inueneris quòd fiant fila inter digitos siue adhærentia, oportet quòd

citò auferatur ab igne, & proiiciatur
supra lapidem marmoris, extendendo
postquàm vnixisti cum oleo amygdala-
rum dulcium, vel sesamino, & colli-
ge partes eius vndique cum suo calore,
& in quantum possunt sustinere manus
operantis. Postea trahe, & extēde inter
manus, sicut trahuntur electuaria dul-
cia, & fige clauum curuum ad superio-
ra in pariete, & proiice super eum, &
trahe in clauo apponendo super eum,
& trahendo sicut trahuntur electuaria
dulcia, quousque dealbetur in fine suæ
albedinis, et appone iuxta ignem quā-
diu traxeris, vt calefiat, & fiat obediē-
tior extensioni, & iterum appone cla-
uū, trahendo vt albescat quantum vo-
lueris. Deinde incide cū forcipibus ad
voluntatem tuam. Et si volueris face-
re formas totundas, vel oblongas, vel
alias diuersas, accipe de amylo albo, et
tere, & pone super marmor, & extende
super ipsum de pasta illa Penidiorum,

& plica, & inuolue, & incide, & fac
 quascunq; formas volueris: tamen citò
 facias, ne infrigidet inter manus tuas.
 Deinde pone super cribrum, & pone
 iuxta prunas ad horam, & aufer, & di
 mitte donec infrigidetur, & reserua.

Pignolatum

Fit cum zuccharo dissoluto in aqua
 rosata, & diligēter clarificato: quumq;
 coctum fuerit ad perfectionē, infundat
 pineas mundatas, & dimittat infrigi
 dari ad formam confectionis solidæ.

Pilulæ Sine quibus esse nolo

D. N.

℞. Aloës optimi abluti 3. xiiij.

Quinque generum myrobalanorum

Rhabarbari

Mastiches

Absinthii

Rosarum

Violarum

Senæ

Agarici

Cuscutæ añ. 3. i.

Temperentur cum succo fœniculi, in quo sint scammoniæ bene tritæ 3. vi. β. & sit primò mista scammonia cum fœniculo, & postea succus sit expressus simul cum ipsa scammonia in tanta quantitate, quæ sufficiat ad confectio- nem prædictorum, & formetur pilulæ cum manibus inunctis cum oleo viola- ceo, vel cum oleo communi abluto.

Pilulæ Sine quibus esse nolo, Nico- lai, taliter dictæ propter summam effi- caciam, mirabiliter à cholera, phleg- mate, & melancholica purgant, & va- lent propriè ad cataractas & obscurita- tes oculorum, visum custodientes: au- rium dolorem sanant, & iliosis mira- biliter conferunt.

Pilulæ Aurææ.

Rx. Aloës

Diagridii añ. 3. v.

Rosarum

Seminis apii añ. 3. ij. β.

Anisi

Fœniculi añ. 3. j. β.

Mastiches añ. 3. j.

Croci

Interioris colocynthidis.

Formentur pilulæ cum aqua infusionis tragacanthæ.

Pilulæ aureæ Nicolai sic dictæ propter earum excellentiam, propriè purgant caput, lumen oculorum acuunt, vêtositatem stomachi & intestinorum expellunt, & sine molestia purgant.

Pilulæ Cochicæ

D. Rhas.

℞. Pulueris hieræ 3. x.

Colocynthidis 3. iij. & tertiam partem 3. vnus

Scammoniæ 3. ij.

Turbith

Stœchadis añ. 3. v.

Confice cum syrupo de stoechade,
& fiant pilulæ.

Pilulæ cochix Almanforis, id est,
capitales: cochos enim Græcè, idem
est quod caput Latinè. caput enim mi-
rabiliter mundificant, & maximè ab
humoribus grossis & frigidis: confe-
runt cephalææ & hemicranææ.

Pilulæ de octo rebus

D. N.

℞. Aloës

Diagridii añ. 3. ij.

Interioris colocynthidis

Epithymi

Agarici

Mastiches

Chebuli

Absinthii añ. 3. i.

Temperentur cum succo solatri.

Pilulæ de quinque generibus

myrobalanorum

¶. Quinqꝝ generũ myrobalanorum.

Agarici

Diagridii

*Colocynthis

**Romanus cucurbita*

Senæ añ. 3.ß.

syluatica.

Epithymi

Turbith

Anisi

Marathri

Mastiches

Lapidis Lazuli añ. 3.ij.ß.gr.v.

Aloës 3.i.

Confice cum succo absinthij.

Et licet in confectione earum non ponatur zingiber, credo tamen quòd hoc fuit omisſum ex errore scriptoris, & non de intentione authoris: & hoc dico propter turbith & agaricum, quæ ibi ingrediuntur, quibus ambobus zingiber mirabilem ſigillat proprietatem.

Pilulæ de quinque generibus myrobalanorum, valēt arthreticis, podagri.

cis, spleneticis, ad visum clarificandū,
& choleram purgant adustam.

Pilulæ Alefanginæ

D. M.

℞. Cinnamomi

* Cubebæ

* *Carpesium est apud*

Ligni aloës

Gal. & Paul.

Calami aromatici

Maceros

Nucis muscatæ

Cardamomi

Caryophyllorum

Asari

Mastiches

Schoenoanthos

Spicæ

Carpobalsami añ. ʒ. i.

Absinthii sicci

Rosarum añ. ʒ. v.

Terantur contritione grossa, & fun-
dantur super ea

Aquæ lb. xij.

Et coquantur vsque ad cōsumptionem
duarum partium. Deinde fricentur
manibus & colentur, & exprimatur
aquositas eius, tunc

℞. Aloës succotrini boni lb. i.

Et lauetur in scutella lapidea vitrea-
ta, cum aqua pluuiali lotionibus pluri-
bus: deinde exiccetur, & fundātur super
ipsum expressionis prædictæ circiter
libr. ij. terantur, & in sole siccentur, de-
inde misce cum aloës

Myrrhæ

Mastiches añ. 3. v.

Croci 3. ij.

Tere contritione bona: deinde præ-
dictæ expressionis residuum super ea
fundatur, & conterantur, donec fricen-
tur. Multi aloën lauant cum aqua in
qua rheon barbarum longo tempore
maduit.

Pilulæ alesanginæ Mesues, quæ di-
cuntur pilulæ de aromatibus, valent ad
dolorem stomachi propter phlegma

& sunt vehementis iuuamenti in mundificando stomacho, & cerebrum, & instrumēta sensuū ab humoribus grossis & putridis.

*Pilulæ aggregatiuæ ex in-
uentione D. M.*

℞. Myrobalanorum citrinorum
Rauedseni, id est, Rheubarb. añ. 3. iiij.
Succi eupatorii, i. succi agrimonix
Succi absinthii añ. 3. ij.
Diagridii 3. vi.
Chebulorum Indorum
Agarici
Colocynthis
Polypodii añ. 3. ij.
Turbith boni
Aloës añ. 3. vi.
Mastiches
Rosarum
Salisgemma
Epithymi
Anisi

Zingiberis añ. 3. β.

Electarii rosarum quantum sufficit ad aggregationem.

Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione Mesues, descriptione nostra, vt ipse inquit, coniungentes aggregationem expertorum iuuamentorum ad febres antiquas, & ad febres diuersitatis, & ad ægritudines capitis, stomachi, & hepatis, & educunt putrefactiones vtriusq; cholæræ & phlegmatum, & mundificant instrumenta sensuum.

Inter pilulas, quibus vtimur, hæc maximè excellunt.

Pilulæ de Rhabarbaro

D. M.

℞. Raueseni, id est, Rhabarb. 3. iij.

Succi liquiritiæ

Succi absinthii

Mastiches añ. 3. i.

Myrobalanorum citrinorum 3. iij. β.

Seminis apii.

Fœniculi añ. 3.β.

Trochiscorum diarrhodon 3. iij.β.

Hieræ picræ 3. x.

Confice cum aqua fœniculi.

Pilulæ de Rhubarbaro conferunt ad febres antiquas ex diuersis generatas humoribus, viscosis & putridis multarum putredinum, ad dolorem hepatis, & præcipuè hydropisis. Sunt qui his pilulis vtuntur in fine notharū tertianarum in Autumno, corroborando eas cum aliis vt opportunum videtur. & da 3. ij. mane, vel 3. i.β.

Pilulæ de Sarcocolla

D. M.

℞. Sarcocollæ 3. iij.

Turbith 3. iij.

Colocynthis añ. 3. i.β.

Zingiberis tantundem

Salisgemmæ 3. i.

Dissolue Sarcocollā in aqua rosarū & confice omnia cū ea, & fiant pilulæ.

Istæ pilulæ solutione educunt phlegma, & cōferunt ad ægritudines phlegmaticas. Pauci sunt qui his vtantur.

Pilulæ fœtidæ maiores

D. M.

℞. Sagapeni

Hammoniaci

Opopanacis

Bdellii mollis

Colocynthidis

*Harmel

*Harmel, rutha syluestris

Aloës

Epithymi añ. 3.v.

Hermodactylorum

Esulæ añ. 3.ij.

Scammonii 3.ij.

Cinnamomi

Spicæ

Croci

Castorei añ. 3.i.

Turbith 3.ij.

Zingiberis 3.i.ß.

Euphor

Euphorbii 3. vnius, partes duas.

Dissolue gummi in aqua, id est, in succo porri, & fiant pilulæ.

Pilulæ foetidæ maiores, quæ expellunt humores grossos, conferunt ad dolorem iuncturarum & podagræ, dorsi, & genuum, & dolorem ex humore crudo, & dolorem stomachi, & colicam, & albaras. Albaras, est species lepræ acutæ.

Pilulæ de Euphorbio

D. M.

℞. Euphorbii
Colocynthis

Agarici

Bdellii mollis

Sagapeni añ. 3. ij.

Aloës 3. v.

Fiant pilulæ cum aqua, id est, succo porri.

Pilulæ de Euphorbio, solutione educunt phlegma frigidum, & conferunt

ad mollificationem & paralyſim, &
educunt humores crudos qui deſcēdunt
ad neruos. Validæ ſunt in articulorum
affectibus à pituita factis.

Pilulæ Lucis maiores

D. M.

R. Rosarum

Violarum

Absinthij

Colocynthidis

Turbith

Cubebæ

Calami aromatici

Nucis moschatæ

Spicæ

Epithymi

Carpobalsami, id eſt, ſeminis balsami

Xylobalsami, id eſt, ligni balsami

Sileris montani

Seminis rutæ

Schœnoanthos

Mastiſches

Asari

Caryophyllorum

Cinnamomi

Anisi

Fœniculi

Apri

*Cassia. *De lignea est intelligendum.

Croci

Maceros añ. 3. ij.

Myrobalanorum citrinorum,

Chebulorum, Indorum,

Bellericorum, Emblicorum

Rauedsceni, id est, Rhaharb, añ. 3. iiij.

Agarici

Sennæ añ. 3. v.

Eufragiæ 3. vi.

Aloës succotrini ad pondus omnium.

Confice cum succo fœniculi.

Pilulæ lucis maiores, addunt in visu,
& corroborant eum, & abstergunt in-
strumenta sensuum, & expellunt super-
fluitates, & custodiunt sanitatem cor-
poris, & præsumitur super eis absque

necessitate abstinendi.

Pilulæ Lucis minores

D. M.

℞. Xylobalsami, id est, ligni balsami
Carpobalsami, id est, seminis balsami
añ. 3. i.

Chelidoniæ 3. v.

Rosarum

Violarum

Absinthij

Eufragiæ añ. 3. iij.

Sennæ

Epithymi

Myrobalanorum citrinorum, Chebulorum, Indorum, Bellericorum, Emblicorum.

Agarici

Colocynthidis

Schoënoanthos

Licij

Lapidis Lazuli añ. 3. ij. β.

Aloës boni ad pondus omnium.

Confice cum succo foeniculi, aut che-
lidonii.

Hæ pilulæ magis respiciunt atram-
bilem, quàm maiores.

Pilulæ de lapide Lazuli

D. M.

℞. Lapidis Lazuli abluti 3.vj.

Epithymi

Polypodij añ. 3.viij.

Scammoniæ

Ellebori nigri

Salis Indi añ. 3.ij.β.

Agarici 3.viij.

Caryophyllorum

Anisi añ. 3.iiij.

Hieræpicæ 3.xv.

Confice cum succo Endiuivæ.

Pilulæ de lapide Lazuli ad ægritu-
dines melancholicas, & cholæræ adu-
stæ, expertæ conferunt, à 3.i. ad 3.i.β.

Pilulæ de Bdellio maiores

℞. Bdelliꝝ 3. xij.

Ammis 3. ij.

Myrobalanorū chebulorū, Indorum,
Bellericorum, Emblicorum

* Veneriarum adustarum * alij conebae
id est, radicū acori. rum, alij aucta

Charabæ añ. 3. ij. β. lanarum.

Et confice Bdellium in succo porri.

Pilulæ de Bdellio maiores expertæ
ad fluxum Hæmorrhoidarum, & vlce-
rum in eis, & ad fluxum mēstruorum.

Pilulæ de Hermodaçtylis

maiores D. M.

℞. Hermodaçtylorum

Aloës

Myrobalanorum citrinorum

Turbith

* Colocynthidis

* Coloquintid. im
uocant.

Bdelliꝝ mollis

Sagapeni añ. 3. vj.

Castorei

Sarcocollæ

Euphorbiæ

Opopanacis

Harmel, id est, rutæ agrestis

Aprii añ. 3. iiij.

Croci 3. i. β.

Confice cum succo caulium, & fiant
pilulæ.

Pilulæ de Hermodactylis maiores,
expertæ ad dolorem iuncturarum, &
podagræ frigida.

Pilulæ Arthreticæ

D. N.

℞. Hermodactylorum

Turbith

Agarici añ. 3. iiij.

Cassia lignæ

Spicæ

Caryophyllorum

Xylobalsami, id est, ligni balsami

Carpobalsami, id est, seminis balsami

Zingiberis

Mastiches

Fœniculi

Anisi

Saxifragiæ

Seminis sparagi

Brusci

Rosarum

Granorum solis, id est milij solis

Salis gemmæ añ. 3.ß.

Aloës ad pondus omnium.

Confice cum succo fœniculi.

Pilulæ arthreticæ valent contra arthriticam & podagram.

Pilulæ Stomachicæ

D. M.

℞. Aloës 3.vi.

Mastiches

Rosarum añ. 3.ij.

Confice cum succo solatri.

Pilulæ stomachicæ, stomachum & caput mundificant.

Pilulæ ante cibum

D. N.

℞. Ligni aloës
Caryophyllorum
Folij
Mastiches
Xylobalсами, id est, ligni balsami
Carpobalsami, id est, seminis balsami
Cassia lignea
Maceros
Nucis moschatæ
Cinnamomi
Cubebæ
Croci
Sileris montani
Spicæ añ. 3. ij.
Rhabbarbari

Aloës succotrini añ. ad pōdus omniū.

Confice cum vino aromatico, &
fiant pilulæ.

Pilulæ ante cibum, ad digestionem
confortandā, & virtutem digestiuam.

Pilulæ de Agarico

℞. Agarici

Mastiches añ. 3. iij.

Radiciſ lilij cœleſtis

Praſij añ. 3. i.

Turbith 3. v.

Hieræ picræ 3. iij.

Colocynthidis

Sarcocollæ añ. 3. ij.

Myrrhæ 3. i.

Confice cum Rob.

Rob, eſt ſuccus primo defecatus, de-
hinc calore ſolis vel ignis craſſior in
tantum factus, vt adſeruari ſine corru-
ptione longo tempore poſſit.

Pilulæ de Agarico mundificant pe-
ctus ab humoribus groſſis & putri-
dis, & conferunt aſthmati & tuſſi an-
tiquæ. Hæ vbiq; conſectæ inueniun-
tur, & pectori ſunt admodum vtilis.
Auicē. eas deſcribit cap. de aſthmate;
ſed non apponit myrrham.

*Pilulæ de Fumoterræ*D. *Auicen.*

℞. Myrobalanorum citrinorum, chebulorum, nigrorum añ. 3.v.

Aloës 3.vñ.

Scammoniæ 3.v.

Sine cessatione confice cum succo Fumiterræ, & dimittantur donec exiccantur, & imbibantur vice alia, sic imbibēdo & exiccādo, vsq; ad tres vices, deinde dimittantur, donec spissum fiat totū, & ex hoc toto formentur pilulæ.

Soluunt humores acres, biliosos, pituitam falsam, & alios adustos, à quibus pruritus & scabies.

*Pilulæ communes*D. *Rhas.*

℞. Aloës 3.ñ.

Croci

Myrrhæ añ. 3.i.

Confice cum vino aromatico.

Istæ pilulæ sunt multum vsuales, & vbiq; præparatæ reperiuntur. Si tamen debeant accipi tempore æstatis, laudant doctores vt lauetur aloë cum aqua endiuia. Et etiam tempore Epidemiæ addatur de bolo armeno tantū, quantum est aloë. Hæc notat Christophorus Georg. super Mes. A quibusdam autem vocantur pilulæ Arabicæ. Vacuant à ventriculo, mesaræo, hepate, excremēta pituitosa, biliosa, putria, & absument partesq; dictas roborant ob id à peste seruant, quia corpus siccant, vacuant, à putredine vindicant.

Pilulæ de Assaiëret

D. Auicē.

℞. Hieræ picræ ʒ. j.

Mastiches

Myrobalanorum citrinorum añ. ʒ. β.

Aloës optimi ʒ. ij.

Fiant pilulæ cum succo de stœchade.

Pilulæ de assaiëret, quas notat Auicē

cen. tertij primo cap. de cura vniuersali
doloris capitis: & eas dosauit insignis
et clarus doctor Gētilis de Fuligineo,
& multum sunt vsuales, & sic vbique
præparatæ reperiuntur.

Pilulæ Bichix *secundum Syl.*

℞. Succiliquiritiæ
Sacchari boni añ. 3. x.

Amyli

Tragacanthæ

Amygdalarum dulcium depellatarum
añ. 3. vi.

Confice cum mucilagine seminis
cotoneorum.

Catapotia Becchica ad tussim sic-
cam cū caliditate & asperitate faucium
& gutturis dantur in ore tenenda.

Pilulæ Imperiales.

℞. Cinnamomi

Amomi

Anisi

Mastiches

Cardamomi

Zingiberis

Zedoariæ

Maceros

Nucis moschatae

Caryophyllorum

Croci

Cubebæ

Ligni aloës

Turbith

Tereniabin, id est, mannæ

Agarici

Foliculorum senæ

Spicæ nardi

Myrobalanorum Citrinorum, Chebulorum, Indorum, Bellericorum

Emblicorum añ. ʒ. j.

Rhabarbari ad pondus omnium.

Aloës ad pondus omnium.

Quando simpliciter ponitur Aloës,
de succotrino intelligitur.

Conficiantur cum syrupo Rosaceo,
vel Violaceo.

Pilulæ de thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ præparato-
rum 3.v.

Myrobalanorum citrearum 3.iiij.

Cepularum 3.iiij.

Misce cum Mannæ vel thamar Indi
aqua intybi soluto.

Pilulæ de thymelæa in hydropo
dantur.

Pilulæ de esula

D. M.

℞. Esulæ præparatæ 3.iiij.

Myrobalanorum citrearum 3.iiij.

Aloës 3.v.

Succi foeniculi *aut*

Intybi quantum sufficit.

Pilulæ de esula hydropi insigniter
conferunt.

Pilulæ Hieræ simpl.

℞. Specierum Hieræ simplicis ℥.i.

Conficiantur cum geleniabin, siue
conserua rosarum, quantum sufficit,
fiantq; pilulæ.

*Pomatum, Gallicè**Pommade.*

℞. Axungia hœdi recentis lb. i.

Temperentur in aqua Rosarum moschata per quatuor dies pomorū quinque à cortice mundatorum diuisorum in partes, lardetur cum Caryophyllis. Deinde omnia simul bulliant in dicta aqua rosarum in balneo Mariæ, teneanturq; supra ignem tandiu, donec omnia albescant, deinde laues id totum cum dicta aqua rosarum moschata, & totum fiet albū: ponatur in vasis vitreis. Quòd si velis vt magis redoleat, adde parum Algalia, aut moschi, aut amborum parum.

Hoc

Hoc vtuntur mulieres ad faciem leniendam in fissuris labiorū & narium. alios eius vsus à mulieribus discite. Dicitur pomatum à pomo ingrediente. Dispensare in officina mea sic soleo.

Rosata nouella

D. N.

℞: Rosarum

Zucchari

Liquiritiæ añ. ʒ. i. ʒ. i. ʒ. iij. β.

Cinnamomi ʒ. iij. ʒ. iij. gra. iij.

Caryophyllorum

Nardi, siue spicæ nardi

Zingiberis

Galangæ

Nucis moschatæ

Zedoariæ

Styracis calamitæ

Cardamomi

Apri añ. ʒ. i. gra. viij.

Fiat puluis.

Rosata nouella, rosata dicitur à ro-
sis: nouella, respectu veteris, quæ reci-
piebat tibar, id est, sulphur viuum: vo-
mitum & subuersionem stomachi au-
fert, debilitatem & sitim reprimi, de-
fectis ex longa infirmitate mirè subue-
nit, sudores diaforeticos compescit.

Syrupus de ace- tositate citri.

Rx. Succī acetositatis citri lb. xij.

Decoque in vase vitreato super pru-
nas cum facilitate vsque dum consuma-
tur tertia pars ipsius: deinde coletur, &
dimittatur donec clarificetur: & accipe
ex eo quod clarum est lb. vij. & funde
super ipsum ex Iuleb claro & depurato
lb. v. & coquatur donec inspissetur. Si
autem æstas fuerit, dimittatur in sole
donec eius aquositas consumatur.

Syrupus de acetositate citri, ad omnes ægritudines biliosas ex pura bile valet, & pestilentes, vel quæ veneni naturam sapiant, & ad sitim extinguendam: ebrietati resistit, vertiginē iuuat.

Antiqui de zuccharo nihil vnquam prodidere, & hunc syrupum nunquam fecere: tamen in omnibus ferè ægritudinibus præcitatis acido citri succo utebantur.

Syrupus de succo acetosæ.

℞. Succī acetosæ purificati ℔.iij.
Zucchari clarificati ℔.ij.

Et fiat Syrupus.

Syrupus de succo acetosæ Mesues, confert febribus cholericis, & inflammationi stomachi, & confortat cor calidum, & stomachum, & mirè conuenit febribus pestilentialibus.

Syrupus de Agrestia

Fit sicut syrupus de acetositate citri.
Et quidā condiunt cū Caryophyllis.

Fieri non potest nisi in æstate, quia hoc tempore solum & vinum omphacium, & vua omphacina habentur.

Syrupus de omphacio ventriculum roborat etiam prægnantium, ne aliarum partium excrementa facile recipiat: ob id cholerae morbo medetur, intemperiem calidam ventriculi, febres biliosas, sitim vehementem extinguit, venenis resistit.

Syrupus de Calamintha.

℞. Calaminthæ domesticæ
Calaminthæ agrestis añ. ʒ. ij.

Cheisin, id est, ligustici

Dauci

Schoenu anthos añ. ʒ. v.

Passularum enucleatarum lb. β.

Mellis lb. ij.

Fiat syrupus.

In hoc syrupo sex aquæ libræ recipiantur, quæ bulliant primo passulas: deinde alia secundum præscriptum ordinem ponendo, vsque ad consumptionem medietatis: denique addito melle fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de calamintha, lienosis plurimum confert, quibus durus est lien & penè irresolubilis, & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant, præsertim in senibus, & in habentibus antiquas tussis: si quis enim vel pectus, vel ventriculum, vel intestina crassa, tenaci, & irresolubili materia plena habeat, hoc syrupo sanatur.

Syrupus de Mentha

D. M.

℞. Succimenthæ lb. i.

Succi granatorum dulcium & acidorum ad dimidias cocti lb. ij.

Mellis *uel*

Sacchari lb. iiij.

Vel sic:

℞. Succī cotoneorum, mezorū, dul-
cium.

Succī granatorū dulcium, acetofo-
rū, mezorū añ. ℔. i. β.

Supra hos succos inijce,

Menthæ siccæ ℔. i. β.

Foliorū rosarū ℥. ij.

Et dimittatur per diem & noctem:
deinde coquatur cum facilitate vsque
ad medium, & cum mellis aut zuccha-
ri ℔. ij. fiat syrupus, & aromatizetur
cum gallia moschata.

• Syrupus de mentha, optimus est ad
ventriculū, cum frigiditate peccaue-
rit, & vomitus ac nauseas sanat: sin-
gultus remouet, atque fluxus ventris à
causa frigida. In calida etiā ventri-
culū roborat: nam ad hoc agendum
egregius est.

Syrupus de Absinthio

D. M.

℞. Absinthij Romani ℔. ij.

Rosarum rubearum ʒ.ij.
Spicæ, siue spicæ nardi ʒ.ij.
Vini antiqui boni & odoriferi
Succi coroneorum añ. lb. ij. β.

Dimittatur per diem & noctem in
vase lapideo, deinde coquatur cum fa-
cilitate vsque ad medium, & cum mel-
lis lb. ij. fiat syrupus.

Vel sic:

Rx. Absinthij Rom. ʒ. centum. coquan-
tur in aquæ lb. ij. vsque ad partem ter-
tiam, fricetur manibus, coletur, expres-
sum cum mellis & vini añ. lb. j. perco-
quitur in syrupum.

Syrupus de absinthio Mesue, est mul-
tis nominibus dignus, quippe ventri-
culum roborat, & prociduo appetitui
conuenit, ventriculo debiliore succur-
rit, & quādo intestina mollia sunt, ipsis
prodest: hepatis debilitatem remouet,
præsertim quando hæc à causa frigida
prouenerint: imò & in causis calidis
cōuenit, si nōnullis frigidis corrigatur.

Syrupus de Fumoterræ

D. M.

℞. Omniū myrobalanorum añ. ʒ. xx.
Florum boraginis
Buglossæ
Violarum
Absinthij
Cuscutæ añ. ʒ. i.
Liquiritiæ
Rosarum añ. ʒ. β.
Epithymi
Polypodij añ. ʒ. viij.
Prunorum num. C.
Passularum enucleatarum añ. lb. β.
Tamarindorum
Cassia fistulæ añ. ʒ. ij.

Hæc omnia bulliant in x. lb. aquæ,
vsquedum deueniat ad lb. viij. & cum
Succi fumiterræ cocti & depurati, &
Zuccha. añ. lb. iij. fiat Syrupus, deco-
quendo quousque eius formam acqui-
sierit.

In hoc syrupo præparando ordinem simplicium considerare oportet, ratione ebullitionis, quoniam aliqua maiorem, aliqua minorem decoctionem patiuntur: nec omnia simul vna vice sumenda sunt, vt hodie Seplasiarj nostri faciunt. Is igitur ordo obseruandus est: Primo polypodium ingredi debet: deinde pruna, passulæ, glycyrrhiza, absinthiũ: postea rosæ, cuscuta, flores boraginis: post hæc violæ, myrobalani: deinde epithymus: denique cassia & tamarindi, quæ secũdum aliquos ebullire non debent, quoniam vim raram & debilem naçta sunt. Mihi autem magis placet, quòd in fine iniçiantur, & vna vel altera ebullitione bulliant, vt cum alijs commodius vñantur, sicut Mesue in capite Decoctionis docet. Et si dixeris lenitiua bulliendo humiditatem amittere: Respondemus, amittere quidem humiditatem accidentalẽ, non amen naturalem, Si igitur hunc syru-

pum parare volueris, hūc ordinem serua qui subsequitur: Facta decoctione, zuccharum aqua fontis clarifica, quo decocto & clarificato, fumiterræ succum adde cum ad cocturam syrupi peruenierit. Prædicta autem decoctio pluribus vicibus paulatim addatur, quoad perfectam coctionem habuerit: & hoc modo decoctionis vis non resoluitur: denique tamarindi, & cassia iniiciantur, & decoctio in finem ducatur.

Syrupus de fumo terræ, obstructiones ventriculi & hepatis aperit, & hæc membra roborat, & cutis morbos sanat, à salsis & adustis humoribus dependentes, quales scabies, impetigo, serpigo, lepra, Morbus Gallicus ita nunc appellatus.

Syrupus fumarie minor

D. M.

Rx. Myrobalanorum flauarum ℥.ij.
Violarum

Cassuthæ

Absinthij añ. ʒ. i.

Aquæ lb. viij.

Succi fumarix cocti & purgati

Sacchari añ. lb. ij.

Aqua coque omnia vsque ad partem tertiam. Expressum cum succo fumarix & saccharo percoque. Quidam scammonij ʒ. β. panno lineo raro ligatam, in eo suspendunt.

Syrupus fumarix minor hepatis obstructionem aperit: ob id icterum sanat, pituitam salsam & bilem vltam vacuat: proinde pforam, lepram, pruritum, & alia cutis vitia inde orta, sanat, & corporis colorem floridum reddit.

Syrupus de Fumoterræ simplex.

℞. Succi fumiterræ bene depura. lb. iiij.
Zucchari clarificati lb. ij. β.

Fiat syrupus.

Hunc syrupū in officinis nostris hoc

modo dispensare solemus : quanquam descriptionem hanc non inuenies apud authores nostros dispensarios . Me sue describit syrupos de fumo terræ, sed cōpositos, quēadmodum Luminare maius, Nicolaus præpositus, & Lumen apothecariorum, horum scilicet compositorum meminerunt . Tu lector beneuole, pro iudicio medici docti vtere : vtraque enim descriptio non est contemnenda : plerique tamen compositi descriptionem approbant.

Syrupus de Liquiritia.

℞. *Liquiritiæ ʒ.ij. *Glycyrrhizæ an
Capillorum Ven. ʒ.i. uocant.
Hyssopi siccæ ʒ.β.

Super hæc proijce aquæ lb. quatuor,
& dimittatur per diem & noctem : id
est, viginti quatuor horas : deinde co-
quantur vsque ad mediam partē : post-
ea expressum super proijce,
Mellis

Zucchari

Penidiorum añ. \mathfrak{z} .viij.

Aquæ rosarum \mathfrak{z} .vi.

Fiat syrupus : id est, bulliant ad cocturam syrupi, & quando opus est administretur. In huius syrupi compositione, cum dicit siccam hyssopum, non li intelligere extremè siccam : sed quæ in superficie humiditatem amiserit.

Syrupus de liquiritia summè prodest in pleuritide, in antiqua tussi, ad mundificandum pectus & pulmonem.

Syrupus ex succo cucurbitæ

D. M.

Rx. Succum ex magna cucurbita massa inuoluta & in clibano cocta expressum, cum

Sacchari lb. iij. percoctum, & reconditum.

Syrupus ex succo cucurbitæ febres ardentes biliosasq; reliquas, gutturis asperitatem, pleuritidem emendat : vt.

testatus est domino Iacobo Syluio nobilis quidam Gallus Hierosolyma reuersus.

Syrupus portulacæ

D. M.

℞. Seminis portulacæ triti ℔.i.
 Succi intybi cocti & purgati ℔.iiij.
 Sacchari ℔.ij.
 Aceti ℔.i. *uel*
 Succu granatorum acidorum ℔.i.β.

Confice sic: Tritum semen in succo intybi macera vigintiquatuor horas, postea igne lento coque ad dimidias, demum cum saccharo percoque in syrupum.

Syrupus portulacæ valenter refrigerat: ob id sitim, febrium ardorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam corrigit.

Syrupus de quinque radicibus

D. M.

℞. Radicum apij

Fœniculi

Petroselini

Asparagi

Rusci añ. ʒ. ij.

Aquæ fontis lb. vi.

Sacchari lb. iij.

Aceti ʒ. viij.

Confice sic: Radices aqua concoque ad tertiæ partis consumptionem, & expressum saccharo percoque, & ad finē adde acetum. Alij addunt decocto

Seminum apij

Fœniculi

Petroselini añ. ʒ. i. & in lb. x. aquæ coquant ad dimidias. Expressum percoquant cū mellis potius, quàm sacchari lb. iij.

Syrupus de quinque radicibus ad icterum & febres putridas, biliosas & phlegmaticas solutu contumaces, proximus viribus syrupo Bizantino, & efficacior.

Syrupus acetatus diarhodon

D. M.

℞. Succī intybi

Succī apij añ. ℔. ij. β.

Radicis apij

Radicis fœniculi

Radicis intybi añ. ʒ. ij.

Rosarum ʒ. i.

Glycyrrhizæ ʒ. β.

Spicæ nardi ʒ. ij. β.

Apij

Fœniculi

Anisi añ. ʒ. v. ij.

Aquæ ℔. vi.

Aceti ℔. ij.

Sacchari ℔. i. ij.

Paratur sic: Omnibus in aquam coniectis ad duarum partium consumptionem coquitur, deinde cum aceto & saccharo fit syrupus.

Syrupus acetosus diarhodon ad febres complexas, & eas quæ formam corporis

corporis corrumpunt, obstructions hepatis, lienis idem aperit, datus ab ℥.i. ad iij.

*Syrupus acetatus de succis
herbarum D. M.*

℞. Succorum coctorum & purgato-
rum apij

Fœniculi

Intybi

Lupuli añ. lb. ij.

Succi buglosi lb. ij. β.

Rosarum ℥.i.

Spicæ nardi 3. iij.

Glycyrrhizæ ℥.i.

Seminum anisi

Fœniculi

Apij

Rhabarbari

Eupatorii

Absinthij

Cassuthæ añ. 3. v.

Sacchari lb. ij. β.

Aceti lb. ij.

Galliæ aromaticæ 3. ij.

Syrupus acetatus de succis herbarum cum aromatibus obstructions aperit: ob id febres putridas & implexas, & morbos alios obstructis succedentes curat.

Syrupus de thymo

D. M.

℞. Comarum thymi 3. ij.

Calaminthes

Menthæ siccæ añ. 3. v.

Seminis apij

Seminis foeniculi

Anisi

Dauci añ. 3. β.

Vuarum passarū purgatarum 3. iij. β.

Mellis lb. ij.

Galliæ 3. ij.

Syrupus de thymo calfacit, incidit, tenuat, ob id omnem frigidam intemperiem thoracis, pulmonis, ventriculi

hepatis & aliarum partium iuuat, &
hyberno frigori resistit.

Syrupus de bryonia

D. M.

℞. Succibryoniæ ʒ.v.
Aquæ decoctionis origani
Hyssopi sicci
Libystici
Seseleos
Cardamomi
Stœchados añ. ʒ.i.
Sapæ
Vuarum passarum añ. lb.β.
Mellis lb.ij.

Syrupus de bryonia idē valet quod
medicamentum. Dantur ʒ.ij.

Syrupus ex corticibus citri

D. M.

℞. Corticis citri recentis lb.i.
Aquæ fontis lb.v.
Sacchari lb.i.

Moschi gra. iij.

Conficet: Cortices in aqua ad duarum librarum consumptionem coquantur, cū saccharo percoquantur, demum moscho condiantur.

Syrupus ex corticibus citri cerebrū, cor, stomachum firmat, et oris gratiam commendat.

Syrupus acidus ex prunis

D. M.

℞. Succī seu aquæ prunorū acidorum
Succi vel aquæ granatorum acidorum
Succi vel aquæ tamar Indorū añ. ℔. i.
Succi acidi citrorum ℔. β.
Sacchari ℔. i.

Syrupus acidus ex prunis potenter refrigerat, ob id magnam sitim sedat, intemperiem calidam partium internarum cum febre, & sine febre extinguit, & ebrietatem, & vertiginem, & vomitum sistit: cordis tremorē & synopem sanat, datus cum aqua frigida,

vel aqua niuis.

Syrupus acidus de pomis

D. M.

℞. Succī malorum acidorum,

Succī granatorum acidorum,

Succī vuarum agrestium, añ. ℔. j.

Aquæ rosarum

Aquæ cui infusi sunt tamar Indi & pruna, añ. ℔. j. β.

Succī intybi cocti & despumati ℔. ij.

Sacchari ℔. viij.

Syrupus acidus de pomis ad tertianas exquisitas, & ardentes æstiuas, sitim, vētriculi & hepatis intemperiem calidam emendat, daturq; cum aqua frigida, vel melonum hyemalium.

Syrupus alius de pomis acidus, eadem promittens,

D. M.

℞. Succī pomorum acidorum ℔. j.

Succī acidī citri ℔. β.

Iulepi boni lb. ij.

Datur cum aqua niuis.

Si maceraueris sericum cocco baphi
co tinctum succis prædictis, valentius
corroborabit.

Syrupus Saporis de pomis

D. M.

℞. Succi pomorum redolentium li-
bras *iij. *alij quatuor.

Succi buglossi domestici & sylvestris,
añ. lb. ij.

Folliculorum sennæ ʒ. iij.

Croci ʒ. ij.

Sacchari albi lb. iij.

Fit autem sic: Senna contrita horis
vigintiquatuor succis maceratur: se-
mel deinde feruefiat aut bis, coletur:
expressum post cum saccharo perco-
quatur in syrupum. Crocus autem pan-
no lineo ligatus inter coquendum in-
fricetur.

Syrupus Saporis de pomis ad me-

ancholiam & maniam, cor etiam ex-
hilarat.

Syrupus acidus ex cydonijs

D. M.

℞. Succī clari cydoniorum acidorum
partes x.

Aceti, part. i. β.

Sacchari, partes ij.

Syrupus acidus ex cydonijs stoma-
chum roborat, & naturam calore disso-
lutā: ob id vomitū cohibet, sitim tollit.

Syrupus de Hyssopo.

℞. Hyssopi siccae

Radiciſ apij

Fœniculi

Liquiritiæ añ. 3. x.

Hordei mundati 3. β.

Seminis maluæ

Tragacanthæ

Seminis cotoneorum añ. 3. iij.

Capillorum Veneris 3. vi.

Iuiubarum

Sebesten añ. nuñ. xxx.

Passularum enucleatarum 3. xij.

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium añ. nuñ. x.

Penidiorum alborum lb. ij.

Fiat syrupus.

Compositio hæc multa aquæ quantitate non indiget: imò si experiaris, octo libras aquæ satis esse deprehēdes, & decoqui quousque tres libræ relinquantur: postea exprimantur, & cum penidijs ad formam syrupi iterum bulliant. Is igitur ordo seruandus est: Primo passulæ, zizipha, sebesten, ficus, dactyli, radices apij & fœniculi ingredientur: deinde hordeum, semen maluæ, semina cotoneorum: denique tragantha, hyssopus, & capilli Veneris.

Syrupus de hyssopo, ad morbos pectoris, ad tussim, ad pleuresim, ad dolores corporis, ad asthmata efficax est.

Syrupus de Prasio

D. M.

℞. Prasij viridis ℥.ij.

Hyssopi sicca

Capillorum Veneris añ. 3.vj.

Liquiritia ℥.j.

Calamintha

Anisi

Radicis apij

Radicis foeniculi añ. 3.v.

Seminis malua

Foenigraci

Iridis añ. 3.ij.

Seminis lini

Seminis cotoneorum añ. 3.ij.

Passularum enucleatarum ℥.v.

Ficus siccas pingues num. xv.

Penidiorum lb.ij.

Mellis boni lb.ij.

Fiat syrupus.

In hoc syrupo decem aqua librae summi debent, quae ad consumptionem medietatis bulliant, propter mel & penidia, quae ingrediuntur; nempe maiorem

decoctionis quātitatem exigunt, quā
 præcedens syrupus de hyssopo fecerit,
 quoniam in illo solū duæ penidiorum
 libræ erant: hic autem propter penidia
 duæ mellis libræ ingrediuntur.

Syrupus de Prasio, antiquæ tussi, &
 ægri tudinibus lōgioribus pectoris plu
 rimum succurrit, & materiam crassam
 & glutinosam habentibus, & antiquis
 viris asthma patientibus præsertim à
 pituitoso humore, crasso, putrido, &
 difficulter solubili.

Syrupus de Epithymo.

℞. Epithymi boni hortensis 3. xx.

Myrobalanorum citrinorum

Indorum añ. 3. xv.

Cuscutæ

Fumiterræ añ. 3. x.

Thymi

Buglossæ

Calaminthæ

Emblicorum

Bellericorum

Liquiritiæ

Polypodiij

Agarici

Stœchadis añ. 3.vi.

Rosarum

Seminis fœniculi

Anisi añ. 3.ij.ß.

Passularum enucleatarum 3.iiij.

Tamarindorum 3.ij.ß.

Zucchari lb.iiij.

Pruna num. xx.

Rob lb.ij.

Quando autem reperitur Rob absolute, ponitur sapa.

Fiat syrupus.

In hoc syrupo conficiendo, libræ decem aquæ sumendæ sunt, in qua fiat decoctio, adeo vt tres libræ remaneant. Ordo autem rerum quæ ingrediuntur hic sit, vt primo polypodium & agaricum ponantur: deinde pruna, passulæ, glycyrrhiza, fœniculi, anisi, stœchas, fu-

musterræ ingrediantur : postea rosæ, cuscuta, buglossa, inde myrobalani absque nucleis: denique epithymus. In vna autem decoctionis parte tamarindi dissoluantur, & zuccharum cum rob possum bulliat: & cum fuerit ad spissitudinem, mellis decoctio paulatim addatur, & in fine iniiciantur tamarindi in illa decoctionis parte dissoluti, & vna vel duabus ebullitionibus bulliant ad spissitudinem syrupi: nempe tamarindi parum bullire debent.

Syrupus de epithymo Mesues, magno præsidio est in scabie Gallica, in cancris, in area, in occultis vulneribusque cauernosa, sinuosa, et fistulosa sunt, in lepra: & in vniuersum in omni morbo ex atrabile adusta facto, & simplici atrabile, & bile adusta: qui si in copia sumeretur, egregie euacuaret. Dosis est ℥.iiij. vsque ad vi.

Syrupus de Eupatorio

D. M.

℞. Radicum apij

Fœniculi

Endiuix añ. 3.ij.

Liquiritix

Schœnoanthos

Cuscutæ

Absinthij

Rosarum añ. 3.vi.

Capillorum Veneris

Bedegaris, id est, spinæ albæ

Sucha, id est, spina Arabica : & est
in virtute spinæ albæ

Florum buglossæ, aut radicum eius

Anisorum

Fœniculorum

Eupatorij, id est, agrimonij vulgaris
añ. 3.v.

Raues, id est, Rhabarbari

Mastiches añ. 3.ij.

Spicæ nardi

Asari

Folij añ. 3.ij.

Coque in libras octo aquæ ad consumptionem tertiæ partis, & cum libris quatuor zucchari fiat syrupus, cum succi apij, & endiuix quantitate sufficienti.

Syrupus de Eupatorio, optimus est in longis febribus, præsertim cum vires concoctrices, & iecoris, & ventriculi corruptæ sunt, & ad hydropisim præparantur: valetq; ad cachexiam, & ad cacoëthe: si etiam in ventriculo & iecore flatus sit, eo dissoluitur: si hæc membra valde frigida sint & ferè debilitate confecta, hoc syrupo reficiuntur. Ad tensionem hypochondriorum valet, & ad dolorem eorum, & ad confirmatum iam ad hydropem. Dignus multis nominibus syrupus, si bene paratur.

Syrupus de Stœchade

D. M.

℞. Florum stœchadis 3, xxx.

Hascæ, id est, Thymi

Calaminthæ

Origani añ. 3. x.

Anisi

Pyrethri añ. 3. viij.

Piperis longi 3. iij.

Zingiberis 3. ij.

Passularum enucleatarum 3. iij.

Mellis *uel*

Zucchari lb. v.

Pulueres autem sequentes recipiat.

Cinnamomi

Calami aromatici

Spicæ nardi

Croci

Zingiberis

Piperis nigri

Piperis longi añ. 3. i. β.

Liga in panno raro, & suspende in syrupo.

Syrupus de stœchade D. Mesues expertus ad omnes ægri tudines neruorum frigidas, sicut est paralysis, epile-

psia, spasmus, tremor, & tortura: valet etiam ad catarrhum frigidum, à capite ad pectus, & ventriculum ipsum roborat. Datur ℥.i. cum aqua cui incocta sint spica & rosmarinus.

Syrupus violaceus

D. M.

℞. Aquæ infusionis violarum lb.v.
Zucchari clarificati lb.iiij.

Misce, & coquantur cum facilitate,
& reseruetur. *Vel sic:*

℞. Violarum ℥.ij.

Seminum cydonij

Maluxæ añ. ℥.i.

Zizipha

Myxa añ. num. xx.

Aquæ cucurbitæ lb.vj.

Sacchari lb.i.β.

Coque ad tertiam partem, & cum saccharo in syrupum percoque.

Syrupus violaceus Mesues, conueniens acutè febrientibus & habentibus
hepar

hepar calefactum, & cor, & cōfert asperitati cannae, & gutturis, & pleuresi, & tussi siccae.

Syrupus de Papauere simplex D. M.

℞. Papaueris albi & nigri, id est, eorum capita añ. 3. lx.

Et decoquantur in lb. iij. aquæ pluuiæ, vsque dum desit libra vna & semis: & cum zucchini albi, & penidiorum añ. 3. iij.

Syrupus de Papauere simplex Meus, ad somnum inducendum, ad sitim extinguendam, ad prohibendam destillationem ad pectus, & ad leniendum mirè prodest: & minus frigidus est, quàm compositus.

Syrupus de Papanere compositus D. M.

℞. Papaueris albi & * rubri añ. 3. l. * Nigri potius legendum.

Capillorum Veneris 3.xv.

Liquiritiæ 3.v.

Iuiubæ num̃. xxx.

Seminum lactucæ 3.xl.

Seminum malux

Seminum cotoneorum añ. 3.vi.

Coquantur in libras quatuor aquæ
ad consumptionem medietatis, & cum
zucchari & penidiorum añ. 3.viij. fiat
syrupus.

Syrupus de papauere compositus,
eandem vim habet, quam simplex: sed
ad infrigidandum & leniendum inten-
sius. Ideo à Mesue ad tussim siccam,
& phthisim valere dicitur.

Syrupus Myrteus.

℞. Myrtorum 3.xx.

Santalorum alborum & rubeorum

Sumach

Balaustiarum

Berberis añ. 3.xv.

Mespilorum 3.l.

Aquæ fontium lb. viij.

Bulliant omnia ad consumptionem
medietatis, postea coletur, & in cola-
tura adde

Vini granatorum

Succi cotoneorum añ. ʒ. vi.

Zucchari clarificati lb. iij.

Misce, & decoquas ad modũ syrupi.

Syrupus Myrteus simplex.

℞. Succi myrtorum lb. xij.

Decoque in vase vitreato lento igne
ad consumptionem tertiæ partis: dein-
de coletur, & dimittatur donec clarifi-
cetur, & accipe ex eo quod clarum est
lb. viij. & funde super illud zucchari cla-
rificati lb. v. & decoquatur, donec in-
spissetur ad formam syrupi: vel si æstas
fuerit, in sole ponatur donec eius aquo-
sa pars euanescat.

Syrupus Myrteus simplex, vëtricu-
lũ roborat & omnia intrinsecaviscera,
& ad antiquã tussim summè prodest.

Syrupus acetosus simplex

D. M.

℞. Zucchari boni albi part. v. & in vase lapideo pone, & superinfunde aquæ fontis dulcis & claræ lb. iij. & decoquatur, semper eius spumam abijciendo, & sit ignis in quo coquitur prunarum, aut tenuis flammæ sine fumo, & decoque hoc modo donec clarificetur & diminuta sit aqua sicut medietas eius: deinde infunde super ipsum, Aceti vini albi, partes duas, in leui: & in forti, partes quatuor: & in mediocri partes tres.

Et coque donec perficiatur decoctio.

Syrupus acetosus simplex Mesues, cuius iam magnificata est virtus, & excellentia in communitate, & posse ipsius in materias calidas & frigidas, & subtiles & grossas, & viscosas siue adhærentes.

Syrupus acetosus compositus,

sive Syrupus de radicibus

D. M.

℞. Aquæ fontis claræ lb. x.

Et proijce desuper ipsam,

Radiciſ fœniculi

Aprij

Endiuiæ añ. 3. iij.

Seminis anisi

Fœniculi

Aprij añ. 3. viij.

Seminis endiuiæ 3. β.

Coquantur cum facilitate, donec redeant ad lb. v. tunc proijce super ipsum,
Zucchari lb. iij.

Clarificetur sicut prius: & adde acetii boni quantitatem sufficientem iuxta modum doctrinæ præcedentis in syrupo acetoso simplici.

Syrupus acetosus cum radicibus, cuius operatio est ad choleram grossam, difficilem, et ad phlegma: incidit enim & absterget, aperit oppilationes quæ

sunt in hepate, & splene, & in renibus.

Syrupus endiuiae simplex.

℞. Succī endiuiae depurati lb. viij.
Zucchari clarificati lb. v. β.

Et fiat syrupus debito modo omnia decoquendo: & opus est zuccharum prius clarificare, & cum decoquitur, succum addere.

Syrupus de succo endiuiae valet principaliter ad omnes supercalefactiones hepatis & aliorum membrorum nutritiuorum: & in morbo laterali maximè conuenit.

*Syrupus endiuiae D. Gentilis
de Fulgineo, siue Syrupus
endiuiae compositus.*

℞. Succī endiuiae
Succī hepaticae añ. lb. iij.
Clarificentur prædicti succi ad ignem
vt expedit.
Rosarum

Violarum

Lenticulæ aquæ

Polytrichi añ. ʒ.β.

Capillorum Veneris

Hordei mundati

Seminum frigidorum maio. añ. ʒ.i.

Zucchari quod sufficit.

Fiat syrupus, & aromatizetur, cum

Santal^{is} alb^{is} & rubris

Berberis

Sēminis cotoneorum

Ligni aloës

Cinnamomi

Corticis citri añ. ʒ.i.

Syrupus de endiuiâ, cuius inuentor
fuit Gentilis de Fulgineo, est valens
præcipuè ad supercalefactiones hepa-
tis, cordis, & aliorum membrorum nu-
tritiuorum, & generaliter confert cui-
libet complexioni calidæ, & est ape-
ritiuus oppilationum, & confortati-
uus membrorum debilitatorum à mala
complexione calida, illam mirabiliter

renouando : est etiam digestiuus materiarum cholericarum acutarum.

Syrupus de Cichorea, secundum Nicolaum Florentinum.

℞. Endiuia domesticæ & syluestris
Cichoreæ
Taraxacum, id est, serum syluestrem
añ. M. ij.
Cucurbitæ
Hepaticæ
Scariolæ
Lactucæ
Fumiterræ
Lupinorum añ. M. i.
Hordei non excorticati
Alkekengi añ. ʒ. iiij.
Liquiritiæ
Capillorum Veneris
Ceterac, siue scolopendriæ
Polytrichi.

Adianthos

Cuscutæ, id est podagræ lini añ. 3. vi.

Radicum fœniculi

Aprij

Asparagi añ. 3. ij.

Ferueant in aqua sufficienti, & co-
lêtur, & cum zuccharo albo solido fiat
syrupus. Pro cuius vnaquaq; libra po-
nantur ad coquendum 3. iiij. rhabar-
bari electi, & 3. iiij. spicæ nardi ligati
in petia rara, quæ sæpe exprimatur do-
nec syrupus sit perfectè coctus. Dosis
3. ij. cum aqua euulsionis seminũ com-
munium frigidorum.

Syrupus de Cotoneis

D. M.

℞. Succu cotoneorum acetosorum de-
purati & clarificati, partes x.

Zucchari, partes ij.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de Cotoneis valet ad vom-
itum & solutionem naturæ, & ad sitim,

& stomachum confortat: quanquam hic syrupus apud Nicolaum & Mesuem non inueniatur esse in usu, solet tamen in officinis nostris passim sic dispensari.

Syrupus Nenufarinus.

Libras duas florum nenufaris vna decoctione decoque, postea exprime, & in expressione adde zucchari lb. ij. & decoque ad cocturam syrupi.

Syrupus de Berberis.

℞. Succī Berberis depurati lb. iiij.
Zucchari clarificati lb. iij.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus de granatis acetosis.

℞. Succī granati acetosi lb. ij. β.
Zucchari clarificati lb. iij.

Fiat syrupus vt suprà.

Syrupus de Granatis acetosis, valet contra febres cholicas. & phlegmaticas multæ inflammationis.

Syrupus de bizantijs

D. M.

℞. Succendiuiæ

Succi apij añ. lb. ij.

Lupulorum

Boraginis vel buglossæ, aut domesti-
cæ, aut sylvestris añ. lb. i.Bulliant bullitione vna, & despumen-
tur & depurentur, deinde

Accipe eius clarificati lb. iiij.

Zucchari tabarzeth, id est, finissimi
lb. ij. β.Et coquantur cum facilitate donec
fiat syrupus.Syrupus de bizantijs faciens ad fe-
bres oppilationum, & febres choleri-
cas & phlegmaticas, quarum diffici-
lis est eradicatio, & ad icteritiam.*Syrupus de infusione rosa-
rum viridium.*

℞. Aquæ infusionis Rosarum viri-

dium lb.v.

Zucchari lb.iiij.

Misce, & fiat syrupus coquendo debito modo.

Syrupus rosatus Mesues, ex infusione, conueniens ad extinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentie, & resistens venenositati.

Syrupus de rosis siccis.

℞. Infusionis rosarum siccarum
Zucchari añ. lb. ij.

Misce, & fiat syrupus secundum artem.

Syrupus Rosatus ex infusione rosarum siccarum magistralis, mirabiliter confortans & stypticans.

Syrupus de succo rosarum.

℞. Succu rosarum depuratarum lb. j. β.
Zucchari clarificati lb. j. β.

Fiat syrupus secundum artem, vt decet.

Syrupus de Iuiubis

D. M.

R̄. Iuiubarum num̄. lx.

Violarum

Seminis maluarum añ. 3.v.

Capillorum veneris 3.i.

Cotoneorum

Seminis papaueris albi

Seminis melonum

Seminis lactucæ

Tragacanthæ añ. 3.iiij.

Liquiritiæ

Hordei mundati añ. 3.i.

Decoquantur in libris quatuor aquæ fontium secundum artem, vel aquæ pluuialis vsque ad consumptionem medietatis. Deinde colentur, & in colatura addantur zucchari clarificati lb.iiij.

Et fiat syrupus debito modo decoquendo.

Syrupus de Iuiubis Mesues, confert

ad raucedinem vocis & tussim, & pleuresim, et in vlcere vesicæ mirè prodest.

Syrupus Capillorum Veneris simplex.

℞. Aquæ decoctionis Capillorum Veneris recent. ℔. iij.

Zucchari ℔. ij.

Fiat syrupus secundum artem.

Syrupus Capillorum Veneris compositus.

℞. Capillorum Veneris M. ij.

Adianthos

Ceterac, siue scolopendriæ

Polytrichi añ. M. j.

Iuiubarum

Liquiritiæ añ. ℥. ij.

Fiat decoctio, addendo

Zucchari ℔. iij.

Fiat syrupus secundum artem.

Is syrupus solet sic dispensari à peritis nostræ artis, quanquam sint multi

qui solum ponant
Capillorum Veneris lb. iij.
Iuiubarum lb. ij.
Liquiritiæ ʒ. ij.
Zucchari lb. vi.

In Monte Pessulano olim sic dispen-
sabamus. Descriptio hæc posterior mul-
torum iudicio est melior. Hoc postre-
mo vtimur ad incidendum, aperien-
dum, & mundificandum in affectibus
renum potissimum, & pectoris crassos
humores incidens & abstergens est.

Syrupus alius Capillorum
Veneris Ant. Musæ.

℞. Glycyrrhiæ mundæ ʒ. ij.
Capillorum Veneris ʒ. v.
Supra iniicias aquæ fontis lb. iij.

Et dimittas per diem & noctē, postea
coquantur ad consumptionem me-
dietatis, deinde percoletur, & huic de-
coctioni addantur,
Zucchari clarificati

Penidiorum

Aquæ capillorum Veneris añ. 3. viij.

Misce, & ad formam syrupi decoquantur, ad vsusq; seruetur.

Syrupus adiantinus ad thoracis affectus calidos, & viscerum obstructions facit.

Syrupus de Artemisia.

R. Artemisiæ M. ij.

Calaminthæ

Folij

Saturegiæ

Origani

Thymi

Tamarisci

Stœchadis añ. M. j.

* Camomillæ

* Chamæmelon, antbemis,

Meliloti

& crantbemon uocatur.

Sampsuchi

Anthos añ. 3. j.

Blattæ bizantiæ

Calami aromatici añ. 3. iij.

Spicæ

Spicæ Celticæ 3. i.

* Chamædryos * *Calam indrinam uo-*
cant, uel trisaginem.

Matricariæ miñ.

Betonicæ

Abrotani añ. M. β.

Acori

Prasij.

Foliorum rubæ maioris

Sileris montani añ. 3. i.

Asari

Schoënuanthos

Anisi añ. 3. vi.

Marathri

Ammis

Apij añ. 3. vi.

Bulliant in sufficiēti quantitate aquæ
 secundum artem : postea adde mellis
 quantum sufficit, & fiat syrupus.

Syrupus de artemisia valde efficax
 est in prouocatione mēstruorum.

Syrupus de Limonibus.

℞. Succilimonum lb. j. β.

Zucchari clarificati lb. iij.

Fiat syrupus.

Syrupus de limonibus valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

Syrupus de scolopendria.

℞. Scolopendriæ, siue ceterac

Linguae ceruinæ

Endiuiæ

Hepaticæ

Absinthij

Cicoreæ añ. M. β.

Cuscutæ, id est, podagræ lini 3. i.

Seminum communium maiorum

Florum boraginis

Buglossæ añ. M. i.

Capillorum Veneris

Radicum fœniculi

Petroselini

* Brusci añ. M. β.

* Ruscum uocant.

Et cum Zuccharo fiat syrupus secun

dum artem, & aromatizetur cum isto puluere,

℞. Folij, id est, malabathri

Spicæ, scilicet nardi

Laccæ

Cassia lignæ añ. 3. ij.

Ligentur in panno raro & bulliant in syrupo, & vsui reserua.

Syrupus de Scolopendria valet ad calefactionem hepatis, renum oppilationes à crassis humoribus aufert, lienemq; ab obstructione liberat.

Syrupus de Buglossa.

℞. Aquæ infusionis florum Buglossæ lb. iij.

Zucchari lb. ij.

Fiat syrupus.

Alius modus.

℞. Succij Buglossæ depurati lb. iiij.

Zucchari lb. iij.

Fiat syrupus.

Syrupus de Buglossa cor confortat,

lætitiāq; generat, in syncopi medici
hoc frequenter vtuntur.

Sapo moschatus.

℞. Saponis Venetiarum lb. iij.

Minutissimè incide gladio, deinde adde,

Pulueris caryophyllorum

Santali albi añ. ʒ. ij. puluerati sicut alcohol

Benioin ʒ. i.

Moschi gra. xx.

Distemperetur in aqua rosarum. aliqui addūt olei de spica, guttas aliquot. misceātur omnia simul, fiantq; poma.

Sapa ribes D. Syl.

℞. Succu ribes lb. x.

Igni lento ad tertiæ partis consumptionem coque, cola & subsidere permitte donec clarescat.

Clarum deinde igni clementi percoque, aut insola ad iustam crassitudinē, quā seruari possit.

Rob vel *σπαῖον* ribes refrigerat, adstringit: ob id ventriculum calidum, & cor roborat, amborumq; feruorem & inde natam sitim extinguit, biliosam vomitionem & deiectionem sedat, & alterat.

Sapa de berberis D. M.

℞. Baccarum oxyacanthæ lb. ij.
Omphacij lb. iij.

Triduo macera, manibus frica, exprime, omphacium id expressum percoque. Vel para vt succum de ribes: nam idem potest.

Theriaca magna

Gal. D. N.

℞. Trochiscorum scylliticorum 3. ij.
3. ij.

Piperis longi 3. ij. minus gra. v ij.

Trochisci theriaci

Trochisci diacoralliñ añ. 3. i. 3. i.

Xylobalsami 3. ij. gra. vij.

Opij

Agarici

Rosarum

Iridis

Scordiñ Cretenfis

Seminis rapæ syluestris

Cinnamomi

Opobalsami añ. 3. i. gra. xiiij.

Rhabarbari

Croci

Spicæ

Costi

Schoënoanthos

Zingiberis

Cassia lignæ

Styracis calamitæ

Myrrhæ

Terebinthinæ

Thuris masculi

Calaminthæ

Dictamni

Stœchadis

Polij

Radicis pentaphyllon

Petroselini

Piperis albi añ. ʒ. i. gra. vñ.

Folij, id est, malabathri

Gummi Arabici

Calcanti vsti, id est, vitrioli

Sagapeni

Terræ sigillatæ

Hypocystidis

Spicæ celticæ

Açori

Chamædryos

Gentianæ

Meu, id est, fœniculi erratici, cuius radix est tortuosa & odorifera.

Carpobalsami, id est, seminis balsami.

Apij

Amomi

Marathri

Carui sylvestris

Seselis Massiliensis

Nasturcij

Seminis anisi

Hyperici añ. ʒ. i.

Mumiæ


Castorei

Opopanacis

Aspalathi, id est, bituminis Iudaici

Galbani

Centaureæ minoris

Histolochiæ longæ

Uci syluatici añ. ʒ. i.

Uellis attici, & vini optimi bonum
stantis odorem, quantum ad succos
& lachrymas satis sit.

Theriaca magna Galeni, dicitur do-
mina medicinarum: quia tranquillita-
tem adfert, & facit ad grauissimas pas-
siones totius humani corporis, epilen-
ticis, catalecticis, apoplecticis, cephalar-
gicis, stomachicis, hemicranicis pro-
dest: ad rauedinem vocis & constri-
ctionem pectoris optima est, arteria-
cis, asthmaticis, hæmoptoicis, icteri-

cis, hydropicis, peripleumoniacis, ilio-
 sis, & vulnera in intestinis habentibus,
 nephreticis, calculosis subuenit: men-
 strua educit, & foetum mortuum expel-
 lit: lepras & variolas, & frigus, & cæ-
 teras passiones inueteratas emendat:
 præcipuè contra omnia venena & ser-
 pentum morsus & reptilium valet: sed
 diuersa est eius dosis pro quantitate &
 æqualitate vniuscuiusq; passionis, que
 in fine scribitur. Omnem defectionem
 sensuum releuat, cor, cerebrum, hepar,
 stomachum confortat, totum corpus in-
 corruptum ducit & custodit.

Theriaca dia tessaron

D. M.

R̄. Gentianæ

Baccarum lauri

Myrrhæ

Aristolochiæ rotundæ añ. part. æquales

Mellis despumati, quadruplum ad spe-
 cies.

Confice sic: Species omnes curiosè
terantur & melle excipiantur.

Theriaca antidotus dia tessaron ad
affectus frigidos, tum cerebri, vt epile-
psiam, paralyfin, spasimum cynicum:
tum ventriculi, vt inflationem, & ab
ea dolorem, tardam coctionem: tum
denique hepatis, vt hydropem, cache-
xiam, obstructionem: præterea morsui
scorpionis, & potioni veneni confert.

Tryphera Sarracenica magna
secundum M.

℞. Myrobalanorum
Cepularum Indarum
Emblicarum bellericarum
Emblicarum citrearum añ. ʒ. v.
Cinnamomi
Trium piperum
Eryngij
Folij
Spicæ nardi
Cardamomi vtriusque

Cassia

Lepidi

Cyper

Ap

Lingua avis

Caryophyllorum

Behen vtriusque

Zingiberis añ. 3. ij.

Nucis moschata

Macis

Sesami excorticati añ. 3. ij.

Amygdalarum ambarum añ. 3. v.

Ligni aloës

Mastiches

Rhabarbari

Seminis foeniculi añ. 3. ij.

Ozimi

Menthæ sicca

Origani Persici añ. 3. i. β.

Mellis quantum sufficit.

Butyri quantum sufficit.

Olei amygdalini quantum sufficit.

Myrobalani fricentur cum butyro

recenti : cæteræ species cum oleo amygdalino. melle excipiuntur omnia.

Tryphera Sarracena magna coctionem ventriculi & hepatis suo calore iuvat, ob id flatus dissipat, humores in vêticulo & alijs visceribus putres absumit: oris & corporis reliqui odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur & morborum generationem prohibet, venæm auget, hæmorrhoidas sanat. Datur à 3.i.ß. ad 3.iñ.

Tryphera antidotus moschata

D. M.

℞. Myrobalanorum
Cepularum nigrarum
Emblicarum bellericarum
Piperis nigri & longi
Zingiberis
Cassia
Spicæ nardi añ. 3.v.
Seminis anethi

Seminis porri añ. 3. ij.

Seminis dauci

Rosarum rubrarum

Cinnamomi

Nucis moschatae

Caryophyllorum añ. 3. i. ss.

Macis

Cardamomi maioris

Galangae

Ligni aloës

Moschi añ. 3. i.

Seminis nasturcij 3. x.

Mellis spumati ad excipiendum.

Scoriæ ferri nutritæ 3. ij. adduntur interdum.

Eadem promittit quæ prior, sed imbecillius. Data à 3. ij. ad 3. iiij.

Tryphera Persica

D. M.

℞, Succorum solani

Intybi

Apij

Lupuli, purgatorum añ. lb. ij.

Violarum recentium aut siccarum lb. j.

Folliculorum sennæ ʒ. ij.

Agarici ʒ. j.

Pruna Damascena, quinquaginta

Cassuthæ ʒ. β.

Myrobalanorum cepularum, citrearum, Indarum, frixarum in oleo violato, aut amygdalarū dulciū añ. ʒ. ij.

Spicæ nardi ʒ. iij.

Epithymi ʒ. xl.

Tamar Indorum recentium ʒ. iij.

Mannæ ʒ. j. β.

Pulpæ cassiæ ʒ. iij.

Sacchari violati ʒ. xij.

Aceti lb. j.

Sacchari albissimi lb. iij.

Rhabarbari boni ʒ. ij.

Myrobalanorum citrearum ʒ. j. β.

Cepularum & Indarum añ. ʒ. j.

Bellericarū & emblicarum añ. ʒ. iij.

Seminis fumarix

Trochiscorum diarhodon

Macis

Mastiches

Cubebæ

Spodij

Santalæ citrei

Seminum quatuor añ. 3. ij. β.

Anisi 3. iij.

Spicæ nardi 3. ij.

Sic paratur: Violæ, folliculi sennæ, agaricum, pruna Damasc. cassutha, myrobalani, spica cum succis igni prunorum lento coque, donec libra vnica supersit: cui inijce epithymum. Myrobalani in oleo cocti colentur. In parte coacti dissolue tamar Indum, mannam, cassiam, saccharum violatum: cola vt munda sit. In parte reliqua & aceto coque saccharum: cui adde quod prius in succis est dissolutum: misce, percoque ad mellis crassitudinē. Postremo paulatim adde rhabarbarum, myrobalanos, fumariam, &c.

Tryphera Persica contra febres acu-

tas, intemperiem calidam ventriculi, hepatis: Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, in Aestate pestilenti & Autumno: sitim sedat, icterum calidum ex obstructione sanat, hypochysim à vaporibus biliosis visui incommodantem discutit.

Tryphera magna

D. N.

.d. 3. i.
ut. y

Rx. Opj 3. ij.

Cinnamomi

Caryophyllorum

Galangæ

Spicæ

Zedoariæ

Zingiberis

Costi

Styracis calamitæ

Calami aromatici

Cyperi

*Iridis

Peucedani

* Cœlestē lilium, flammam,
& glaiutum vocant.

Acori

Acori

Mandragoræ

Spicæ celticæ

Rosarum

Piperis

Anisi

Apij

Fœniculi

Petroselini Macedonici

Dauci

Hyoscyami

Cymini

Ocimis id est, basiliconis añ. 3. i.

Mellis quod sufficit.

Tryphera magna sine opio, & cum opio, taliter dicta est, quia magnam vtilitatem & fructum mulieribus confert: datur contra dolorem stomachi virorum & mulierum cum aqua in qua cocta sint semina fœniculi, anisi, mastiches: datur contra vitium matricis ex frigidityte, si distemperata bibatur cum vino in quo cocta sit arthemisia bene

trita: et cum oleo muscelino commixta
 si fiat pessarium ex bombice istis inun-
 ctum & in vuluam mulieris immitta-
 tur, prouocat menstrua mulieri non con-
 cipienti: si detur cum vino in quo cocta
 sit mandragora, vel sambucus, miro
 modo prodest pueris qui non possunt
 dormire, & in nocte nimis garriunt.
 Distemperata cum lacte mulieris in
 modum ciceris, & hibita prodest.

Triasandali

D. N.

℞. Santali albi

Santali rubri

Santali citrini

Rosarum

Zucchari añ. solidos ij.

Dicit autor Pandect. quòd falsò, sed
 debuit dicere zaccaræ, id est psyllij: &
 in rei veritate, psyllium magis videtur
 conferre proposito. & ita habet litera
 Galen. in lib. dinamidarum, cap. viij.

de passionibus pectoris.

Rhabarbari

Spodij

Succi Liquiritiæ.

Seminis portulacæ añ. ſoſ. j. β.

Amyli

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Seminis melonum

Citrulli

Cucumeris

Cucurbitæ

Seminis ſcariolæ añ. ſoſ. j.

Camphoræ ʒ. j.

Alij roſarum pondus quadruplicant.

Syrupi roſarum quod ſufficit.

Si ſolidum quæris, tres drachmas di-
midiabis.

Triſandali Nicolai, dicti à tribus
generibus ſantalorum quæ deſcriptio-
nem ingrediuntur: datur propriè con-
tra calorem hepatis & ſtomachi, phthi-
ſicis & Ictericis,

*Trochisci diarhodôn, siue
de rosis D. M.*

℞. Rosarum 3.iiij.

Ligni aloës 3.ij.

Mastiches 3.i.β.

Absinthij Romani

Cinnamomi

Spicæ

Cassia lignæ

Schoënoanthus añ. 3.i.

Fac Trochiscos cum vino antiquo,
& aqua decoctionis radicum commu-
nium, vt Apij, Petroselini, &c.

Trochisci diarhodon Mesues, quo-
rum iuuamētum est magnum ad febres
antiquas, & febres permixtionum, &
febres phlegmaticas, & febres, in qui-
bus corrumpitur forma.

*Trochisci diaui. siue de
Violis.*

℞. Florum violarum albarum viri-

dium 3.v.

Amyli 3.ij.

Seminis papaueris albi 3.ij. 3.i.

Rhabarbari 3.v.

Seminis plantaginis 3.i.

Balsami 3.i.

Aquæ rosatæ quod sufficit.

Confice ad modum trochiscorum prædictorum.

Non præparatur nisi quando ingreditur compositiones magnas.

Trochisci scyllini

D. N.

Scyllam integram cape, & in massa farinæ fermentatæ in furno decoque, & abstrahere de massa, & eiectis corticibus eius, medium in mortario tere, & eiusdem ponderis farinam Orobi subtilissimè tritam adde, & cum vino aut melle tempera. Si deest Orobus, tantumdem panis alsii subtilissimè triti pone, & exinde trochiscos informa, & in vin

bra siccentur. Alij ponunt scyllæ partem vnam, farinæ hordei partes duas.

Trochisci Theriaci

D. N.

℞. Viperam iuuenem longitudinis vnius palmæ, oculos rubeos habentem, linguam mobilem, & cornua in modum grani frumenti, caput & caudam tribus digitis, abscinde, & medium quod remanet euiscera & excoria, & optimè in aqua dulci laua, & sic coque donec spinæ à carnibus separètur. Postea spinis proiectis, carnem in mortario marmoreo satis tere, et commixta eiusdem ponderis farina orobi vel panis assi, cum suo iure tempera, & fac inde trochiscos ponderis sol. vnius, & in vmbra deficca.

Non præparantur nisi quando ingrediuntur compositiones magnas, interdum tamen vtimur eis in lepra.

Trochisci diacoralliôn

D. N.

℞. Corallij rubri
Cinnamomi
Myrrhæ
Amomi
Papaueris añ. 3. iiij.
Schœnoanthos
Crocī añ. 3. ij.
Calami aromatici
Xylobalsami
Cassia lignæ
Folij
Mastiches
Polij
Phu, id est, valerianæ
Asari
Pedis columbini añ. 3. i.

His omnibus pulueratis, fac trochiscos cum vino.

Trochisci diacorallion, id est, è corallijs, sanguinolenta excreantibus, dysen

tericis, coeliacis, cibum fastidientibus,
mirè subueniunt.

Trochisci de camphora

D. M.

℞. Foliorum rosarum 3.iiij.

Spodij 3.ij.

Santalorum citrinorum 3.ij.β.

Croci 3.i.

Liquiritiæ 3.ij.

Seminis citrulli

Melonis

Cucumeris

Cucurbitæ

Tragacanthæ

Gummi

Spicæ nardi añ. 3.i.

Ligni aloës

Cardamomi

Amyli

Camphoræ añ. 3.vnius partes ij.

Zucch. tabarzeth, id est finissimi

Tereniabin, siue mannæ añ. 3.ij.

Confice cum mucilagine psyllij & aqua rosarum.

Trochisci de camphora Mesues, valentes ad febres multæ inflammationis, & sitim vehementem, & incensionem cholerae rubrae, ebullitionem sanguinis, & supercalefactionem stomachi & hepatis, & icturitiam, & conferunt ethicis & phthisicis.

Trochisci de alkekengi

D. M.

R. Granorum alkekengi 3. iij.

Seminis citrulli, &

* Albateche

* Cucumeris uideli-

Cucurbitæ añ. 3. iij. β.

cet magni, qui anguria dicitur.

Boli armenici

Gummi Arabici

Thuris

Sanguinis draconis

Papaueris albi

Amygdalarum amararum

Succi liquiritiæ

Tragacanthæ

Amyli

Granorum pini añ. 3. vi.

Seminis apij

Charabæ

Boli

Hyoscyami

Opij añ. 3. ij.

Fiant trochisci cum mucilagine quæ
exiuit ex granis alkekengi.

Trochisci alkekengi mirabiliter con
ferentes ad vlcera in renibus, & vesica,
& ad dolorem quando mingitur.

Trochisci de myrrha

D. Rhas.

R. Myrrhæ 3. ij.

Lupinorum 3. v.

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegij

Cymini

Rubæ tinctorum

Assæ foetidæ

Sagapeni

Opopanacis añ. 3. ij.

Fiant trochisci ponderantes drachmas duas : ex quibus detur vnus in die cum aqua in qua semen iuniperi coctum fuerit.

Trochisci de myrrha D. Rhasis, est medicamen adeò vehemens in prouocandis menstruis, vt etiam foetum excutiat, si qua eò sæpe vtatur. Ventosæ quoque sub curuatura poplitis sunt ponendæ, & phlebotomia ex saphena facienda est. Postremo quoque ventosæ femori sunt superponendæ.

Trochisci ad fluxum

D. M.

℞. Balaustiorum

Corticum glandium aceto macerato-
rum & tostorum

Rhois

Baccarum myrti

Hypocystidos añ. 3. ij.

Cymini Carmani

Gallarum aceto maceratarum & tostorum

Capitum granatorum

Fructus tamaricis

Macis

Xylaloës

Galliæ aromaticæ

Mastiche

Spicæ añ. 3. i.

Seminis oxalidis

Gummi

Boli Armeni

Seminis vuæ

Passerum tostorum añ. 3. i. β.

Seminis coriandri aceto macerati & tosti 3. ij.

Vino pontico finge trochiscos pōderis 3. i. quorum vnus datur cum syrupo cydoniorū, vel aliquo succo stiptico.

Trochiscialij ad eundem af-

*fectum cum exulceratione
intestinatorum D. M.*

℞. Spodij 3. vii.

Seminis rosarum

Rosarum

Acaciæ

Balauſtij

Sanguinis draconis añ. 3. ii. β.

Seminis oxalidis 3. i. β.

Oxyacanthæ

Carnis Rhu

Seminis plantaginis

Portulacæ affati ana 3. i. & sextam
drachmæ.

Gummi affati 3. i.

Fiant trochisci 3. β.

Dantur cū decocto hordei excorticati.

*Trochisci galliæ Sebelli-
næ ex Mes.*

℞. Foliorum rosarum recentium, hu-
midarū, se aperire incipientium 3. i. β.

Aloës bonæ

Caryophyllorum

Gummi

Spicæ Indæ añ. 3. i. β.

Santali citrini 3. ij.

Ramich 3. iij.

Aquæ rosatæ infusionis gummi Arabici quantum sufficit.

Moschi ʒ. ij.

Ambra

Caphuræ añ. aur. β.

Rosas tere curiosissimè in mortario lapideo : tunc ipsis aloën, caryophyll. gummi, spicam, santalum, ramich, minutissimè omnia trita cōmisce, & contere diem vnum cum rosis aliquoties affundendo aquam rosatam. Postremo aromatiza reliquis.

Trochisci galliæ Sebellinæ ventriculū, cor, hepar, imbecilla roborant: in alias cōpositiones magnas immittunt.

Trochisci galliæ aromaticæ

D. M.

℞. Emblicarum exossatarum ʒ.iiij.
Aquæ rosatæ, cui prius rosæ siccæ &
cortices citrorum sint immersi infu-
si q̃, lb.β. & ʒ.iiij.

Ligni aloës ʒ.viij.

Ramich ʒ.i.β.

Rosarum

Caryophyllorum añ. ʒ.x.

Spicæ Indæ ʒ.iiij.

Santali flauī aromatici ʒ.iiij.

Gummi Arabici ʒ.vj.

Caphuræ

Moschi añ. ʒ.i.

Ambra ʒ.ij.

Emblicas parum tritas triduo in va-
se vitreo, probe operculato macerentur
lb. dimidia aquæ rosatæ: deinde reli-
quam aquam rosatam præterea immit-
te, & postridie tantundem, donec em-
blic. virtus aquis sit impressa. Tunc re-
liqua trita tenuissimè, & cum prædi-
cta infusione emblic. paulatim adiecta

misce & finge trochiscos, figilla & aromatiza caphura moscho & ambris, & serua vitreo vase.

Trochisci galliæ aromaticæ veteribus celebratissimi ad cerebrum, cor, ventriculum, cæterasq; partes nutritorias roborandas, nervosq; imbecilles illitu firmat: celebribus denique compositionibus miscetur.

Trochisci galliæ magnæ

D. M.

℞. Succī dactylorum immaturorum
℔. i.

Gallarum recentium curiosè tritarum
℥. iij.

Rosarum rubrarum ℥. i.

Cardamomi

Seminis fraxini

Caryophyllorum

Nucis moschatae

Mastiches

Ligni aloës añ. 3. vñ.

Cinna

Cinnamomi 3.ij.

Santali flauī 3.v.

Croci 3.β.

Gummi Arabici 3.i.

Moschi aur.β.

Aquæ rosatæ quantum sufficit.

Succus semel feruefiat, in colatura coque ad mellis crassitiem gallas; deinde cætera trita, cribrataq; misce prædictis, & desuper marmor oleo amygdalino vinctum extende donec ficcen-
tur, terantur tunc tenuissimè, moscho cum aqua rosatâ aromatizentur trochisci siccati in vmbra.

Trochisci galliæ magnæ, seu regalis ventriculum, cor, hepar, cæterasq; partes nutritorias roborat: appetetiam excitat, coctionem iuuat.

Trochisci diarbodon

D. M.

℞. Foliorum rosarum rubrarū aur.vj.
Spicæ aromaticæ

D

Ligni aloës añ. aur. ij.

Glycyrrhizæ aur. iij.

Spodij aur. i.

Croci aur. β.

Mastiches 3. ij.

Vino albo fiunt trochisci 3. i. pondere.

Trochisci diarhodon efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs implexas, formam corrumpentes, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adhærentes detergendos.

Trochisci de rosis

D. M.

℞. Foliorum rosarum 3. x.

Glycyrrhizæ 3. v.

Spicæ aromaticæ 3. ij. β.

Vino albo excipe

Scammonio efficies purgatorios.

Trochisci de rosis ventriculum & hepar firmant, humoresq; ab illo detergent: ob id phlegmaticæ feбри conducunt.

Trochisci de gallia moschata

D. M.

℞. Xylaloës, id est, ligni aloë ʒ.v.

Ambræ ʒ.ij.

Moschi ʒ.i.

Glutinis tragacanthæ cum aqua rosarum extracti, quod sufficit ad commiscendum ea, & fiant trochisci. Figura folij myrtei, sigillentur, vase vitreo reponantur. Alij ambram in vase vitreo dissoluunt oleo balanino paucis, ac eo cætera comprehendunt.

Trochisci de gallia Mesues, stomachum, cor, & hepar confortant, & ingrediuntur in medicinis magnis.

Trochisci de rhabarbaro

D. M.

℞. Raues, id est, rhabarbari ʒ.x.

Succi eupatoriij ʒ.iiij.

Rosarum ʒ.ij.

Spicæ

Anisi

Rubeæ tinctorum

Seminis apij

Absinthij

Afari añ. 3. i.

Amygdalarum amararum 3. iiij.

Fiant trochisci aurei vnus.

Trochisci de rhabarbaro conferētes ad dolorem hepatis, & oppilationem ipsius, & apostemata eius, & antiquas ægritudines in ipso, hydropisim, et corruptionem formæ & icteritiam.

Horum potus in his qui malī habitus sunt, magnæ vtilitatis est. His vtī affueuerunt medici in febribus ex decidentia acutis, et incipiēte malo habitu.

o Trochisci de spodio

D. M.

℞. Rosarum rub. 3. xij.

Spodij 3. x.

Seminis acetosæ 3. vi.

Seminis portulacæ

Granorum coriandri infusorum in aceto & torrefactorum

Corticis sumach añ. 3. ij. β.

Amyli aysi

Balaustiarum

Berberis añ. 3. ij.

Gummi Arabici aysi 3. i. β.

Confice cum succo agrestæ.

Trochisci de spodio cum semine acetosæ Mesues, conferunt ad febres cholericas cum quibus est solutio ventris, & sedant inflammationem stomachi, & hepatis, & sitim continuam.

Trochisci de absinthio

D. M.

℞. Rosarum

Absinthij

Anisi añ. 3. ij.

Raued, id est, rhabarbari

Succi eupatorii, siue agrimonix

Afari

Apij

Amygdalarum amararum

Spicæ nardi

Mastiches

Foliū añ. 3. i.

Fac trochiscos cum succo Endiuia.

Trochisci de absinthio Mesues, conferunt febribus antiquis, & aperiunt oppilationes hepatis & stomachi, & confortant stomachum, & conferunt dolori membrorum nutritionis, & confortant appetitum, & in longis febribus vtiliter bibuntur.

Trochisci de eupatorio

D. M.

℞. Tereniabin, siue mannæ

Succi eupatoriī añ. 3. i.

Rosarum 3. β.

Spicæ nardi 3. iij.

Raued, id est, rhabarbari

Asari

Anisi añ. 3. ij.

Spodiī 3. iij. β.

Fac trochiscos cum succo eupatoriij.

Trochisci de eupatorio Mesues, cōferunt ad febres antiquas, & rigorem earum, oppilationem hepatis & splenis aperiunt, & sunt medicina bona apostematum in ipsis & icteritiæ, & principio hydropicis conferunt.

Trochisci de terra sigil-
lata D. M.

℞. Sanguinis draconis
Gummi Arabici assi
Ramich, id est galliæ
Foliorum rosarum
Seminis rosarum
Amyli assi
Spodij
Acaciæ
Hypocysthidos
Lapidis hæmatitæ
Balauſtj
Boli armeni

Fumariæ

Terræ sigillatæ

Sedenegrid est, seminis canapis

Coralli

Charabæ añ. 3. ij.

Margaritarum

Tragacanthæ

Papaueris nigri añ. 3. i. β.

Seminis portulacæ ass.

Cornu cerui adusti

Thuris masculi

Gallarum

Croci añ. 3. ij.

Fiant trochisci cū aqua arnoglossæ.

Isti trochisci sunt in vsu. Terra sigillata secundum Diosc. & Auic. est terra rubea: sed hodie quidam vtuntur vna alia quæ est albi coloris, sed non est tantæ virtutis. Serap. in cap. de terra sigillata, ait, quòd est sigillum marinum: quidam sigillum laicè vocant.

Trochisci de terra sigillata ex inuentione Mesues, qui sunt in vsu vltimi

uamēti ad sputum & ad egressionem
anguinis, & propriè sumpti cum aqua
nagoglossæ, & liniati super frontem se-
dant fluxum sanguinis ex naribus: &
liniati super matricem, sedant fluxum
menstruorum, & quandoq; iniiciuntur
in matricem & in vesicam, & liniuntur
super partes pectoris, & omne membrum
manans sanguinem.

Trochisci de charabæ

D. M.

. Charabæ aur. vi.

cornu cerui vsti

summi Arabici assi

coralli adusti

ragacanthæ

caciæ

ypocystidis

alaustix

astiches

accæ ablutæ

apaueris nigri assi añ. aur. ij.

D s

Thuris

Croci

Opij añ. aur. i. β.

Fiant trochisci cū mucilagine psyllij.

Confectio trochiscorum de charabe
abscindit sanguinem de omni loco ma-
nationis eius.

Trochisci de rosis & eupatorio

D. M.

℞. Foliorum rosarum 3. viij.

Spicæ

Rhabarbari

Glycyrrhizæ añ. 3. iij.

Spodij 3. i. β.

Succi eupatorii 3. x.

Cum manna fac trochiscos.

Trochisci de rosis & eupatorio ob-
structionem hepatis probè leuant, &
inde nascētes, icterum, febres antiquas,
& alijs complexas.

Trochisci Ramich

D. M.

Oxalidis ℥.xvi.
Rosarum ℥.i.
Baccarum myrti ℥.ij.
Gallarū recētium curiosè tritarū ℥.iij.
Foliorum rosarum ℥.i.
Santalī flauī ℥.i.β.
Gummi Arabici ℥.i.β.
Carnium rhois
Podij añ. ʒ.viij.
Omphacij ʒ.vij.
Ucci baccarum myrti multum trita-
rum ℥.iiij.
Signi aloës
Saryophyllorum
Lacis
Ucis moschatæ añ. ʒ.iiij.
Saphuræ aur. i.
quæ rosatæ quantum sufficit ad con-
ficiendos trochiscos.
Oxalis, rosæ, baccæ, myrti semel fer-
fiant, cola, mixtis gallis iterum co-
que; deinde super ea pulueriza reliqua

omnia mixta, misce & extende in scutella lapidea vsque dum siccentur: post tere minutim & cum caphura & aqua rosarum fac trochiscos paruos, sicca in vmbra. Alij moschi 3. i. aromatizant.

Trochisci Ramich ventriculũ, cor, hepar, imbecilla firmant, & lubrica viscera & intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniam obtundũt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent: ob quam naribus sanguine fluentibus flando impelluntur, alijs medicamentis miscentur.

Trochisci spodij D. M.

Rx. Spodij 3. iij.

Rosarum rubrarum 3. vij.

Seminis portulacæ

Succi liquiritiæ añ. 3. ij.

Muccagine seminis psyllij fac trochiscos 3. i.

Mali granati cum succo vtere.

Trochisci spodij efficacissimi in fe-

ores acutas vetriculi, & hepatis inflam
mationem, & sitim vehementem.

Trochisci oxyacanthæ

D. M.

2. Baccarum oxyacanthæ, aut succi
earum

uccii glycyrrhizæ

eminiis portulacæ

podij añ. 3. iij.

osarum 3. vi.

picæ

croci

myli

ragacanthi añ. 3. i.

eminiis citrulli 3. iij. β.

aphuræ 3. β.

Cum manna fac trochiscos.

Trochisci oxyacanthæ febres arden
extinguunt, ac sitim vehementem.

Trochisci oxyacanthæ alij

D. M.

Baccarum oxyacanthæ 3. iij.

Spodij

Mastiches

Xylaloës

Galliæ

Spicæ

Seminis oxalidis añ. 3. i.

Rosarum 3. v.

Gummi 3. iij.

Aqua rosarum fac trochiscos.

Trochisci hi oxyacanthæ ad intemperiem calidam, fluorem alui, hepatis dolorem dantur.

Trochisci anisi D. M.

℞. Anisi

Eupatoriij añ. 3. ij.

Seminis anethi

Spicæ

Mastiches

Folij

Absinthij

Asari

Apij

Amygdalarum amararum añ. 3.β.

Aloës 3.ij.

Succo absinthij ☉

Apij compone, ☉ cum

Syrupo acetofo ☉

Succo herbarum da.

Trochisci anisi obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas vires antiquas sanant.

Trochisci anisi alij ex decem simplicibus D. M.

. Anisi

Succi eupatoriij añ. 3.iiij.

Astiches

oicæ

pij

absinthij Romani

sari

olij añ. 3.i.

Amygdalarum amararum 3.i.β.

Aloës bonæ 3.ij.

Decocto absinthij confice.

Hi trochisci hepatis vitia, & inde natas febres antiquas, & quartanas, & formam corrumpentes sanare sunt à veteribus probati.

Trochisci cancami D. M.

℞. Cancami mundati

Succi glycyrrhizæ

Abſinthij

Oxyacanthæ

Succi eupatorii

Rhabarbari

Aristolochiæ longæ

Costi

Aſari

Amygdalarum amararum

Rubiæ

Aniſi

Apij

Schoenu anthus añ. 3. i.

Trochisci cācami ad obſtructiōes hepatis & lienis, & inde natas febres varias, antiquas & aſcitē; vrinas mouent.

Troch

*Trochisci colocynthidos, id
est, albandal* D. M.

2. Pulpæ colocynthidos albæ & le-
uis, & seminibus purgatæ 3.x.

Olei rosati 3.i.

Muccagine ex tragacanthi

Gummi

3dellij añ. 3.vi.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Pulpam forfice incide, cum oleo fri-
s, & cū muccaginibus fac trochiscos:
qua rosarum dies quatuor maceratos,
cca in vmbra: tere iterum curiosè, &
um eadem muccagine forma rursus
ochiscos, & vtere. Nam in hieram
ermetis, & compositiones alias inñ-
untur loco colocynthidos.

Trochisci santalorum

D. M.

Trium santalorum añ. 3.viñ.
odñ

Seminum cucumeris

Cucurbitæ

Citrulli

Portulacæ

Boli Armeni añ. 3.iiñ.

Rosarum 3.vi.

Aqua portulacæ fac trochiscos.

Trochisci santalorum ad febrem ardentem ventriculi, & hepatis intemperiem calidam, & sitim dantur lacte acido, aut omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.

*Trochisci triasantalorum alij
eiusdem facultatis*

D. M.

℞. Santalorum flauorum 3.ñ.

Gummi Arabici

Seminis citruli excorticati añ. 3.i.

Seminum lactucæ

Portulacæ

Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ añ. 3.β.

Fac trochiscos, vtere vt prius.

Trochisci Hamech

secundum M.

R. Foliorum violarum humidi & sicci mediorum aur. xij.

Turbith albi & gummofi aur. vj.

Succi glycyrrhizæ aur. iij.

Mannæ 3. iij.

Trochisci Hamech sedant inflammationem, ventrem leniunt, thoracem purgant. Dantur aur. ij. cum saccharo, aut pulpæ cassiæ fistulæ.

Trochisci cyperi

D. M.

R. Zingiberis

Cardamomi

Nucis moschatae

Cubebæ

Macis

Caryophyllorum

Galliæ

Gummi Arabici añ, aur. j.

Corticum citri

Mastiches

Florum schoenu anthus

Cyperì

Spicæ

Cinnamomi

Emblicarum

Extremitatum myrti añ, aur. ij.

Moschi nonnihil

Melle vuato fac trochiscos.

Trochisci cyperi corruptionem malamq; coctionem ventriculi, & induratum oris foetorem salubriter & certò emendant post purgationem & vomitionem vsi cum vino odoro.

Trochisci ligni aloës

D. M.

℞. Ligni aloës

Rosarum rubrarum añ. 3. ij.

Mastiches

Cinnamomi

Caryophyllorum

Galliæ

Spicæ

Macis

Nucis moschatæ

Cubebarum

Cardamomi maioris & minoris

Corticum citri

Pastinacæ añ. ʒ. i. β.

Moschi

Ambræ añ. sextam partem ʒ. i.

Melle vuato fac trochiscos.

Trochisci xylaloës ventriculũ, cor,
epar, imbecilla roborant: ob id valent
d oris fœtorem, pulsum cordis & syn-
open, hydropem dati cum vino odo-
& aromatico.

Trochisci de bryonia

D. M.

Farinæ puræ tritici

arinæ hordei

arinæ ciceris albi

Farinæ fabarum

Farinæ amygdalarum dulcium

Tragacanthi añ. 3. ij.

Radicis bryoniæ siccæ 3. i. β.

Albumine oui fac trochiscos, line cum decocto hordei, & post duas horas ablue decocto furfuris.

Trochisci de bryonia faciem claram reddunt, foeditatem cutis tergunt, colorem bonum ac roseum seu rubro permistum faciunt.

Trochisci capparum

D. M.

℞. Corticum radicis capparis

Seminis agrij añ. 3. vi.

Melanthij

Calaminthes

Acori

Amygdalarum amararum

Nasturcij

Hammoniaci

Foliorum rutæ

Aristolochiæ rotundæ

Succi eupatoriꝝ añ. 3. ij.

Cyperī

Scolopendriꝝ añ. 3. i.

Aceto hammoniaco dissoluto comprehendatur horum omnium pulvis.

Trochisci capparum ad splenis duritiem & flatus eius dissipando datur aureus vnus cum vino, cui incocta sit radix capparis, cortex tamaricis aut extremitates ramorum eius, & cortex salicum.

Trochisci halicacabi

D. M.

℞. Baccarum halicacabi 3. ij.

Seminis citruli

Melonis Indi

Cucurbitæ añ. 3. ij. β.

Boli armeni

Gummi Arabici

Thuris

Sanguinis draconis

Papaueris albi

Amygdalarum amararum

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Amyli

Nucleorum pinorum añ. 3.vj.

Seminis apij

Succi

Hyoscyami

Opj añ. 3.ij.

Trochisci *διὰ φουσαλίδων* ad renum
& vesicæ vlcera, & natam inde dysu-
riam. Da 3.j. cum Iulep aut cum hy-
dromelite.

*Tela, quam vulgò Gualterij
vocant, approbata & à
multis experta.*

Rx. Olei communis lb.j.

Cerusæ 3.iiij.

Lithargyrj 3.ij.

Myrrhæ 3.β.

Reponatur tela intus ad modum vt
fit tela cerata.

Valet ad deficcanda vlcera antiqua.

Vnguentum apo stolorum D. Auicen. in quinto cano.

℞. Terebinthinæ

Ceræ albæ

Resinæ añ. 3. xiiij.

Opopanacis

Floris æris añ. 3. ij.

Hammoniæ 3. xiiij.

Aristolochiæ longæ

Thuris masculi añ. 3. vi.

Myrrhæ

Galbanĩ añ. 3. iiij.

Bdellij 3. vi.

Lithargyrj 3. ix.

Infundatur Bdelliũ, hammoniacum

& galbanum in aceto bono, & ibi dissoluatur, & decoquantur omnia in æstate cum duabus libris olei, & in hyeme cum tribus.

Vnguentum Apostolorum Auic.v. canone, tractatu vndecimo, quod in usu est, rectificans cum facilitate fistulas difficiles, & scrophulas paruas, nec est aliquid simile ei, & mundificat vulnera ex carne mortua & pus, & consolidat, & dicitur quod est medicina duodecim Apostolorum.

Vnguentum rosatum

D. M.

℞. Axungia porcina recentis quantitatem quam volueris, & lauetur in aqua calida nouies, & tantundem cum aqua frigida lotionem vltima, deinde terantur cum ea rosarum rubearum recentium quantum ipsa est, & dimittantur marcescere per dies septem, deinde decoquantur cum facilitate & colentur; &

iterum tantundem rosarum terantur & dimittantur per alios septem dies marcescere, & fundatur super

Succi rosarum circiter part. β.

Olei amygdalarum partes vi.

Et iterum coquantur cum facilitate usque ad succi consumptionem: & quando disrumpitur in aqua rosarum parum opi, & projicitur in decoctione, est mirabile.

Vnguentum rosatum sedatuum inflammationum, & erysipilæ, & ignis perfici, & confert sodæ calidæ, & inflammationi stomachi & hepatis.

Vnguentum basilicum magnum D. M.

℞. Cerae albæ

Resinæ pini

Sepiæ vaccini

Picis naualis

Glutinis alumbath, id est, glutinis piscium

Olibani

Myrrhæ añ. ʒ.vj.

Picis ʒ.ij.

Et aliorum omnium añ. ʒ.i.β.

Vnguentum basilicum magnū confert vulnerib. in quibus est calefactio, & propriè in vulneribus neruosis: mundificat enim & incarnate ea.

M A N A R D V S.

Quomodo valet vulneribus in quibus est calefactio, cū sit calidum? Puto deesse negationem, & legēdum, non est calefactio: & sic etiam scripsit Aui-cenna. Basilicon Pauli recipit, Ceram Colophoniam, picem, adipem taurinum, æqualia.

Vnguentum basilicum minus

D. M.

℞. Resinæ

Picis

Ceræ

Olei quod sufficit.

Vnguentum aureum

D. M.

℞. Cerae citrinae ℥.vi.

Olei boni lb.ij.β.

Terebinthinæ ℥.ij.

Resinæ

Colophonix añ. ℥.j.β.

Olibani

Mastiches añ. ℥.j.

Croci ℥.j.

Et fiat vnguentum.

Vnguentum aureum, curat & consolida-
lidat plagas, sanum & expertum.

Vnguentum populeum

D. N.

℞. Oculorum populi lb. j. β.

Papaueris nigri

Foliorum Mandragoræ

Cimarum rubi tenerrimarum

Foliorum hyoscyami

Solatri

Vermicularis

Lactuæ

Semperuiuæ

Bardanæ

Violæ

Scatumcoeli, id est, vmbilicus veñ.
añ. 3. iij.

Axungia porci recen. sine sale lb. ij.

Omnes herbæ pistentur & bulliant
cum axungia, & fiat vnguentum secun-
dum artem.

Vnguentum populeum Nicol. tali-
ter dictum, quia fit de oculis populi, &
valet contra calorem febris acutæ, &
his qui dormire nequeunt, inunctis
temporibus, & pulsibus, & plantis
manuum & pedum.

Vnguentum Martiatum

D. N.

℞. Ceræ albæ lb. ij.

Olei lb. viij.

Rorismarini

Foliorum lauri añ. ʒ. viij.

Rutæ ʒ. viij.

Tamarisci ʒ. viij.

Esbrij

Sauinæ

Balsamitæ, id est, menthæ aquaticæ

Lilifagi, id est, saluiæ

Ocimi, id est, basiliconis

Polij, siue montani

Calaminthæ

Arthemisiæ

Enulæ

Betonicæ

Brançæ vrsinæ

Spargulæ, scilicet minoris

Herbæ venti, id est, parietariæ

Bipinnellæ

Agrimonix

Abfinthij

Herbæ paralyfis, id est, primula ueris

Herbæ sanctæ Mariæ

Cimarum sambuci

Herbæ crassulæ, id est, fabæ grossæ

Millefolij

Semperuiuæ

Chamædryos

Centaureæ

Foliorum fragulæ

Quinquefolij

Herbæ tetrahit, id est, herbæ Iudaicæ
añ. 3. iij.

Radicis euisci, id est, radicis althææ

Cymini

Myrti añ. 3. iij.

Fœnigræci 3. i. β.

Butyri recentis 3. i. 3. ij.

Vrticæ

Violæ

Papaueris rubri

Mentæ Saracenicæ, & alterius mentæ

Lapaceoli

Polytrichi

Cardum cœli, id est, cardi benedicti

Matrissyluæ, id est, caprifolij

Maturellæ, id est, Valerianæ

Herbæ

Herbæ muscatae

Alleluya, id est, trifolij acetosi

Linguae ceruinæ, id est, hemionitidis

Crispulae, id est, oculi bouis: secundum

Compositorem, est herba cancri,

Camphoræ

Styracis

Medullæ ceruinæ añ. ʒ.β.

Adipis vrsini

Adipis gallinarum

Mastiches añ. ʒ. i.

Thuris ʒ. β.

Olei nardini ʒ. ij.

Colligantur omnes herbæ in mense
Maio, & in vno die aut in duobus, si
potest, ab hora tertia vsque ad meri-
diem, & postea tere omnes herbas si-
mul, & infunde septem diebus in vino
odorifero, octauo die coquantur leno
igne, & quum vinum aliquantulum in-
cipit consumere, addatur supradictum
oleum, & bulliant donec herbæ incipi-
ant diminui, deinde studiose cola, &

proiectis herbis iterum super ignem ponantur : & quum bullire coeperint, ponatur Styrax : & quum modicum bullierint, ponatur butyrum & axungia aliquantulum contusa, & oleum nardinum, & mastix, & olibanum, & postea cera : & quum cera liquefacta fuerit, semper cum spatula agitando ab igne deponatur, & cum coagulatum fuerit, reponatur.

Vnguentum Martiatum magnum, à Martiano peritissimo medico dicitur, à quo fuit inuentum, quod facit ad dolorem & frigiditatem capitis, pectoris & stomachi, & ad schlirosim splenis & hepatis, & ad ilij dolorem ad solem vel ad ignem inunctum statim subuenit, paralyticis, sciaticis, nephreticis, podagricis prodest, tumores reprimat, durities remollit, spasmaticis & tepidè febricitantibus valet, & contra omnes dolores ex frigidityte.

Vnguentum aragon

D. N.

℞. Rorismarini

Maioranæ

Radicis iarri

Serpilli

Rutæ

Radicis sicydis, id est, cucumeris an-
guini añ. ʒ. iij. β.

Foliorum lauri

Saluiæ

Savinæ añ. ʒ. iij.

Policariæ maioris

Policariæ minoris

Laureolæ añ. ʒ. ix.

Bryoniæ ʒ. iij.

Nepetæ

Foliorum sicydis, id est, folij cucume-
ris anguini añ. lb. β.

Mastiches

Olibani añ. ʒ. vj.

Pyrethri

Euphorbij

Zingiberis

Piperis añ. $\mathfrak{z} . i .$

Olei muscelini $\mathfrak{z} . \beta .$

Petrolei $\mathfrak{z} . i .$

Adipis vrsini

Olei laurini añ. $\mathfrak{z} . i i j .$

Butyri $\mathfrak{z} . i i j .$

Olei communis lb. v.

Ceræ lb. i. $\mathfrak{z} . i i j .$

Herbæ & radices colligantur vt in Martiato, in mense tamen Iuni, & fortiter contusæ in mortario ponantur in oleo per septem dies, octauo verò desuper ignem ponantur, & coquantur, donec herbæ detrudantur in fundum, postea per saccum colentur, & iterum super ignem ponantur, & quum incœperint bullire, addatur oleum laurinū, butyrum, adeps vrsinus & cera, quæ liquefacta ponatur petroleum & muscelinum, postea mastix & olibanum, & ad vltimum zingiber, piper, pice-

trum & euphorbium, & ab igne depouatur, & vsui reſerua.

Vnguentum aragon, id eſt, adiutorium, valet ad dolorem ex frigidityte viri & mulieris tali modo inunctum: in teſta oui munda primum calefac ad ignem, deinde ſuperinungatur, & poſtea teſta calida ſuperponatur loco patienti: valet ad ſpaſmum & tetanum, & ad dolorem iliorum & renum tali ordine vt ſuprà diximus: arthreticis, et ſciaticis multum prodeſt: quartanarijs, ſi ſpina inungatur ante horam acceſſionis.

Vnguentum de althæa

D. N.

℞. Radicis euifci, id eſt, althææ lb. ij.
Seminis lini
Fœnigræci añ. lb. j.
Scyllæ lb. β.
Olei lb. iij.
Ceræ lb. j.

Terebinthinæ

Gummi hederæ

Galbani añ. ʒ. ij.

Colophonix

Resinæ añ. lb. β.

Radices bene abluantur, & terantur, simul fœnumgræcum, semen lini, & scylla, & quum benè trita fuerint, postea totum in septem libris aquæ per tres dies ponatur, quarto die verò super ignem bulliat, donec incipiat inspissari, deinde paulatim ponatur in sacco: & quum exprimere volueris, addatur aliquantulum aquæ feruentissimæ ad extractionem illiusviscosi succi. Tunc accipe de illo succo lb. ij. & cum oleo simul bulliat vsque ad succi consumptionem. Postea addatur cera, & quum liquefacta fuerit, adde terebinthinam, galbanum, & gummi hederæ, ad vltimum ponatur puluis resinæ & colophonix: & quum coctum fuerit, ab igne deponatur; & quum infrigidatum

tuerit, & conglutinatum diligenter colligatur, & vsui referuetur.

Vnguentum de Althæa valens propriè ad dolorem pectoris ex frigidityte & pleuresi, & super pectus inunctum sanat omnia loca infrigidata, calefacit, mollificat, & humectat.

Vnguentum Agrippæ

D. N.

℞. Bryoniæ lb. ij.

Radicis sicydis, id est, cucumeris anguini lb. i.

Scyllæ ℥. vi.

Iridis ℥. iij.

Radicis filicis ℥. ij.

Radicis ebuli

Tribuli marini añ. ℥. ij.

Radices ter vel quater abluantur, & terantur in pila marmorea. Et in libr. iij. olei lentiscini vel cōmunis ponantur per duos dies: sed si per sex vel per septem dimittatur, plus valet, quia ca-

lorem & odorē sibi & efficaciam vendicat: tertio verò die super ignem ponantur, & tandiu bulliant, donec incipiant radices dimitti, postea ponantur in sacco, & exprimendo colentur, & quum colata fuerint, iterū super ignem mittātur. Et quum bullire incœperint, ponantur ℥.xv. ceræ albissimæ, & liquefacta cera ab igne deponatur, & cum infrigidatum fuerit, collige in vase & reserua vsui.

Vnguentum Agrippæ Nicolai, in magno antidotario, quo Agrippa rex Iudæorum vtebatur, valet hydropisi, & omnibus tumoribus in quacunque parte corporis fuerint, & ad neruos indignatos: vrinam prouocat: & inunctum super ventrem, laxat: & dolorum renum ex frigiditate optime facit.

Vnguentum pompholygos.

℞. Olei rosati ℥.x.

Ceræ albæ ℥.v.

Succi granorum solatri ℥.viij.

Cerux lotæ ℥.iiij.

Plumbi vsti

Tuthiæ añ. ℥.ij.

Thuris ℥.i.

Puluerentur quæ sunt pulueranda sicut alchool, idest, subtilissimè, post fac coqui succum solatri cum oleo rosato vsque ad consumptionem succi, tunc adde ceram cum puluere, & fac inde vnguentum, & incorporetur in mortario.

Vnguentum palmeum

D. M.

℞. Olei veteris

Lithargyri añ. lb. iij.

Axungia veteris purgata à membranis & sale lb. ij.

Chalciteos ℥.iiij.

Ramos recentes palmæ num. iij.

Liquatis igne axungia & oleo in vase stannato asperge lithargyrum &

F 5

chalcitim, mouendo continenter palmæ ramis: & coque ad iustam crassitiam, iniecto ipsi inter coquendum vino ramorum minutim conciso.

Vel sic:

℞. Lithargyri auri lb. iij.

Adipis porci purgatæ sale & membranis ℥. v.

Chalciteos viridis ℥. iij.

Ramis palmæ uel

Radice cannæ moueantur.

Vnguentum palmeum ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, vsta, rupta, contusa, & inde nata echynomata conficitur.

Vnguentum diaphœnicon

D. M.

℞. Adipis ceruini antiquæ mundæ & colatæ

Adipis vitulini antiquæ mundæ & colatæ añ. lb. j. β.

Chalciteos ℥. iij.

Olei antiqui

Lithargyri puri añ. lb. iij.

Sagmentorū ramorū recētium pal-
mæ, quantum sufficit.

Chalcitis & lithargyros læuissimè
trita & creta cribro tenuissimo, pòst
oleo paulatim affuso simul terantur:
addito deinde adipe igni lento coquan-
tur semper mouendo palmæ ramis re-
centibus & excorticatis, quorum ex-
tremum vbi siccius euaserit, nouos sub-
stitue: iniectis etiam tum ipsi vnguen-
to segmentis.

Vnguentum διὰ χαλκίτιος vlcera cru-
enta, fistulosa, pituitæ salis, maligna &
dysepulotica glutinat: herpetas, tumo-
res pestilentes, & qui ex humoribus va-
rijs constant, sanat.

Vnguentum mirabile

D. M.

℞. Myrrhæ

Aloës

Sarcocollæ añ. ʒ. i.

Mellis despumati ʒ. vi.

Vini albi boni quantum sufficit.

Coque igne lento ad spissitudinem.

Vnguentum mirabile relatum ad Nicodemum, vlcera putrida & fistulas purgat, carne implet, glutinat, cicatrice tegit, putredinem arcet. Et si vlceri caro supercreuerit, adde vnguenti chalciteos ʒ. β.

Vnguentum aliud eiusdem.

℞. Myrrhæ

Aloës añ. ʒ. ix.

Vini albi quantum sufficit.

His tritis tenuissimè vinum paulatim affunde, semper miscendo vsque ad mellis crassitudinem, vtere. Addunt nonnulli chalciteos ʒ. i. β. alij olei myrtini & vini portionem paucam vicissim miscent.

Vnguentum magnum ceraseos

D. M.

℞. Hammoniāci ℥.i.

Bdellij

Thuris masculi

Aristolochiæ

Sarcocollæ añ. 3.v.

Myrrhæ

Galbani añ. 3.β.

Lithargyri 3.xv.

Aloës

Opopanacis añ. 3.ij.β.

Aeruginis 3.ij.

Resinæ 3.xiiij.

Ceræ albæ 3.ij.

Olei quantum sufficit.

Lithargyrum tere, & cum oleo coque, donec liquefiat. Tunc depone ab igni, & dum modicè refrixerit, misce hammoniacum & bdellium aceto soluta: redde igni, coque ad iustam crassitiem, tuncq; reliqua permisce.

Vnguentum magnum ceras eos vlcera maligna, putrida, fistulosa, sorde &

carne mortua purgat, carne implet, glutinat & cicatrice tegit.

Vnguentum cerascos paruum

D. M.

℞. Aristolochiæ

Ireos

Sanguinis draconis

Hammoniæ

Sarcocollæ añ. ʒ.β.

Lithargyri laxigatæ ʒ.v.

Olei lb.i.

Coque lithargyrum cum oleo donec liquefiat: tunc cætera, vt in priore, misce.

Vnguentum *υδράσως* paruum vlcera tam vetera quàm noua terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. Nam magis sarcoticum est altero.

Vnguentum cyclamini magnum

D. M.

℞. Succii cyclamini lb. iij.

Succi cucumeris agrestis lb. i.

Olei irini lb. ij.

Butyri vaccini lb. i.

Pulpæ colocynthidos ʒ. iij.

Polypodij ʒ. vi.

Euphorbij ʒ. β.

Sagapeni aur. v.

Myrrhæ aur. ij.

Ceræ ʒ. v.

Fellis vaccini aur. v.

Scammonij

Aloës

Mezerei

Colocynthidos

Turbith añ. aur. v.

Euphorbij aur. ij.

Salis gemmæ aur. iij.

Piperis longi

Zingiberis

Chamæmeli añ. aur. ij.

Colocynthid. polypodium, euphorbium sicca, tere & macera dies octo succis & oleis in vase vitreo angusti

oris benè obstrueto: pòst semel ferue-
 fac, cola: deinde sagapentī & myrrham
 in aceto dissoluta, coque mouendo ad
 succorum prope cōsumptionem. Tunc
 adde ceram, fel, & feruefac simul donec
 cera liquatur. Tunc insperge reliquos
 pulueres.

Vnguentum cyclamini magnum,
 relatum ad Alexandrum, illitum sto-
 macho, vomitu purgat: hypogastrio
 autem inunctum, aluum deñcit: ob id
 hydropicos mirè iuuat, serosum excre-
 mentum largè vacuādo: vermes quoq;
 necat & educit. Adhibetur non potenti-
 bus sumere medicamentum purgans.

Vnguentum cyclamini par-
uum D. M.

℞. Succī cyclamini
 Succī glutinosi ex radi. filicis extracti
 Succī ebuli añ. ʒ. ix.
 Succī summitatum tamaricis ʒ. ij.
 Olei irini lb. ij.

Oesypi

Oesypi ʒ.v.

Hammoniaci

Bdellij añ. ʒ.i.β.

Aceti quantum sufficit.

Ceræ flauæ ʒ.vi.

Corticum radicum capparis ʒ.i.β.

Spicæ nardi ʒ.β.

Fiat vt prius.

Vnguentum cyclami. paruum sple-
nis tumores etiam scirrhosos dissoluit,
& strumas.

Vnguentum ex panno lineo

*Heben Zezar, secun-
dum M.*

℞. Opopanacis ʒ.i.

Rasuræ panni linei tenuis, puri, anti-
qui ʒ.β.

Vini

Mellis

Olei rosati uel

Myrtini añ. ʒ.v.

Lithargyri

Aloës

Sarcocollæ

Myrrhæ añ. 3.ij.ß.

Tere paulatim affundendo nunc vinum, nunc oleum, nunc mel.

Adduntur quandoque chalciteos 3.ij.

Vnguentum hoc mirabile ad vlcera maligna, fistulosa, carne implenda.

Vnguentum ex cantharidibus

D. M.

℞. Cantharidum recentium 3.x.

Axungię porci 3.v.ß.

Tere simul, dies septem marcescant post coque, cola, serua vitreo vase.

Vnguētum ex cantharid. causticum, phœnigmon & vesicas excitat, vlcerat: alphas, pannos, lentigines, cutis maculas delet.

Vnguentum ex bdellio

D. M.

℞. Bdellij 3.vi.

Euphorbiꝝ

Sagapeni añ. 3. iij.

Castoriꝝ 3. iij.

Ceræ 3. xv.

Olei Iasmini uel

Leucoꝝ lutei 3. x.

Bdellium & sagapenum dissoluantur aqua rutæ agrestis: cætera cum aqua calida vniantur, & fiat vnguentum.

Vnguentum ex bdellio epilepsiam, paralyfin, spasmus, cæteros neruorum affectus frigidos ac scirrhosos iuuat.

*Vnguentum alterum idem
pollens D. M.*

℞. Castoriꝝ 3. ij.

Pyrethri

Euphorbiꝝ

Staphidos agriæ

Zingiberis

Sinapis añ. 3. β.

Succi radicū

Succi asphodeli

Succi rutæ syluestris añ. ʒ. iiij.

Ceræ ʒ. v.

Olei rosati ʒ. xx.

Cum succis omnia vniantur: deinde coquantur cū cera & oleo ad succorum consumptionem, coletur, reponatur.

Vnguentum philagrios

D. M.

℞. Ceræ ʒ. iij.

Oesypi

Succi rutæ agrestis añ. ʒ. ij.

Euphorbij

Piperis

Hammoniaci

Croci

Thuris

Castorij

Terebinthinæ

Opopanacis añ. ʒ. ij.

Styracis *uel*

Myrrhæ purioris ʒ. ij. β.

Vnguentum philagrios spasmodum &
paralyfin iuuat.

Vnguentum ex cerusa

D. M.

R₂. Cerusæ

Lithargyri añ. ʒ. vi.

Plumbi vsti

Scoriæ argenti añ. ʒ. β.

Mastiches

Thuris añ. ʒ. ij. β.

Olei rosati

Aceti albi añ. quantum sufficit.

Tritis omnibus in mortario, affunde paulatim nunc oleum, nunc acetum, semper mouendo donec pinguescant, velut nutrita.

Vnguē. ex cerusa sanat ambusta, erysipelata, scabiē siccā, & vlcera calida.

Vnguentum tripharmacum

D. M.

R₂. Lithargyros læuissimè tritas, oleo

vicissim & aceto paulatim affusis in mortario mouetur ad iustam crassitiem. *Vel*

℞. Lithargyri

Aceti añ. 3.1.

Olei 3.ij.

Coque igne lento ad crassitiem. Est enim sarcoticum & epuloticum.

Vnguentum psoricum Alexandri secundum M.

℞. Cerusæ

Lithargyri psorici

Aloës

Croci

Cadmia argentæ

Argenti viui extincti ana portiones æquales.

Olei oleandri

Aceti añ. quantum sufficit.

Hoc vnguentum psoram sanat, impetiginem à pituita falsa, cutis asperitatem, & alia cutis vitia terget.

Vnguentum psoricum aliud

D. M.

℞. Lithargyri albi

Calcanthi ana partem vnam.

Aeruginis partem dimidiam.

Aceti acerrimi quantum sufficit.

Terantur die vno in sole æstiuo paulatim affundendo acetum. Deinde in vase vitreo probe obstructo, condantur sub fimo diebus quadraginta.

Psoricum hoc medicamen compositum ad fistulas, canculos, scabiem siccā, lepram, carnis putridæ incrementum.

Vnguentum vlcera sanans antiqua, dysepulotica D. M.

℞. Aloës

Myrrhæ ana partes æquales

Succi absinthij

Chelidonij

Plantaginis ana quantum sufficit.

Aloën & myrrham tere cum succis

ad mellis consistentiam ; ex linamento
adhibe.

Vnguentum enulatum.

℞. Radicis enulæ campanę coctæ cum
aceto, & pistatæ vt decet lb. j.

Axungię porci

Olei communis añ. ʒ. iij.

Ceræ nouæ ʒ. i.

Argenti viui extincti

Terebinthinæ lotæ añ. ʒ. ij.

Salis communis puluerati ʒ. β.

Incorporentur vt decet.

Vnguentum pro scabie.

℞. Axungię porci ʒ. v.

Olei laurini

Argenti viui extincti

Ceræ mundæ

Mastiches

Thuris albi añ. ʒ. ij.

Salis communis ʒ. viij.

Succi plantaginis

Succi fumiterræ, ad libitum.

Confice sic : Ceram, oleum laurinum, & axungiam pone ad ignem cum succis, & bulliant donec simul liquefiant, deinde adde salem, olibanum, mastichem, & bulliant omnia simul vsq; ad consumptionem succi, postea depellantur ab igne, & addatur argentum viuum extinctum vt supra, & vtere. Potens est. Sed caue ne ob argentum viuum attingat prope membra principalia, addeq; mastichen. Syl. hoc vnguentum sine argento viuo paratum commendat.

Aliud pro pueris.

Rx. Terebinthinæ benè lotæ ℥.iiij.

Butyri loti ℥.ij.

Salis ℥.i.

Succi citrangulorum

Vitellos ouorum añ. num̃. iij.

Olei rosati ℥.i.

Misceantur omnia simul, & fiat vnguentum.

*Vnguentum desiccatiuum
rubrum.*

℞. Lapidis calaminaris

Terræ sigillatæ añ. ʒ. iiij.

Lithargyrj auri

Cérusæ añ. ʒ. ij.

Camphoræ ʒ. i.

Ceræ ʒ. v.

Olei rosati

Olei violati añ. ʒ. vi.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum contra Vermes.

℞. Olei amygdalarum amar. ʒ. i.

Succi foliorum persici

Matricariæ añ. ʒ. β.

Rosarum

Farinæ lupinorum

Cornu cerui vsti añ. ʒ. i.

Aloës succotrini ʒ. ij.

Quidam addunt de felle taurino ʒ. ij.

Modicū aceti, & ceræ quantū sufficit.

Vnguentum resumptiuum.

℞. Axungia porci recentis ℥.iiij.

Axungia gallinaceæ

Axungia anseris

Axungia anatis añ. ℥.ij.

Hyssopi humidæ ℥.β.

Olei violati

Olei chamæmeli

Olei anethini añ. ℥.ij.

Butyri recentis lb. i.

Ceræ albæ ℥.vi.

Muscilaginis Tragacanthæ

Muscilaginis seminis cotoneorum

Muscilaginis seminis lini

Muscilaginis seminis bismalux

Muscilaginis gummi arabici añ. ℥.β.

Misce, & fac vnguentum.

Vnguentum album Rhasis.

℞. Olei communis lb. ij.

Cerux subtilis lb. i.

Ceræ albæ ℥.vi.

Et quidam addunt camphoræ ℥.ij.

Fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum nutritium.

℞. Lithargyrj auri ℥.iij.

Olei communis lb.β.

Aceti ℥.iij.

Fiat vnguentum in mortario plumbeo secundum artem.

Vnguentum Aegyptiacum

D. M.

℞. Floris æris aur.v.

Mellis aur.xiiij.

Aceti fortis aur.vij.

Coque super ignē donec inspissentur.

Addunt aliqui thuris masculi triti aureos ij.β.

Aureus apud modernos est ℥.i.β.

Vnguentum Aegyptiacum confert ad vulnera antiqua, & fistulas quæ indigent mundificatione: abstergit enim & mundificat ea à carne mortua & putredine, Hoc in frequenti vsu est vulne-

rarijs medicis, solentq; vnguentum de melle appellare.

Vnguentum citrinum

D. N.

℞. *Boracis ʒ.ij. *Chrysocolle.

Camphoræ ʒ.i.

Coralli albi ʒ.β.

Amenti dulcis ʒ.i.

Vmbilici marini

Tragacanthæ albæ

Amyli añ. ʒ.ij.

Marmoris

Cryſtalli

Anthallis

Dentalis

Olibani albi

Nitri añ. ʒ.ij.

Marmoris albi ʒ.ij.

Gere serpentariæ ʒ.i.

Ceruse ʒ.vi.

Confice sic: Terantur Tragacantha et vmbilicus marinus in mortario mar

moreo cum pistello ferreo insimul. Cæteræ sigillatim in eodem mortario terantur, & cum panno subtilissimo cribrentur, & cum

Axungia porci recen. sine sale lb. i. β.

Sepi caprini ℥. i. β.

Axungia gallinaceæ ℥. i.

Positis axungijs in cacabo, & cacabo posito & pendente in caldario pleno aqua supra ignem, ita bulliat aqua illa, vt ex calore aquæ axungia liquefiant, & liquefactæ per subtilem pannum album colentur in catino, & mox totus puluis apponatur, præter camphoram & boracem, semper agitando cum spatula, vt omnium fiat bona incorporatio: quo facto, pomo citrino, aut duobus, aut pluribus mittatur, simul misceatur, semper cum spatula agitando. Et sic quum incœperit totum bullire, camphora cum borace apponatur, remotum ab igne donec incipiat frigescere agitetur, & quum infrigidatum

fuert, recondatur. Et nota quòd in vna
libra pulueris debent esse octo libræ
axungia colata.

Vnguentum de cyclamino

D. M.

Rx. Succi cyclamini lb. iij.

Succi cucumeris agrestis lb. j.

Olei irini lb. ij.

Butyri vaccini lb. j.

Euphorbii ℥. i.

Pulpæ colocynthidos ℥. iij.

Polypodii ℥. vi.

Sagapeni aur. v.

Myrrhæ prius in aceto dissolutæ au-
reos iij.

Ceræ ℥. v.

Fellis vaccini aur. v.

Scammonii

Aloës

Cocci gnidii

Colocynthidos

Turbith añ, aur. v.

Salis gemmæ aur. iij.

Euphorbiij

Piperis longi

Zingiberis

Chamæmeli

Cinnamomi añ. aur. ij.

Succos, oleum irinum, butyrum, polypodium, pulpam, trita in vase vitreo angusti oris octo dies simul reponantur, probè obstrueto: post hos semel feruefiat, coletur: colato adde sagapenum, myrrham: coque semper mouendo rudicula donec succus propè omnis consumptus erit: tunc adde ceram, fel, coque donec cera erit liquata: tunc reliqua puluerisata & addita in mortario permisceantur.

Vnguentum de cyclonino ventri, femori, ilibus inunctum aluum deiectione purgat: stomacho autem inunctum, vomitu aquas serosas. Idoneum hydropicis, & a medicamento abhorrentibus; vermes quoq; necat, & educit.

Vnguen

Vnguentum de cyclamino
alterum D. M.

℞. Succi cyclamini
 Humorisi lenti ex radice filicis emul-
 ſi añ. lb. i.
 Succi summitatum tamaricis ℥. ij.
 Olei irini lb. ij.
 Oesypi ℥. xv.
 Aceti ℥. ij.
 Hammoniaci
 Bdellij añ. ℥. i. β.
 Ceræ flauæ ℥. vi.

Vnguentum hoc ex cyclamino du-
 ritiem splenis resoluit etiam lapido-
 sam, & strumas.

Vnguentum Neapolitanum
Ioan. de Vigo, alij Gal-
licum vocant.

℞. Olei chamæmeli
 Anethi

De spica

De lilio añ. ʒ. ij.

Pinguedinis porcinae

Pinguedinis vituli añ. lb. i.

Euphorbij ʒ. v.

Thuris ʒ. x.

Olei laurini ʒ. i. β.

Pinguedinis viperæ ʒ. ij. β.

Ranarum viuientium num. vi.

Lumbricorum lotorum in vino ʒ.
ij. β.

Succi radicum ebuli & enulæ añ. ʒ. ij.

Schoenoanthos

Stoechadis

Matricariæ añ. M. i.

Vini odoriferi lb. ij.

Bulliant omnia simul vsque ad consumptionem vini, deinde coletur, & in colatura adde

Lithargyrj auri lb. i.

Terebinthinæ claræ ʒ. ij.

Cum cera alba fiat cerotum aut vnguentum, addendo in fine cocturæ

Styracis liquidæ ℥.i.β.

Deinde auferatur ab igne cum baculo agitando, donec tepidum fuerit: postmodum addatur argenti viui extincti cum salvia ℥.iiij. cum baculo agitando donec argentum viuum optimè sit incorporatum.

Aliud Vnguentum.

℞. Olei de spica ℥.i.

Olei tartari

Olei laurini

Olei petrolei añ. ℥.β.

Axungie porci ℥.iiij.

Thuris ℥.β.

Euphorbii ℥.i.β.

Vnguenti de althæa

Vnguenti Agrippæ añ. ℥.i.

Argenti viui ℥.iiij.

Misce simul, & fiat vnguentum secundum artem.

Vnguentum Galeni.

℞. Cereæ albæ lb. i.

Olei rosati lb. iij.

Liquefiant omnia simul, deinde lauentur cum aqua frigidissima lauationibus pluribus, vsq; quo bene albescat. Et quanto magis lauatur, tanto fit perfectior. In fine verò conqassentur seu lauentur cum paucō aceti boni.

Vinum de thymelæa

D. M.

℞. Foliorum thymelææ ʒ. ij.

Musti cadum magnum.

Misce ac post tres menses vtere: ad hydropen enim est efficacissimum.

Zucchara rosarum tabulata.

Zuccharum rosatum interdum fit in forma confectionis solidæ, sic:

Accipe zuccharum tabarzeth, id est, finissimum, & dissoluatur cum aqua

rosarum, & coquatur ad perfectionem,
& postea proñciatur supra marmor, vt
ibi frigidetur & congeletur, & diuida-
tur per frusta magna.

Zuccharum

Violaceum

Buglossatum

Eodem modo fiunt, sicut Zuccha-
rum rosarum.

Zazenea D. M.

R[℞] Castorij

Opij

Piperis

Macropiperis

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Mei

Dauci

Asari

Croci æquales partes.

Melle despumato excipitur, aut sapa:
aureus j. datur.

Zazenea frigidam intemperiem sa-
nat, flatus dissipat, & sedat inde natos
dolores ventriculi, coli, vteri, den-
tium: vrinae item difficultatem
medetur, & foecundas facit
mulieres, potum, & pessa
cum lana & oleo li-
liorum collo v-
teri im-
positum.

*

F I N I S.

Index singula- rum materiarum in hoc libro contentarum.

A

A ntidotum Afyncritum	pagina	8
Antidotus Philonis		9
Aurea Alexandrina		10
Antidotum aureum Alexandri		13
Athanasia magna		14
Aromaticum rosatum maius		15
Aromaticum rosatum		17
Electarium aromaticum rosatum ibidem		
Aromaticum caryophyllatum		18
Aromaticum moschatum		19
Aromaticum nardinum		20
Electarium aromaticum nardinum		21
Alipta moschata	ibidem	
Confectio Aliptæ moschatæ	ibidem	
Acacia		22
Acacia vulgata	ibidem	

I N D E X.

Acetum scilliticum	23
Amyli	24
Aqua odorifera	26
Aqua mulsa	ibidem

B

B enedicta	28
Balsamum, quod vulgò artificiale dicitur	30

C

C onfectio de moscho dulcis	30
Confectio de moscho amara	32
Confectio Hamech	ibidem
Electarium Hamech	34
Catapotia stomachica	ibidem
Catapotia stomachica alia	35
Catapotia stomachica alia	36
Catapotia diarhodon	37
Catapotia ex eupatorio maiora	ibidem
Catapotia ex rhabarbaro	38
Catapotia ex halicacabo	39
Catapotia ex thymelæa	40
Pilulæ mezereon	ibidem
Catapotia aurea ex turbith	ibidem
Catapotia ex turbith alia	41
Catapotia ex lapide Armeno	42

I N D E X.

Catapotia ex opopanace	ibidem
Catapotia ex hermodactylis minora	<u>44</u>
Catapotia ex hermodactylis ex inuentio- ne Mesues	<u>44</u>
Catapotia Sabellia	45
Catapotia Inda Haly	<u>46</u>
Catapotia ex colocynthide	<u>47</u>
Catapotia foetida minora	<u>48</u>
Catapotia sagapeni	ibidem
Catapotia ex sagapeno	<u>49</u>
Ceratum œsypatum Gal.	50
Oesypatum Galeni	ibidem
Ceratum œsypi Philagrij	<u>51</u>
Ceratum œsypi Pauli	ibidem
Ceratum santalinum	52
Ceratum Galeni	53
Ceratum Galeni stomachicum	54
Ceratum diapente	55
Cypheos Damocratis compositio	ibidem
Ceratum Alexandri	57
Ceratum alterum eiusdem	<u>58</u>
Ceratum Andromachi	<u>59</u>
Ceratum de euphorbio	<u>60</u>
Ceratum ad hernias	ibidem
Collyrium albū quod imponitur Rhasi	61

I N D E X.

Conserua buglossæ	62
Conserua anthos	ibidem
Conserua boraginis	<u>63</u>
Conserua rosarum	ibidem
Conserua violarum	<u>64</u>
Conserua capillorum Veneris	ibidem
Conserua acori	ibidem
Conserua enulæ campanæ	<u>65</u>
Conserua cicoreæ	ibidem
Conserua acetosæ	<u>66</u>
Condîtum cotoneorum, Gallicè Gelée de Coings	ibidem. & <u>67.</u> & <u>68</u>
Condîtum de pomis	68
Condîtum ex persicis	<u>69</u>
Condîtum ex prunis	<u>70</u>
Condîtum ex sorbis	ibidem
Condîtum citri	71
Condîtum ex fructibus	<u>73</u>
Condîtum ex succo fructuum	<u>74</u>
Condîtum buglosi	ibidem

D

D lagalange	<u>75</u>
Diacyminum commune	<u>77</u>
Diacyminum Mesues	<u>78</u>
Diacyminum aliud Mes.	<u>79</u>

I N D E X.

Dialacca magna	80
Dialacca minor	82
Diacoston	ibidem
Electarium diacoston	83
Diambre	ibidem
Diamargaritum calidum	85
Diamargaritum frigidum	86
Diacomeron	88
Diarhodon Abbatis	90
Diarhodon commune	91
Diarhodon Iacobi Syluij	93
Diacalanintha	94
Diatrion pipereon	95
Diaprasium	<u>96</u>
Diaireos simplicis antidotum	101
Diairis Salomonis	ibidem
Diasulphur	102
Diatragacantha calida	<u>103</u>
Diatragacantha frigida	<u>104</u>
Diamorôn potio	105
Diacodium purum	<u>106</u>
Confectio de Iacur	ibidem
Diapapauer	<u>107</u>
Diacurcuma	<u>108</u>
Diacurcuma minor	110

I N D E X.

Diasatyrium commune	110
Diasatyrium Mesues	<u>112</u>
Diaprunis	<u>114</u>
Diacydonium Galeni	116
Diacydonium Syluij	117
Diacydonium Mes.	ibidem
Diacydonium aliud	<u>118</u>
Diacydonium cholagogum	<u>119</u>
Διά κρόνον Galeni	120
Diaphœnicon	121
Diaphysalidon	122
Alkekangi	<u>125</u>
Diacartami	ibidem
Diacalaminthum	<u>126</u>
Dianacardon Actuarij	ibidem
Diacorallium magistrale	<u>127</u>
Diacassia fistula magistralis pro enemati-	
bus	<u>128</u>
Diacassia	<u>129</u>
Diasene	<u>130</u>
Decoctio pectoralis	<u>131</u>
Decoctio communis	132
Decoctum adianthi albi	<u>133</u>
Apozenia adianthi albi	134
Decoctum fumarie	ibidem

I N D E X.

Decoctum thymi	135
Decoctum myrobalanorum	136
Apozema myrobalanorum	137
Decoctum stœchados	ibidem
Decoctum eupatorij	138
Decoctum epithymi	139
Diacaryon	140
Diacatholicon	142

E

E lectarium catholicum	
Electarium de succo rosarum	142
Electarium de myrris	143
Electarium dianifon	145
Electarium de cinnamomo	147
Electarium de aromatibus	148
Electarium de baccis myrti	149
Electarium de seminibus	150
Electarium Regium	151
Electarium ex granis tinctorijs	152
Electarium xylaloës	153
Confectio ligni aloës	155
Electarium letificans	ibidem
Electarium ex citro	156
Electarium ex rhabarbaro	157
Electarium alkanzi	158

I N D E X.

Electarium ex lasere	159
Electarium anacardinum	160
Confectio anacardina	161
Electarium <i>διὰ βρωμίας</i> Democriti	161
Alphefera Democriti	162
Electarium <i>διὰ νέκυνς νυκτὸς</i>	162
Almezereon hydragogum	163
Electarium de eupatorio	ibidem
Electarium Indum minus	164
Electarium Episcopi	165
Electarium Hamech alterum	ibidem
Electarium rosatum cholagogum	167
Electarium rosatum minus	168
Electarium Indi maioris	ibidem
Electarium confortativum stomachi	170
Electarium de gemmis	172
Eclegma ex pulmone vulpis	174
Eclegma de amygdalis	175
Eclegma ex pineis nucleis	ibidem
Eclegma papanerinum	176
Eclegma de scilla	177
Eclegma de scilla aliud	178
Eclegma sanum	ibidem
Emplastrum diachylon commune, siue di-	
achylon album	180

I N D E X.

Emplastrum diachylon paruum	182
Emplastrum diachylon majus	ibidem
Emplastrum ad stomachum & hepar	185
Emplastrum de granis lauri	186
Emplastrum de meliloto	187
Emplastrum de gallia	188
Emplastrum alterum de gallia	190
Emplastrum Andromachi	192
Emplastrum Andromachi causticum	193
Emplastrum filij Zachariæ	ibidem
Emplastrum Ceroneum	194
Emplastrum Oxycroceum	197
Emplastrum de lanua	199
Emplastrum gratia Dei	ibidem
Emplastrum contra rupturam	200
Emplastrum diuinum	202
Emplastrum pro matrice	ibidem
Emplastrum de minio	203
Emplastrum de cerusa	204
Emplastrum palmeum	205
Emplastrum tripharmacum	206
Emplastrum desiccatiuum rubeum	ibidē

F

Formulæ auium Cypri

I N D E X.

H

H	Hiera Hermetis cum dracunculo	209
	Hiera d.	210
	Hedychroon magma Andromachi	215
	Hedychroi compositio alia	216

I

I	Iulep rosatum	217
	Iulepum aliud rosatum Mesues	218
	Iulepus Zizyphorum	ibidem
	Iulep violatum	219
	Infusio rosarum	ibidem
	Infusum aquæ casei	220
	Infusum succi herbarum	ibidem
	Infusum Hieræ	221

L

L	Loch de pino	222
	Loch de scylla	223
	Loch de caulibus domini Gordonij	225
	Loch de pulmone vulpis	226

M

M	Mithridatum expertum domini Ioan nis Manardi	227
	Mithrid	

I N D E X.

Mithridatum Nicolai	229
Mithridatum Andromachi	235
Mithridatum Damocratis	238
Micleta domini Nicolai	240
Mina aromatica	241
Conditum ex cydonijs	243
Mina simplex	ibidem
Mel rosaceum	244
Mel passulatum	245
Mel violaceum	ibidem
Mel anthosatum	245
Manus Christi perlari	246
Medicamentum de bryonia	ibidem

O

O Elypi extractio	247
Oxymel simplex	248
Oxymel diureticum commune	ibidem
Oxymel scylliticum	249
Oxymel de radicibus, seu diureticum Me- fues	250
Oxymel compositum de quinque radicibus Syluij	251
Oxymel ex ligustico	ibidem
Oxymel ex calamintha	253
Οἰνομέλις vinum mulsum	254

I N D E X.

Oxyfaccharum simplex	255
Oxyfacchara composita	256
Oleum de amygdalis dulcibus	257
Oleum amygdalarum amararum	258
Oleum laurinum	ibidem
Oleum sesaminum	259
Oleum nardinum	260
Oleum de Costo	262
Oleum rutaceum	263
Oleum anethinum	ibidem
Oleum chamamelinum	264
Oleum myrteum	265
Oleum irinum	266
Oleum rosaceum	267
Oleum violaceum	269
Oleum ex cotoneis	270
Oleum mastichinum	272
Oleum ex pomis mandragoræ	ibidem
Oleum enulatum	273
Oleum ex styrace	ibidem
Oleum cyprinum	274
Oleum de alkanna	ibidem
Oleum de Castoreo	ibidem
Oleum de euphorbio	ibidem
Oleum vulpinum	276

I N D E X.

<u>Oleum ex tartaro.</u>	277
<u>Oleum scorpionum</u>	278
<u>Oleum de lilio</u>	279
<u>Oleum de floribus papaveris</u>	281
<u>Oleum de nenuphare</u>	ibidem
<u>Oleum menthæ</u>	282
<u>Oleum de absinthio</u>	283
<u>Oleum lumbricorum</u>	284
<u>Oleum de cheiri</u>	ibidem
<u>Oleum ex thymelæa.</u>	285
<u>Oleum ex mezereio</u>	ibidem
<u>Oleum de thymo</u>	ibidem
<u>Oleum sericinum</u>	286
<u>Oleum de cucumere asinino</u>	ibidem
<u>Oleum σιννόικον</u>	287
<u>Oleum de pomis citreis vel arantijs</u>	ibidem
<u>Oleum de pomis citrangulorum</u>	ibidem
<u>Oleum croci</u>	288
<u>Oleum ex piperibus</u>	ibidem
<u>Oleum ex viperis</u>	290
<u>Oleum de serpentibus</u>	291
<u>Oleum ex ranis</u>	ibidem
<u>Oleum de ovis</u>	ibidem
<u>Oleum ex frumento</u>	292
<u>Oleum iuniperi</u>	293

I N D E X.

Oleum Philosophorum	294
Oleum Philosophorum artificiale	ibidem

P

P ulvis violarum odoriferus	295
Pulvis violarum odorus	296
Pomum Ambræ	ibidem
Pomum Ambræ aliud	297
Pulvis contra pestem	ibidem
Pulvis electarij de bolo	298
Pulvis contra lumbricos	299
Pulvis bezeardicus	300
Pulvis xylaloës	301
Pulvis ligni aloës alius	ibidem
Pulvis diarhodon	302
Pulvis aromatum	303
Pulvis impinguare expertus	304
Pulvis baccarum myrti	ibidem
Pulvis ad tussim & thoracis dolorem	305
Pulvis pro epithemate cordis	306
Pulvis cordialis	307
Penidiæ	308
Pignolatum	310
Pilulæ Sine quibus esse nolo	ibidem
Pilulæ aureæ	311
Pilulæ cochix	312

I N D E X.

Pilulæ de octo rebus	313
Pilulæ de quinque generibus myrobala- norum	ibidem
Pilulæ alefanginæ	315
Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione D. Me- fues	317
Pilulæ de rhabbaro	318
Pilulæ de sarcocolla	319
Pilulæ foetidæ maiores	320
Pilulæ de euphorbio	321
Pilulæ Lucis maiores	322
Pilulæ Lucis minores	324
Pilulæ de lapide Lazuli	325
Pilulæ de bdellio maiores	ibidem
Pilulæ de hermodactylis maiores	326
Pilulæ arthreticæ	327
Pilulæ stomachicæ	328
Pilulæ ante cibum	ibidem
Pilulæ de agarico	329
Pilulæ de fumoterræ	331
Pilulæ communes	ibidem
Pilulæ de Affaieret	332
Pilulæ bichiæ	333
Pilulæ imperiales	ibidem
Pilulæ de thymelæa	335

I N D E X.

Pilulæ de esula	335
Pilulæ hieræ simplicis	336
Pomatum, Gallicè Pommade	ibidem

R ^P ofata nouella	337
-------------------------------------	-----

S yrupus de acetofitate citri	338
Syrupus de succo acerosæ	339
Syrupus de agresta	ibidem
Syrupus de omphacio	340
Syrupus de Calamintha	ibidem
Syrupus de mentha	341
Syrupus de ablinthio	342
Syrupus de fumoterræ	344
Syrupus fumarix minor	346
Syrupus de fumoterræ simplex	347
Syrupus de liquiritia	348
Syrupus ex succo cucurbitæ	349
Syrupus portulacæ	350
Syrupus de quinque radicibus	351
Syrupus acetatus diarhodon	352
Syrupus acetatus de succis herbarum	353
Syrupus de thymo	354
Syrupus de bryonia	355
Syrupus ex corticibus citri	ibidem

I N D E X.

<u>Syrupus acidus ex prunis</u>	<u>356</u>
<u>Syrupus acidus de pomis</u>	<u>357</u>
<u>Syrupus alius de pomis acidus</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus Saporis de pomis</u>	<u>358</u>
<u>Syrupus acidus ex cydonijs</u>	<u>359</u>
<u>Syrupus de hyslopo</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus de prasio</u>	<u>360</u>
<u>Syrupus de epithymo</u>	<u>362</u>
<u>Syrupus de eupatorio</u>	<u>364</u>
<u>Syrupus de stœchade</u>	<u>366</u>
<u>Syrupus violaceus</u>	<u>368</u>
<u>Syrupus de papauere simplex</u>	<u>369</u>
<u>Syrupus de papauere compositus</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus myrteus</u>	<u>370</u>
<u>Syrupus myrteus simplex</u>	<u>371</u>
<u>Syrupus acetosus simplex</u>	<u>372</u>
<u>Syrupus acetosus cum radicibus</u>	<u>373</u>
<u>Syrupus endiuix simplex</u>	<u>374</u>
<u>Syrupus endiuix compositus</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus de cichorea</u>	<u>376</u>
<u>Syrupus de cotoneis</u>	<u>377</u>
<u>Syrupus nenufarinus</u>	<u>378</u>
<u>Syrupus de berberis</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus de granatis acetosis</u>	<u>ibidem</u>
<u>Syrupus de bizantijs</u>	<u>379</u>

I N D E X.

Syrupus de infusione rosarum viridium	379
Syrupus rosatus	380
Syrupus de rosis siccis	ibidem
Syrupus de succo rosarum	ibidem
Syrupus de iuinibis	381
Syrupus capillorum Veneris simplex	381
Syrupus capillorū Veneris compositus	ibi,
Syrupus alius capillorum Veneris Antonij Musæ	383
Syrupus adianthinus	384
Syrupus de artemisia	ibidem
Syrupus de limonibus	385
Syrupus de scolopendria	386
Syrupus de buglossa	387
Syrupus alius de buglossa	ibidem
Sapo moschatus	388
Sapa ribes D. Syluij	ibidem
Rob vel <i>σικαίων</i> ribes	389
Sapa de berberis	ibidem

T

T Heriaca magna	389
Theriaca dia tessaron	393
Tryphera Sarracenica magna	394
Tryphera antidotus moschata	396
Tryphera persica	397

I N D E X.

Tryphera magna	400
Triasandali	402
Trochisci diarhodón	404.& 417
Trochisci diani. siue de violis	ibidem
Trochisci scyllini	405
Trochisci theriaci	406
Trochisci diacoralliôn	407
Trochisci de camphora	408
Trochisci de alkekengi	409
Trochisci de myrrha	410
Trochisci ad fluxum	411
Trochisci alij ad eundem affectum cum ex- ulceratione intestinorum	413
Trochisci galliæ Sebellinæ	ibidem
Trochisci galliæ aromaticæ	414
Trochisci galliæ magnæ	416
Trochisci de rosis	418
Trochisci de gallia moschata	419
Trochisci de rhabarbaro	ibidem
Trochisci de spodio	420
Trochisci de absinthio	421
Trochisci de eupatorio	422
Trochisci de terra sigillata	423
Trochisci de charabe	425
Trochisci de rosis & eupatorio	426

I N D E X.

Trochisci Ramich	426
Trochisci spodij	428
Trochisci oxyacanthæ	429
Trochisci oxyacanthæ alij	ibidem
Trochisci anisi	430
Trochisci anisi alij ex decē simplicibus	431
Trochisci cancam	432
Trochisci colocynthidos, id est, alhandal	

433

Trochisci santalorum	ibidem
Trochisci triasantalorum alij eiusdem facultatis	434
Trochisci Hamech	435
Trochisci cyperi	ibidem
Trochisci ligni aloës	436
Trochisci de bryonia	437
Trochisci capparum	438
Trochisci halicacabi	439
Trochisci δια σουαλίδων	440
Tela, quam vulgò Gualterij vocant	ibidem

V

Vnguentum Apostolorum	441
Vnguentum rosatum	442
Vnguentum basilicum magnum	443
Vnguentum basilicum minus	444

I N D E X.

Vnguentum aureum	445
Vnguentum populeum	ibidem
Vnguentum Martiatum	446
Vnguentum aragon	451
Vnguentum de althæa	453
Vnguentum Agrippæ	455
Vnguentum pompholygos	456
Vnguentum palmeum	457
Vnguentum diaphœnicum	458
Vnguentum δια χαλκίτης	459
Vnguentum mirabile	ibidem
Vnguentum aliud eiusdem	460
Vnguentum magnum ceraseos	ibidem
Vnguentum ceraseos paruum	462
Vnguentum cyclamini magnum	ibidem
Vnguentum cyclamini paruum	464
Vnguentum ex panno lineo Heben Ze- zar	465
Vnguentum ex cantharidibus	466
Vnguentum ex bdellio	ibidem
Vnguentum alterum idem pollens	467
Vnguentum philagrios	468
Vnguentum ex cerusa	469
Vnguentum tripharmacum	ibidem
Vnguentum psoricum Alexandri	470

I N D E X.

Vnguentum pforicum aliud	471
Vnguentum vlcera fanans antiqua, dysepu- lotica	ibidem
Vnguentum enulatum	472
Vnguentum pro scabie	ibidem
Vnguentum aliud pro pueris	473
Vnguentum desiccatiuum rubrum	474
Vnguentum contra vermes	ibidem
Vnguentum resumptiuum	475
Vnguentum album Rhasis	ibidem
Vnguentum nutritiuum	476
Vnguentum Aegyptiacum	ibidem
Vnguentum citrinum	477
Vnguentum de cyclamino	479
Vnguentum de cyclamino alterum	481
Vnguentum Neapolitanum, quod Galli- cum alij vocant	ibidem
Vnguentum aliud	482
Vnguentum Galeni	ibidem
Vinum de thymelaea	484

Z Vecchara rosarum tabulata	484
Zuccharum	485
Zazenea	ibidem

F I N I S.





